

सरजू-52 प्रमाणित धान बीज

द्वारा उत्पादित, पैक और विपणन

मैसर्स सूद हाइब्रिड सीड्स,

सूद फार्म

भोना बिरहा मार्ग

ग्राम भोना इस्लाम नगर

पोस्ट ऑफिस - बाजपुर-262401

जिला - उधम सिंह नगर

उत्तराखंड

उत्पादन का महीना, उत्पादन का वर्ष- अक्टूबर 2025

पैकिंग का महीना, वर्ष----अप्रैल 2026

विविधता विवरण और सांकेतिक पी० ओ० पी० .

सरजू 52, उच्च उपज देने वाली किस्म, उत्तर प्रदेश के मैदानी सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह आम कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध दिखाता है। आमतौर पर उपयुक्त मौसम की स्थिति में 125-140 दिनों में परिपक्व हो जाता है। इष्टतम परिस्थितियों में उपज क्षमता 50-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अनाज की गुणवत्ता लंबे स्टैंडर या लंबे बोल्ट अनाज। मजबूत तने, मध्यम ऊंचाई, लगभग 100 सेमी का पौधा होता है।

जून और जुलाई के दौरान बुवाई का सबसे अनुकूल समय है।

बीज दर 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 120:60:60 किग्रा/हेक्टेयर पर अनुशंसित एनपीके खुराक। रोपाई के समय पूर्ण फॉस्फोरस, पोटेशियम और आधा नाइट्रोजन लगाएं। शेष नाइट्रोजन दो विभाजित खुराक टिलरिंग एवं बाली बनने चरण में। खैरा रोग से बचाव के लिए प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट लगाएं। खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपण के 3-4 दिनों के भीतर पेंडीमेथालिन @1.25 किग्रा/हेक्टेयर या [Butachlor@1.5 किग्रा/हेक्टेयर](#) लगाएं।

प्रमुख रोग

चावल और गर्दन का ब्लास्ट। ट्राइसाइक्लाज़ोल 75% WP @0.6-1 ग्राम प्रति लीटर पानी या एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 23% SC 1.5 मिली/लीटर का छिड़काव करें

बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। कॉपर हाइड्रॉक्साइड 77% WP @2gram/लीटर पानी या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% + टेट्रासाइक्लिन 10% का छिड़काव करें।

शीथ ब्लाइट। वैलिडैमाइसिन 3% एल 2-2.5 मिली प्रति लीटर पानी या प्रोपिकोनाज़ोल 25% ईसी का छिड़काव करें भूरा धब्बा। प्रोपिनेब 70% WP 1.5-2 ग्राम/लीटर पानी या मैकोज़ेब 75% WP या टेबुकोनाज़ोल 2ml/लीटर स्प्रे करें प्रमुख कीट और कीड़े

स्टेम बोरोर। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5SC @ 150 एमएल प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें।

प्लांट हॉपर। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 0.25-0.75 मिली/लीटर पानी या बुप्रोफेज़िन 23.1%+फिप्रोनिल 3.85%एससी 1-1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या 200 मिली/एकड़ का छिड़काव करें।

थ्रिप्स स्प्रे लैमडा साइकैलोथ्रिन 2.5 ईसी 1-2 मिली/लीटर पानी।