UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA VIDA · DISCIPLINA DE PATOLOGIA

Neoplasia e Oncogênese

Apostila de estudo prévio · Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição
Docente: Manoela Carrera · Versão 2

Direitos autorais e proibição de distribuição
© 2026 Manoela Carrera. Todos os direitos reservados. Este material é de uso exclusivo dos estudantes matriculados na disciplina. É proibida a reprodução, a distribuição, a publicação ou o compartilhamento, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da autora, nos termos da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais). Os esquemas e as imagens ilustrativas desta obra estão incluídos nesta proteção.

Esta apostila reúne **Neoplasia** e **Oncogênese** e deve ser estudada **antes da aula**. Na sala, o tempo é para dúvidas, discussão e casos. A apostila guia o raciocínio; ela não substitui o livro-texto.

Ao final, você será capaz de

1. diferenciar neoplasia benigna de maligna usando quatro critérios;
2. nomear um tumor a partir do tecido de origem e reconhecer as exceções;
3. explicar anaplasia, atipia celular e metaplasia;
4. descrever as vias de disseminação e o que uma metástase significa para o paciente;
5. explicar por que o câncer é uma doença genética (proto-oncogenes, genes supressores, reparo do DNA e apoptose);
6. relacionar agentes carcinogênicos à prevenção e ao rastreamento.

PENSE ANTES DE CONTINUAR

Duas pessoas procuram um serviço de saúde. A primeira tem um nódulo sob a pele do braço, móvel, indolor, que existe há 10 anos. A segunda tem um nódulo endurecido, fixo, que dobrou de tamanho em 3 meses. Quais perguntas você faria a cada uma? Que informações do exame você pediria? Anote suas hipóteses e volte a elas no final.

1. Conceitos básicos

Neoplasia significa “novo crescimento”, e esse crescimento é chamado **neoplasma**. A palavra **tumor** originalmente descrevia o edema da inflamação, mas hoje é usada como sinônimo de neoplasma. O neoplasma é uma **massa anormal de tecido** cujo crescimento é **excessivo**, **não coordenado** com o dos tecidos normais vizinhos e **persistente**: continua mesmo depois que o estímulo que o originou deixa de existir.

PENSE ANTES DE CONTINUAR

Na gravidez, a mama cresce muito, mas depois do desmame volta ao tamanho anterior. Por que isso não é neoplasia?

As neoplasias são classificadas em dois grandes grupos:

- **Benignas:** massa localizada, sem capacidade de disseminação para outros sítios e, na maioria das vezes, sem risco à vida.
- **Malignas:** também chamadas de **câncer**. Destroem tecidos vizinhos e podem se disseminar à distância (**metástase**), o que muitas vezes leva ao óbito.

Parênquima e estroma

Todo tumor, benigno ou maligno, tem dois componentes: o **parênquima**, formado pelas células neoplásicas clonais, e o **estroma**, formado por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e alguns leucócitos. O parênquima define o comportamento do tumor e dá o nome a ele. O estroma fornece nutrientes e suporte para que o parênquima se divida.

Hoje o estroma é entendido de forma mais ampla, como **microambiente tumoral**: células imunes, fibroblastos, vasos e matriz extracelular dialogam o tempo todo com as células neoplásicas, e esse diálogo ajuda a explicar a invasão, a formação de vasos e a escapada do sistema imune (veja a Parte 2).

2. Nomenclatura

O nome do tumor é baseado no **componente parenquimatoso**, isto é, na célula de origem.




Figura 1. Como nomear um tumor. Esquema elaborado para esta apostila.

- **Benignos de origem mesenquimal:** sufixo **-oma** acrescentado à célula de origem. Tecido cartilaginoso: *condroma*. Músculo liso: *leiomioma*.
- **Benignos de origem epitelial:** classificação mais complexa, baseada na origem, na arquitetura ou no padrão microscópico. **Adenoma** é o neoplasma epitelial benigno derivado de glândulas, formando ou não estruturas glandulares. **Papiloma** é a projeção em forma de dedo ou couve-flor sobre uma superfície, e **pólipo** é a projeção macroscopicamente visível em uma superfície mucosa, como o lúmen intestinal.
- **Malignos de origem mesenquimal:** sufixo **-sarcoma** (*sarco* = carne, porque têm pouco estroma e são "carnosos"). Exemplos: lipossarcoma, osteossarcoma, rabdomiossarcoma.
- **Malignos de origem epitelial: carcinomas**. O **carcinoma de células escamosas** (epidermoide) lembra o epitélio escamoso estratificado. O **adenocarcinoma** forma padrões glandulares.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 2/14

- **Tumor maligno indiferenciado:** quando as células são tão alteradas que não permitem identificar o tecido de origem. Em geral indica comportamento mais agressivo.

Tecido de origem	Benigno	Maligno
MESENQUIMAL		
Fibroblasto	Fibroma	Fibrossarcoma
Tecido adiposo	Lipoma	Lipossarcoma
Osso	Osteoma	Osteossarcoma
Cartilagem	Condroma	Condrossarcoma
Vasos sanguíneos	Hemangioma	Hemangiossarcoma
Vasos linfáticos	Linfangioma	Linfangiossarcoma
Músculo liso	Leiomioma	Leiomiossarcoma
Músculo estriado	Rabdomioma	Rabdomiossarcoma
EPITELIAL		
Superfície (projeção)	Papiloma	Carcinoma
Padrão glandular	Adenoma	Adenocarcinoma
OUTRAS ORIGENS		
Melanócito	Nevo	Melanoma
Linfócito	–	Linfoma

ATENÇÃO

O sufixo **-oma** não garante benignidade. **Linfoma** (tumor de linfócitos, não de vasos linfáticos), **melanoma**, **mieloma múltiplo** e **seminoma** são malignos. O nome orienta, mas quem define a conduta é o comportamento do tumor.

3. Benigno × maligno: quatro critérios

A. Diferenciação e anaplasia

Diferenciação é o quanto as células do parênquima neoplásico lembram as células normais correspondentes, na forma e na função.

- Nas neoplasias **benignas**, as células são **bem diferenciadas**, semelhantes às do tecido de origem. As mitoses são raras e de aspecto normal.
- Nas neoplasias **malignas**, a diferenciação é variável. A perda de diferenciação é a **anaplasia**, marca registrada da malignidade. Quanto menos diferenciado, em geral mais agressivo o tumor.

As células anaplásicas apresentam **atipia**, ou seja, variação anormal da morfologia:

- **Pleomorfismo:** núcleos e células com tamanhos e formas diferentes entre si.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 3/14

- **Morfologia nuclear anormal:** núcleos hipercromáticos (cromatina abundante e muito corada) e aumento da relação núcleo:citoplasma.
- **Mitoses atípicas:** por exemplo, fusos multipolares.
- **Perda da polaridade:** as células perdem a orientação em relação ao tecido.

Atipias celulares em esquema

Cada alteração abaixo é mostrada ao lado do aspecto normal. Esses esquemas são ilustrativos: na lâmina, várias alterações aparecem juntas na mesma célula.




Figura 2. Pleomorfismo celular: células de tamanhos e formas diferentes no mesmo tumor. Esquema elaborado para esta apostila.




Figura 3. Pleomorfismo nuclear: núcleos de tamanhos e formatos diferentes, com contornos irregulares. Esquema elaborado para esta apostila.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 4/14



Figura 4. Mitoses multipolares: o fuso com três ou mais polos distribui o material genético de forma desigual, gerando células-filhas com número anormal de cromossomos. Esquema elaborado para esta apostila.




Figura 5. Perda da relação núcleo:citoplasma: o núcleo cresce e o citoplasma diminui. Esquema elaborado para esta apostila.




Figura 6. Hipercromasia: excesso de cromatina, que torna o núcleo mais escuro e grumoso na coloração de rotina. Esquema elaborado para esta apostila.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 5/14





Figura 7. Pérola de queratina em um carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Esquema elaborado para esta apostila.

ATENÇÃO

A **pérola de queratina** não é uma atipia celular em si. É um sinal de **diferenciação escamosa**, típico de carcinoma de células escamosas bem diferenciado: as células tumorais ainda lembram o epitélio de origem e produzem queratina.

Como esses achados aparecem na lâmina



Pleomorfismo celular
Células de tamanhos e formas variados

Pleomorfismo nuclear
Núcleos grandes, irregulares e de tamanhos diferentes

Mitoses multipolares
Fuso com mais de dois polos (seta)

Pérolas de queratina
Camadas concêntricas de queratina (seta)

Figura 8. Aspecto microscópico das alterações descritas acima. Imagens ilustrativas geradas por inteligência artificial; não são fotomicrografias de casos reais.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 6/14

Metaplasia: não confunda com neoplasia

Metaplasia é a substituição de um tipo celular maduro por outro tipo celular maduro, quase sempre como adaptação a agressões repetidas e ligada a processos de lesão, reparo e regeneração. É reversível quando o estímulo cessa. Exemplo: o epitélio respiratório de um tabagista que se transforma em epitélio escamoso.

B. Taxa de crescimento

A taxa de crescimento depende de três fatores: o **tempo de duplicação** das células tumorais, a fração de células no **grupo replicativo** (fração de crescimento) e a taxa com que as células são **perdidas ou morrem**. Tumores de crescimento rápido podem ter alto *turnover* celular, com altas taxas de proliferação e de apoptose.

Em geral, a taxa de crescimento correlaciona-se com o nível de diferenciação: a maioria dos malignos cresce mais rápido que os benignos. Existem exceções, e a taxa pode variar ao longo do tempo com estímulos hormonais, suprimento sanguíneo e fatores ainda desconhecidos.

Quanto maior a fração de crescimento, mais sensível o tumor à quimioterapia, porque a maioria dos fármacos atua em células que estão no ciclo celular. Pelo mesmo motivo, os **tecidos normais de renovação rápida** também sofrem: medula óssea, mucosa do trato digestivo e folículos pilosos.

NA SUA PROFISSÃO

- **Enfermagem:** mucosite, náuseas, diarreia e queda de cabelo são efeitos esperados; cuidado e orientação fazem parte da assistência.
- **Nutrição:** mucosite e alterações do trato digestivo comprometem a ingestão e o estado nutricional.
- **Fonoaudiologia e Fisioterapia:** disfagia, fadiga e perda funcional podem acompanhar o tratamento.
- **Farmácia:** muitos antineoplásicos são específicos de fase do ciclo celular, e isso orienta esquemas e toxicidade.

C. Invasão local

As neoplasias **benignas** crescem por **expansão**, sem infiltrar tecidos vizinhos nem formar metástase. Em geral são circunscritas por uma **cápsula de fibrose**, derivada da matriz extracelular do tecido nativo comprimido pelo tumor. A cápsula não impede o crescimento, mas mantém uma massa discreta, palpável e **móvel**, que pode ser enucleada cirurgicamente com facilidade.

As neoplasias **malignas** são **invasivas**: destroem os tecidos adjacentes e podem dar metástase regional e à distância. Como não têm plano de clivagem bem definido, a cirurgia exige ressecar uma **margem** de tecido aparentemente normal.

ATENÇÃO

Benigno não é sinônimo de inofensivo. Alguns tumores benignos, como o hemangioma, não têm cápsula, e outros são localmente invasivos e recidivantes (ex.: fibromatose desmoide). Um tumor benigno também pode causar dano pela **localização** (comprimindo estruturas vitais) ou pela **secreção hormonal**.

D. Metástases

Metástases são implantes tumorais **distantes** do tumor primário e **não contínuos** a ele. Sua presença é altamente sugestiva de malignidade, pois tumores benignos não metastatizam, e reduz de forma significativa as chances de cura.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 7/14

Para metastatizar, a célula percorre uma cascata: **invade a matriz** e os vasos, **sobrevive na circulação**, **sai do vaso** em outro órgão e **coloniza** o novo tecido. A maioria das células que entram na circulação morre pelo caminho. A hipótese da “semente e do solo” propõe que só algumas células encontram um órgão com ambiente favorável.




Figura 9. Etapas da metástase, tendo o carcinoma como exemplo. Esquema elaborado para esta apostila.

Seguindo o exemplo de um carcinoma, a sequência é: **(1)** crescimento do tumor primário com formação de novos vasos; **(2)** invasão local, com ruptura da membrana basal; **(3)** entrada em vaso linfático ou sanguíneo (intravasação); **(4)** sobrevivência na circulação; **(5)** saída do vaso em outro órgão (extravasamento); e **(6)** colonização, com formação de micrometástase e depois de macrometástase.




Figura 10. Vias de disseminação. Esquema elaborado para esta apostila.

- **Disseminação linfática:** característica dos carcinomas (sarcomas também podem usá-la, pois há comunicação entre os sistemas linfático e sanguíneo). O padrão de envolvimento dos linfonodos segue as rotas naturais de drenagem linfática. Os linfonodos regionais funcionam como barreira, pelo menos temporariamente, por serem ricos em células imunes.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 8/14

- **Disseminação hematogênica:** via preferencial dos sarcomas, mas frequente também em carcinomas. As artérias, de paredes mais espessas, resistem mais à invasão do que as veias. Fígado e pulmão são os órgãos mais acometidos porque são muito vascularizados e recebem grande parte da drenagem venosa do organismo.
- **Disseminação celômica (transcelômica):** as células penetram em uma cavidade natural, como a peritoneal (a mais comum), a pleural ou a pericárdica. É mais comum nos carcinomas de ovário, pela comunicação da pelve com a cavidade peritoneal.

ATENÇÃO

Linfonodo aumentado perto de um câncer sugere comprometimento tumoral, mas pode ser apenas um **linfonodo reativo** (hiperplásico) respondendo ao tumor. Só o exame do tecido distingue as duas situações.

Quadro comparativo

Critério	Benigno	Maligno
Diferenciação	Bem diferenciado, semelhante ao tecido de origem	Variável; anaplasia e atipia (pleomorfismo, mitoses atípicas)
Crescimento	Geralmente lento; mitoses raras e normais	Variável; pode ser rápido, com mitoses numerosas e anormais
Limites e invasão	Expansivo, geralmente encapsulado, móvel	Infiltrativo, bordas mal definidas, destrói tecidos vizinhos
Metástase	Ausente	Frequente; maior risco quanto mais indiferenciado o tumor
Prognóstico	Em geral bom; depende de localização e efeito hormonal	Depende de tipo, extensão e resposta ao tratamento

4. Oncogênese: a base genética do câncer

As etapas acima (anaplasia, invasão, metástase) são a **aparência** do câncer. A **causa** está em alterações no material genético das células. O câncer é uma **doença genética de células somáticas**: surge de mutações (e de alterações epigenéticas, como a metilação) que se acumulam em **uma única célula**, cujos descendentes formam o clone tumoral. Em poucos casos há predisposição herdada (ex.: mutações em *BRCA1/2*, *TP53*, *RB1*), mas a maioria dos cânceres é esporádica.

PENSE ANTES DE CONTINUAR

Se uma mutação em uma única célula basta para iniciar um tumor, por que a maioria das pessoas não tem câncer? O que o organismo faz com células que têm o DNA danificado?

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 9/14

As quatro classes de genes envolvidas




Figura 11. Acelerador (proto-oncogene) e freio (gene supressor). Esquema elaborado para esta apostila.

Classe	Função normal	Quando alterada	Exemplos
Proto-oncogenes	Estimulam crescimento e divisão quando há sinal	Viram **oncogenes** (ganho de função); 1 alelo alterado basta	*RAS*, *MYC*, *HER2*, *BCR-ABL*
Genes supressores de tumor	Freiam o ciclo celular e induzem reparo ou apoptose	Perda de função; os 2 alelos precisam estar inativos	*TP53*, *RB1*, *APC*, *BRCA1/2*
Genes reguladores de apoptose	Eliminam células lesadas ou desnecessárias	A célula deixa de morrer e se acumula	*BCL2* (superexpresso em alguns linfomas)
Genes de reparo do DNA	Corrigem erros de replicação e danos ao DNA	Mutações se acumulam (instabilidade genômica)	Genes do reparo de pareamento (síndrome de Lynch); xeroderma pigmentoso

A hipótese dos **"dois golpes"** (Knudson, 1971) explica por que os supressores precisam perder os dois alelos: quem herda um alelo defeituoso já nasce com o primeiro golpe, e um único evento somático completa o segundo, o que explica o aparecimento precoce de alguns cânceres hereditários. Outra aquisição importante é a **telomerase**, enzima que mantém os telômeros e confere à célula potencial replicativo ilimitado.

Capacidades adquiridas pela célula neoplásica (*hallmarks*)

Hanahan e Weinberg (2011) organizaram o fenótipo do câncer em um conjunto de capacidades adquiridas. Elas conectam a genética às características vistas na Parte 1.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição

Capacidade	Em linguagem simples	Exemplo de alvo terapêutico
Autossuficiência em sinais de crescimento	Prolifera sem estímulo externo	HER2 (trastuzumabe)
Insensibilidade a sinais inibidores	Ignora os “freios” (RB, TP53)	Inibidores de quinases do ciclo celular
Evasão da apoptose	Não morre quando deveria	Inibidores de BCL2
Potencial replicativo ilimitado	“Imortalidade” (telomerase)	–
Angiogênese sustentada	Induz vasos para se nutrir	Anti-VEGF (bevacizumabe)
Invasão e metástase	Cascata descrita na Parte 1	–
Reprogramação metabólica	Consome glicose de forma alterada (efeito Warburg)	–
Evasão da destruição imune	Escapa de linfócitos T e células NK	Anti-PD-1 / anti-PD-L1

Duas condições facilitam essas aquisições: a **instabilidade genômica** (mutações em genes de reparo) e a **inflamação crônica** do microambiente. A atualização de Hanahan (2022) acrescentou a plasticidade fenotípica, a reprogramação epigenética não mutacional e os microbiomas polimórficos, além das células senescentes no microambiente; a reprogramação metabólica e a evasão imune passaram a ser tratadas como características centrais.

Carcinogênese em múltiplas etapas



Figura 12. Etapas da carcinogênese. Esquema elaborado para esta apostila.

O câncer não surge de um único evento. Na **iniciação**, uma mutação afeta uma célula. Na **promoção**, estímulos proliferativos expandem o clone. Na **progressão**, novas mutações geram células heterogêneas, com seleção das mais agressivas, o que explica em parte a **resistência ao tratamento**. Um exemplo clássico é a sequência adenoma-carcinoma do cólon, em que alterações sucessivas (como *APC*, *KRAS* e *TP53*) acompanham a passagem de pólipo benigno a carcinoma invasivo.

Microambiente e sistema imune

O sistema imune vigia continuamente células alteradas, principalmente por linfócitos T citotóxicos e células NK. Tumores escapam por mecanismos como a expressão de **PD-L1**, que se liga ao PD-1 do linfócito T e o “desliga”. Os fármacos de **imunoterapia** (inibidores de checkpoint) bloqueiam essa interação e liberam o linfócito. O tumor também secreta fatores como o **VEGF**, que induz formação de vasos, e recruta fibroblastos e outras células que sustentam o crescimento.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 11/14

Agentes carcinogênicos e prevenção

Categoria	Exemplos	Prevenção
Químicos	Tabaco, aflatoxina, asbesto, benzeno, álcool	Cessação do tabagismo, controle ocupacional e alimentar
Físicos	Radiação ultravioleta, radiação ionizante	Fotoproteção, uso racional de exames com radiação
Biológicos	HPV, HBV e HCV, EBV, HTLV-1, *Helicobacter pylori*	Vacinas (HPV, hepatite B), tratamento das infecções
Estilo de vida e inflamação crônica	Obesidade, sedentarismo, dieta; carnes processadas, classificadas pela IARC no grupo 1 (IARC, 2018)	Alimentação adequada, atividade física, controle do peso

A **prevenção primária** evita a exposição ou a infecção (vacina, fotoproteção, cessação do tabagismo). A **prevenção secundária** detecta a doença em fase inicial por rastreamento (ex.: exame citopatológico do colo do útero). Os programas e as recomendações de rastreamento são definidos por órgãos como o INCA e o Ministério da Saúde (INCA, 2016) e estão em revisão periódica: consulte sempre a versão vigente.

NA SUA PROFISSÃO

- **Enfermagem:** coleta do exame citopatológico, vacinação e educação em saúde.
- **Farmácia:** terapias-alvo e imunoterapia só funcionam em quem tem o alvo molecular; farmacovigilância e adesão.
- **Nutrição:** prevenção por dieta e manejo nutricional do paciente oncológico.
- **Fisioterapia e Fonoaudiologia:** reabilitação funcional após cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

5. Quadro-resumo

- **Neoplasia** é crescimento autônomo e persistente. **Câncer** é neoplasia maligna.
- Tumor = **parênquima** (define o comportamento e o nome) + **estroma** (suporte, vasos, microambiente).
- Nome: célula de origem + **-oma** (benigno) ou **-sarcoma / carcinoma** (maligno). Exceções: linfoma, melanoma, mieloma, seminoma.
- Quatro critérios: **diferenciação**, **crescimento**, **invasão local** e **metástase**.
- **Anaplasia** = perda de diferenciação, com atipia (pleomorfismo, núcleos hipercromáticos, mitoses atípicas, perda de polaridade).
- Metástase: **linfática** (carcinomas), **hematogênica** (sarcomas; fígado e pulmão), **celômica** (cavidades).
- Câncer = doença genética somática: **oncogenes** (acelerador travado), **supressores** (freio perdido, 2 alelos), **apoptose** e **reparo do DNA** alterados.
- Carcinogênese em etapas: **iniciação → promoção → progressão**.
- Prevenção primária (evitar exposição) e secundária (rastrear).

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 12/14

6. Questões para raciocinar

Responda por escrito antes da aula e traga suas dúvidas. Em cada questão, justifique o **porquê**: a resposta sem justificativa vale pouco.

1. **Os dois nódulos do início.** Retome os dois pacientes da abertura. Que características da história e do exame físico sustentam a suspeita de benignidade em um e de malignidade no outro? Que exame confirmaria?
2. **Crescer não é o mesmo que ter neoplasia.** Por que o crescimento da mama na gestação não é neoplasia, e que característica do neoplasma o diferencia?
3. **Nomes enganosos.** O laudo de um paciente diz “linfoma”. O sufixo -oma indica benignidade? Justifique e cite mais duas exceções.
4. **Diferenciação e quimioterapia.** Dois carcinomas: um bem diferenciado e de crescimento lento, outro anaplásico e de crescimento rápido. Qual tende a responder melhor à quimioterapia? Por que o tratamento também causa mucosite, queda de cabelo e queda de células sanguíneas?
5. **Metaplasia é câncer?.** Um tabagista de longa data tem epitélio respiratório substituído por epitélio escamoso. Isso é neoplasia? É reversível? Por que ainda assim merece atenção?
6. **Benigno e perigoso.** Cite duas situações em que um tumor classificado como benigno ainda traz risco ao paciente.
7. **Linfonodo aumentado.** Um paciente com câncer apresenta linfonodo aumentado próximo ao tumor. Isso prova metástase? Que outra explicação existe?
8. **Por que fígado e pulmão?.** Explique por que fígado e pulmão são sítios tão frequentes de metástase hematogênica, e por que a disseminação celômica é mais associada ao ovário.
9. **Acelerador e freio.** Por que uma mutação em apenas um alelo de RAS pode contribuir para o câncer, enquanto para RB1 ou TP53 os dois alelos precisam estar inativos?
10. **O guardião do genoma.** O que acontece com uma célula com DNA danificado quando TP53 é funcional? E quando está mutado?
11. **Vacina, Papanicolau e a carcinogênese.** A vacina contra HPV e o exame citopatológico atuam em qual etapa da carcinogênese e em qual nível de prevenção?
12. **Terapia-alvo.** Por que um medicamento dirigido a uma proteína específica (como o trastuzumabe para HER2) funciona apenas em parte dos pacientes?
13. **Seu curso, seu papel.** Escolha uma situação do seu curso (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia ou Nutrição) em que o conhecimento desta apostila muda a sua conduta. Descreva a situação e explique o raciocínio.

Referências

- KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; ASTER, J. C.; DEBNATH, J.; DAS, A. Robbins, Cotran & Kumar Pathologic Basis of Disease. 11. ed. Elsevier, 2025. (Edição da apostila original: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 8. ed., 2010.)

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição

- BRASILEIRO FILHO, G. (ed.). Bogliolo Patologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. [conferir ano e organização na ficha catalográfica do exemplar]
- HANAHAN, D.; WEINBERG, R. A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, v. 144, n. 5, p. 646-674, 2011. DOI: 10.1016/j.cell.2011.02.013.
- HANAHAN, D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discovery, v. 12, n. 1, p. 31-46, 2022. DOI: 10.1158/2159-8290.CD-21-1059.
- KNUDSON, A. G. Mutation and cancer: statistical study of retinoblastoma. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 68, n. 4, p. 820-823, 1971. DOI: 10.1073/pnas.68.4.820.
- IARC WORKING GROUP. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, v. 114. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2018.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2015.

Referências conferidas em fontes online em 13/11/2026 (títulos, periódicos, volumes, páginas e DOI). Confira a edição em português do Robbins adotada na biblioteca e o ano do Bogliolo.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 14/14