

Tentamen i Surveymetodik 732G26

Måns Magnusson

15 augusti 2014, kl. 8.00-12.00

Surveymetodik med uppsats, 15 hp
Kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys
VT2014

Instruktioner

- **Hjälpmedel:**

- Lohr, S: *Sampling- Design and analysis* (anteckningar får **inte** finnas, men sidflärpar är tillåtet).
- Miniräknare.

- **Jourhavande lärare:**

Måns Magnusson

- **Poänggränser:**

Skrivningen ger maximalt 20 poäng. För betyget godkänt krävs normalt 12 poäng och för betyget väl godkänt krävs 16 p.

- **Övrig information:**

Samtliga siffror i examen är fiktiva.

Är det så att någon siffra skulle saknas för att kunna lösa uppgiften, skriv då tydligt ut att du saknar denna information, anta ett godtyckligt värde för denna storhet och lös uppgiften med detta antagande.

Lycka till!

Uppgift 1

Fackföreningen Kommunal vill göra en undersökning om långvariga arbetsskador bland sina medlemmar (på grund av tunga lyft m.m.). Totalt har Kommunal 499869 medlemmar och de drar ett slumpmässigt urval av 800 medlemmar och får totalt 637 svar.

Resultaten de fick visade att hela 75% av de svarande hade någon form av arbetsrelaterade besvär. Gör antagandet "Missing completely at random (MCAR)" i undersökningen.

- a) Beräkna en skattning av hur stor andel av Kommunals medlemmar som arbetsrelaterade besvär med tillhörande konfidensintervall 90 %. **2p.**
- b) Uppskatta det totala antalet medlemmar i Kommunal med arbetsrelaterade besvär med tillhörande konfidensintervall 90 %. **1p.**
- g) Det finns ett intresse av att upprepa undersökningen. Kommunal vill göra om undersökningen nästa år och då vill de ha ett konfidensintervall för \hat{p} på minst $\hat{p} \pm 0.021$. Hur stort antal svarande krävs för att få denna precision. Utgå från resultaten i den undersökning som gjorts ovan. **2p**

Uppgift 2

Norrköpings kommun vill undersöka utsatthet för brott i gruppen 20 - 30 år. De har inte bestämt sig för urvaldesign men oroar sig för att de kommer få ett mycket stort bortfall. De tänker sig därför att försöka göra en telefonundersökning.

Baserat på förslaget till undersökning. Förklara följande begrepp genom att exemplifiera med studien ovan.

Observera att det viktigaste är att du visar att du förstår begreppets innebörd och kan sätta det i relation till en undersökning. Varje begrepp ger **0.5 p.**

- i) Statistikens relevans
- ii) Objektbortfall
- iii) Ändlighetskorrektur
- iv) Klusterurval
- v) Inklusionssannolikhet
- iv) Proportionell allokering

Uppgift 3

Statistiska centralbyrån ska genomföra en levnadsnivåundersökning där de vill undersöka hushållsomkostnader för barn i olika åldersgrupper. Det bestämmer sig därför för att

göra ett stratifierat urval av barn i åldrarna 0 - 18 år och drar ett slumpmässigt urval av storlek 4000 och kontakter föräldrarna genom en postal enkät. Undersökningen är stratifierad efter åldersgrupperna 0 - 6, 7-12 och 13-18 år. Totalt finns det 2066824 barn i denna åldersgrupp och totalt fick Statistiska centralbyrån in $n_r = 2793$ svar.

Undersökningen gav följande resultat:

	N_h	n_h	n_{rh}	\bar{y}_h	s_h
0 - 6	806818	2000	1395	2498.79	201.38
7 - 12	641502	1000	696	3566.58	612.13
13 - 18	618504	1000	702	1996.78	1442.04
Samtliga	2066824	4000	2793	2638.70	981.65

- Baserat på resultatet ovan beräkna ett konfidensintervall (90%) för \bar{y}_U . Anta MCAR gällande bortfallet. **2p**
- Beräkna designvikterna för respektive strata. **1p**
- Nästa gång undersökningen ska göras så är de intresserade av att få så god precision som möjligt. Vilken allokeringmetod bör de då använda? Beräkna hur många individer som ska allokeras till respektive strata med denna allokering? **2p**.

Uppgift 4

Linköpings universitet är intresserade av att se hur stora utgifter studenterna har för kursmaterial (datorer, kurslitteratur m.m.) per månad. Då det sedan tidigare är känt att studenter ofta har ett högt bortfall väljer universitetet att göra en datainsamling genom att dra ett urval av kurser och samla in data vid föreläsningar.

Totalt finns det 27392 studenter och det ges 913 kurser vid universitetet. För att det ska bli en bra tentauppgift för surveystudenterna i kurs 732G26 väljer universitetet att endast samla in data från 5 kurser. Resultatet från undersökningen kan sammanfattas i nedanstående tabell (där \bar{y}_i är det genomsnittliga utgifterna för respektive kurs och s_i är standardavvikelsen i varje kurs).

	M_i	\bar{y}_i	s_i
1	8	259.3	60.7
2	40	335.2	88.6
3	27	309.5	88.6
4	21	381.8	92.5
5	128	334.4	95.3
Samtliga	224	333.3	94.0

- Skatta hur mycket studenter vid Linköpings universitet lägger på kursmaterial i genomsnitt med tillhörande konfidensintervall (99%). Använd den estimator som är väntevärdesriktig. **2p**

- b) Vad har denna skattning för designeffekt? **2p**
- c) Gör om skattningen ovan men använd nu kvotestimatorn istället. Beräkna punktskattning, samt tillhörande medelfel. **3p**

Appendix

NORMAL CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986