

Содержание

1 Рубежный контроль 3	3
1.1 Сформулировать определения случайной величины и функции распределения вероятностей случайной величины. Записать основные свойства функции распределения.	3
1.2 Сформулировать определение дискретной случайной величины; понятие ряда распределения. Сформулировать определение непрерывной случайной величины и функции плотности распределения вероятностей.	3
1.3 Сформулировать определение непрерывной случайной величины. Записать основные свойства функции плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины.	4
1.4 Сформулировать определения случайного вектора и его функции распределения вероятностей. Записать свойства функции распределения двумерного случайного вектора.	4
1.5 Сформулировать определение дискретного случайного вектора; понятие таблицы распределения двумерного случайного вектора. Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и его функции плотности распределения вероятностей.	5
1.6 Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и его функции плотности распределения вероятностей. Записать основные свойства функции плотности распределения двумерных случайных векторов.	6
1.7 Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать свойства независимых случайных величин. Сформулировать определение попарно независимых случайных величин и случайных величин, независимых в совокупности.	6
1.8 Понятие условного распределения. Доказать формулу для вычисления условного ряда распределения одной компоненты двумерного дискретного случайного вектора при условии, что другая компонента приняла определенное значение. Записать формулу для вычисления условной плотности распределения одной компоненты двумерного непрерывного случайного вектора при условии, что другая компонента приняла определенное значение.	7
1.9 Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать критерий независимости двух случайных величин в терминах условных распределений.	7
1.10 Понятие функции случайной величины. Указать способ построения ряда распределения функции дискретной случайной величины. Сформулировать теорему о плотности распределения функции от непрерывной случайной величины.	8

1.11	Понятие скалярной функции случайного векторного аргумента. Доказать формулу для нахождения значения функции распределения случайной величины Y , функционально зависящей от случайных величин X_1 и X_2	8
1.12	Сформулировать и доказать теорему о формуле свертки.	8
1.13	Сформулировать определение математического ожидания случайной величины (дискретный и непрерывный случаи). Записать формулы для вычисления математического ожидания функции от случайной величины. Сформулировать свойства математического ожидания. Механический смысл математического ожидания.	8
1.14	Сформулировать определение дисперсии случайной величины. Записать формулы для вычисления дисперсии в дискретном и непрерывном случае. Сформулировать свойства дисперсии. Механический смысл дисперсии.	9
1.15	Сформулировать определения начального и центрального моментов случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия как моменты. Сформулировать определение квантили и медианы случайной величины.	9
1.16	Сформулировать определение ковариации случайных величин. Записать формулы для вычисления ковариации в дискретном и непрерывном случаях. Сформулировать свойства ковариации.	9

1 Рубежный контроль 3

1.1 Сформулировать определения случайной величины и функции распределения вероятностей случайной величины. Записать основные свойства функции распределения.

Случайной величиной естественно называть числовую величину, значение которой зависит от того, какой именно **элементарный исход** произошел в результате эксперимента со случайным исходом. Множество всех значений, которые случайная величина может принимать, называют **множеством возможных значений** этой **случайной величины**.

Определение

Пусть (Ω, β, P) — вероятностное пространство.

Случайной величиной называется функция $X : \Omega \rightarrow R$ Такая, что $\forall x \in \mathbb{R}$ множество $\{\omega : X(\omega) < x\} \in \beta$.

Определение

Функцией распределения вероятностной случайной величины X называется отображение $F_X : R \rightarrow R$, определяется правилом $F_X(x) = P\{X < x\}$

Свойства

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$;
2. $0 \leq F(x) \leq 1$;
3. $F(x_1) \leq F(x_2)$, при $x_1 < x_2$ (F_x — не убывающая функция);
4. $P\{a \leq X < b\} = F_X(b) - F_X(a)$;
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} F_x(x) = F_X(x_0)$ — функция распределения непрерывна слева в каждой точке x_0 .

1.2 Сформулировать определение дискретной случайной величины; понятие ряда распределения. Сформулировать определение непрерывной случайной величины и функции плотности распределения вероятностей.

Определение: Дискретная

Случайная величина называется дискретной, если множество ее возможных значений конечно или счетно.

Если множество значений дискретной случайной величины конечно, то закон ее распределения можно задать с использованием таблицы.

Определения

Таблицу 2 называется рядом распределения дискретной случайной величины.

Таблица 1 – Все возможные значения СВ X $p_i = P\{X = x_i\}, i = \overline{1, n}$

X	x_1	x_2	\dots	x_n
P	p_1	p_2	\dots	p_n

Определение

Случайной величиной X называется непрерывной, если $\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}$ значение $F_X(x)$ можно представить в виде: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$ При этом f называется функцией плотностью распределения случайной величины X .

1.3 Сформулировать определение непрерывной случайной величины.

Записать основные свойства функции плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины.

Свойства

1. $f(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}$;
2. $P\{x_1 \leq X < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$;
3. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ - условие нормировки;
4. $P\{x_0 \leq X < x_0 + \Delta x\} \approx f(x_0)\Delta x$, где Δx — мало, а f — непрерывна в точке x_0 ;
5. Если X — непрерывна СВ, то для \forall наперед заданной точке $x_0 P\{X = x_0\} = 0$.

1.4 Сформулировать определения случайного вектора и его функции распределения вероятностей. Записать свойства функции распределения двумерного случайного вектора.

Определение

n - мерным случайным вектором называется кортеж (X_1, \dots, X_n) , где $x_i, i = \overline{1, n}$ — СВ, заданные на одном вероятностном пространстве.

Определение

Функцией распределения случайная вектора

$X^{\rightarrow} = (x_1, \dots, x_n)$ называется отображение $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, определенной правилом $F(x_1, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n\}$.

Свойства

1. $0 \leq F(x_1, x_2) \leq 1$
2.
 - при фиксированном x_2 функция $F(x_1, x_2)$, как функция переменная x_1 является неубывающей
 - аналогично x_2

3. $\lim_{x_1 \rightarrow -\infty} F_x(x_1, x_2) = 0, \lim_{x_2 \rightarrow -\infty} F_x(x_1, x_2) = 0;$
4. $\lim_{x_2 \rightarrow +\infty, x_1 \rightarrow +\infty} F(x_1, x_2) = 1$
5. $\lim_{x_2 \rightarrow +\infty, x_1 = \text{const}} F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1), \lim_{x_1 \rightarrow +\infty, x_2 = \text{const}} F(x_1, x_2) = F_{X_2}(x_2)$
6. $P\{a_1 \leq X_1 < b_1, a_2 \leq X_2 < b_2\} = F(a_1, a_2) + F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2)$
7. При фиксированном x_2 функция $F(x_1, x_2)$ как функция переменной x_1 является непрерывной слева во векторе. Аналогично x_1

1.5 Сформулировать определение дискретного случайного вектора; понятие таблицы распределения двумерного случайного вектора. Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и его функции плотности распределения вероятностей.

Определение

Случайный вектор $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ называется дискретным, если каждая из случайных величин $X_i, i = \overline{1, n}$ является дискретной.

Таблица распределения

Рассмотрим случай $n=2$

Пусть:

1. (X, Y) - двумерный вектор — дискретный;
2. будем считать, что X и Y принимают конечное множество значений.

$$X \in \{x_1, \dots, x_n\}, Y \in \{y_1, \dots, y_n\}$$

Это означает, что случайный вектор (X, Y) может принимать значения $(x_i, y_j), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$. Закон распределения такого вектора часто задают таблицей:

Таблица 2 — $p_{ij} = P\{(X, Y) = (x_i, y_j)\} = P\{\{X = x_i\} \cdot \{Y = y_j\}\} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$, при этом достаточно выполняется условие нормировки $\sum_{m=1}^i \sum_{n=1}^j p_{ij} = 1;$

XY	y_1	\dots	y_j	\dots	y_n	P_X
x_1	p_{11}	\dots	p_{1j}	\dots	p_{1n}	p_{x1}
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
x_i	p_{i1}	\dots	p_{ij}	\dots	p_{in}	p_{xi}
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
x_m	p_{m1}	\dots	p_{mj}	\dots	p_{mn}	p_{xm}
p_y	p_{y1}	\dots	p_{yj}	\dots	p_{yn}	1

Определение

Случайный вектор (X_1, \dots, X_n) называется непрерывным, если его функцию распределения можно представить в виде:

$$F_X(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} dt_1 \int_{-\infty}^{x_2} dt_2 \dots \int_{-\infty}^{x_n} dt_n. \quad (1)$$

При том функция f называется функцией плотности распределения вероятностей случайного вектора (X_1, \dots, X_n) .

1.6 Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и его функции плотности распределения вероятностей. Записать основные свойства функции плотности распределения двумерных случайных векторов.

Свойства для $n = 2$

1. $f(x_1, x_2) \geq 0$;
2. $P\{a_1 \leq X_1 \leq b_1, a_2 \leq X_2 \leq b_2\} = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2) dx_2$;
3. $\int_{R_1} \int f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$;
4. $P\{x_1 \leq X_1 < x_1 + \Delta x_1, x_2 \leq X_2 < x_2 + \Delta x_2\} \approx f(x_1, x_2) \Delta x_1 \Delta x_2$, если (x_1, x_2) - точка непрерывности функции f ;
5. Если (X_1, X_2) — непр. случайные вектор, то для \forall наперед заданного (x_1^0, x_2^0) , $P\{(X_1, X_2 = (x_1^0, x_2^0))\} = 0$;
6. $P\{(X_1, X_2) \in D\} = \int_D \int f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$;
7. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 = f_{x_1}(x_1) \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 = f_{x_2}(x_2)$

1.7 Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать свойства независимых случайных величин. Сформулировать определение попарно независимых случайных величин и случайных величин, независимых в совокупности.

Это не надо, но мне жалко это выкидывать

Пусть

- 1) (X, Y) — дискретный случайны вектор множество значений, которого конечно;
- 2) причем $X \in \{x_1, \dots, x_m\} Y \in \{y_1, \dots, y_n\}$;
- 3) $x_1 < \dots < x_m, y_1 < \dots < y_n$.

В случае такого случайного вектора (X, Y) определение независимых случайных величин по аналогии с определением событий можно сформулировать так:

X, Y называют независимыми., если $P\{(X, Y) = (x_i, y_j)\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\}$; $\{P\{\{X = x_i\}\{Y = y_j\}\}\} i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$

Это надо

Определение

Случайные величины X и Y называются независимыми, если $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, где F — совместная функция распределения случайных величин X и Y .

F_X, F_Y — маргинальная функция распределения случайных величин X и Y .

Свойства

Определение — пока что выдуманное

Случайные величины X_1, \dots, X_n называются независимыми попарно, если $F(x_1, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_n}(x_n)$, где F — совместная функция распределения случайных величин $X_i, \forall i, j = \overline{1, n}, i \neq j$.

1.8 Понятие условного распределения. Доказать формулу для вычисления условного ряда распределения одной компоненты двумерного дискретного случайного вектора при условии, что другая компонента приняла определенное значение. Записать формулу для вычисления условной плотности распределения одной компоненты двумерного непрерывного случайного вектора при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

- Пусть дан двумерный СВектор (X, Y) и известно, что СВ Y принимает значение y .

- Пусть (X, Y) — дискретный СВектор; . Пусть для некоторого j . Условной вероятностью того, что СВ X примет значение x_i при условии что Y принимает значение y_j , называется число ; набор вероятностей называется условным распределением СВ X .

- Пусть (X, Y) — непрерывный СВектор. Условной функцией распределения СВ X при условии называется отображение Условной плотностью распределения СВ X при условии $Y=y$ называется функция , где $f(x, y)$ — совместная плотность распределения СВектора.

1.9 Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать критерий независимости двух случайных величин в терминах условных распределений.

- Пусть (X, Y) — двумерный случайный вектор. Тогда:

1. СВ X, Y независимы
2. Если (X, Y) — НСВектор, то X, Y независимы
3. Если (X, Y) — ДСВектор, то X, Y независимы

1.10 Понятие функции случайной величины. Указать способ построения ряда распределения функции дискретной случайной величины. Сформулировать теорему о плотности распределения функции от непрерывной случайной величины.

• СВ Y , которая каждому значению СВ X ставит в соответствие число y , называют скалярной функцией скалярной СВ X . При этом сама Y также является случайной величиной: если X – ДСВ, то Y – также ДСВ; если X – НСВ, то Y может быть НСВ, ДСВ или СВ смешанного типа.

• Если X – ДСВ, то ряд распределения Y строится следующим образом – в первой строке записываются значения y , а во вторую строку переписываются значения p .

• Теорема: если X – НСВ с плотностью распределения $f(x)$, $\varphi(y)$ – монотонная и непрерывно дифференцируемая скалярная функция, а $\varphi'(y)$ – обратная к $\varphi(y)$, то для СВ функция распределения $F(y)$.

1.11 Понятие скалярной функции случайного векторного аргумента. Доказать формулу для нахождения значения функции распределения случайной величины Y , функционально зависящей от случайных величин X_1 и X_2 .

• Пусть (X_1, X_2) – СВектор, $\varphi(y)$ – скалярная функция. СВ называют скалярной функцией случайного вектора.

• Теорема: Пусть (X_1, X_2) – НСВектор и $\varphi(y)$. Тогда Доказательство: эквивалентны. Следовательно, $F(y) = \int_{-\infty}^y f(x) dx$.

1.12 Сформулировать и доказать теорему о формуле свертки.

• Теорема: пусть (X, Y) – СВектор, непрерывный и независимый, а Доказательство: Т.к. X, Y независимы, то следовательно Наконец, Выражение

1.13 Сформулировать определение математического ожидания случайной величины (дискретный и непрерывный случаи). Записать формулы для вычисления математического ожидания функции от случайной величины. Сформулировать свойства математического ожидания. Механический смысл математического ожидания.

• ДСВ: Математическим ожиданием СВ X называется число μ , которое пробегает множество всех значений X .

НСВ: Математическим ожиданием СВ X называется число μ , где $f(x)$ – плотность распределения НСВ X . • Если X – СВ, $\varphi(y)$ – скалярная функция, то для ДСВ и для НСВ.

- Механический смысл математического ожидания: пусть есть стержень, обладающий «вероятностной массой» и в x_i лежит её p_i часть. Тогда математическое ожидание задаёт x_0 – центр тяжести для этого стержня. В случае НСВ, $f(x)$ можно интерпретировать как «плотность» бесконечного стержня. Свойства МО: 1) Если X принимает значение x_0 с вероятностью 1 (т.е. не является СВ), то $MX=x_0$. 2) 3) 4) Если X и Y независимые, то

1.14 Сформулировать определение дисперсии случайной величины. Записать формулы для вычисления дисперсии в дискретном и непрерывном случае. Сформулировать свойства дисперсии. Механический смысл дисперсии.

- Дисперсией СВ X называют математическое ожидание квадрата отклонения СВ X от её среднего значения: $DX = M(X - MX)^2$. Для ДСВ: $DX = \sum (x_i - MX)^2 p_i$; для НСВ: $DX = \int (x - MX)^2 f(x) dx$. Механический смысл. Дисперсия представляет собой второй момент центрированной СВ X : $DX = M(X^2) - (MX)^2$ //комментарий автора: это не ix в нулевой, это ix с кружочком сверху
- Свойства дисперсии:

- 1) Если СВ X принимает всего одно значение C с вероятностью 1, то $DX = 0$
- 2) $DX \geq 0$
- 3) $DX = 0$ тогда и только тогда, когда X принимает одно значение с вероятностью 1
- 4) , если X и Y – независимые СВ.

1.15 Сформулировать определения начального и центрального моментов случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия как моменты. Сформулировать определение квантили и медианы случайной величины.

- Начальным моментом K -го порядка СВ X называют математическое ожидание K -й степени этой СВ: MX^K .

- Центральным моментом K -го порядка X называют математическое ожидание K -й степени величины $X - MX$.

- Математическое ожидание СВ X – совпадает с моментом первого порядка. Дисперсия совпадает с центральным моментом 2-го порядка.

- Квантилью СВ X уровня a называется число x_a , определяемое соотношением $P(X \leq x_a) = a$. Медианой СВ X называется её квантиль уровня 0.5.

1.16 Сформулировать определение ковариации случайных величин. Записать формулы для вычисления ковариации в дискретном и непрерывном случаях. Сформулировать свойства ковариации.

- Ковариацией СВ X и Y называется число $COV(X, Y) = M(XY) - MX \cdot MY$ где $m_1=MX$, $m_2=MY$. Если X, Y – ДСВ, то ковариация $COV(X, Y) = \sum (x_i - MX)(y_i - MY) p_{ij}$; если НСВ - $COV(X, Y) = \int (x - MX)(y - MY) f(x, y) dx dy$.

• Свойства ковариации:

1)

2) , если X, Y – независимые СВ

3)

4)

5) Равенство верно тогда и только тогда, когда СВ X, Y связаны линейной зависимостью, т.е. .

6)