

Continuidad de operadores pseudo-diferenciales en el toro

Manuel Alejandro Martínez Flores



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ciencias y Humanidades



Continuidad de operadores pseudo-diferenciales en el
toro

Trabajo de graduación en modalidad de Tesis presentado por
Manuel Alejandro Martínez Flores
Para optar al grado académico de Licenciado en Matemática Aplicada

Guatemala, TODO del 2025

Vo.Bo.:

(f) _____
Dr. Duván Cardona

Tribunal Examinador:

(f) _____
Dr. Duván Cardona

(f) _____
TODO

(f) _____
TODO

Fecha de aprobación: Guatemala, TODO.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

Prefacio	III
Lista de Figuras	VI
Lista de Cuadros	VII
Resumen	VIII
1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Justificación	3
4. Antecedentes	4
5. Preliminares	5
5.1. Espacios de Lebesgue en \mathbb{R}^n y \mathbb{T}^n	5
5.2. Transformada de Fourier en \mathbb{R}^n	8
5.3. Transformada de Fourier en \mathbb{T}^n	12
5.4. Distribuciones y espacios de Sobolev en \mathbb{R}^n	12
5.5. Distribuciones y espacios de Sobolev en \mathbb{R}^n	12
5.6. Espacios de Hardy en \mathbb{R}^n y \mathbb{T}^n	12
6. Operadores pseudo-diferenciales	13
6.1. Definición y propiedades básicas en \mathbb{R}^n	13
6.2. Definición y propiedades básicas en \mathbb{T}^n	13
7. Continuidad de operadores pseudo-diferenciales	14
7.1. Continuidad en espacios de Lebesgue	14
7.2. Continuidad en espacios de Sobolev	14
8. Conclusiones	15
9. Recomendaciones	16

<i>ÍNDICE</i>	v
Bibliografía	18
Anexos	19
A. Planos de Construcción	19

Lista de Figuras

Lista de Cuadros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

CAPÍTULO 1

Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eget consequat risus. Praesent a quam lacinia, consequat eros id, auctor tellus. Phasellus a dapibus arcu, vitae luctus leo. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac velit quam. Nullam risus nibh, lobortis vehicula elit non, pellentesque volutpat odio. Donec feugiat porta sapien gravida interdum. Cras odio nunc, lobortis sed pellentesque imperdiet, facilisis eu quam. Praesent pharetra, orci at tincidunt lacinia, neque nulla ornare lacus, ut malesuada elit risus non mi. Fusce pellentesque vitae sapien sed mollis. Curabitur viverra at nulla vitae porta. In et mauris lorem.

Vestibulum faucibus fringilla justo, eget facilisis elit convallis sit amet. Morbi nisi metus, hendrerit quis pellentesque non, faucibus at leo. Proin consectetur, est vel facilisis facilisis, arcu felis vestibulum quam, et fringilla metus neque at enim. Nunc justo mauris, egestas quis maximus eget, viverra vehicula nunc. Fusce eu nulla elementum, condimentum diam at, aliquam leo. Nullam sed sodales enim, eu imperdiet risus. Aliquam ornare augue leo, fringilla mattis nunc facilisis eget. Nam faucibus, libero a aliquet fermentum, magna arcu ultrices lacus, a placerat tortor turpis ut purus.

Integer eget ligula non metus egestas rutrum sit amet ut tellus. Aliquam vel convallis est, eu sodales leo. Proin consequat nisi at nunc malesuada gravida. Aliquam erat volutpat. Aliquam finibus interdum dignissim. Etiam feugiat hendrerit nisl, hendrerit feugiat ex malesuada in. Cras tempus eget arcu vitae congue. Ut non tristique mauris. Vivamus in mattis ipsum. Cras bibendum, enim bibendum commodo accumsan, ligula nulla porttitor ex, et pharetra eros nisl eget ex. Morbi at semper arcu. Curabitur massa sem, maximus id metus ut, molestie tempus quam. Vivamus dictum nunc vitae elit malesuada convallis. Donec ac semper turpis, non scelerisque justo. In congue risus id vulputate gravida. Nam ut mattis sapien.

2.1. Objetivo General

Revisar y exponer los conceptos fundamentales en el estudio de operadores pseudo-diferenciales, detallando teoremas y demostraciones importantes para su entendimiento e investigación.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir y explicar los conceptos clave para el estudio de operadores pseudo-diferenciales
- Desarrollar con rigor matemático las bases teóricas de los operadores pseudo-diferenciales
- Introducir de forma accesible al estado del arte en la investigación de operadores pseudo-diferenciales

El estudio de los operadores pseudo-diferenciales es esencial en el análisis moderno, con aplicaciones clave en ecuaciones diferenciales parciales (EDP), análisis armónico y teoría espectral. Sin embargo, la falta de recursos en español sobre el tema representa una barrera significativa para estudiantes e investigadores hispanohablantes, limitando su acceso a herramientas avanzadas y reduciendo las oportunidades de formación especializada. Esta carencia no solo dificulta el aprendizaje autónomo, sino que también desincentiva la investigación en áreas teóricas y aplicadas donde estos operadores son fundamentales, como el análisis de regularidad de soluciones de EDP's. Este trabajo busca reducir esta brecha, proporcionando una exposición clara y rigurosa de los operadores pseudo-diferenciales en el toro y sus propiedades de continuidad. Permitiendo así, el acceso a conceptos avanzados y contribuyendo a fortalecer la comunidad matemática en español, promoviendo la investigación y la innovación en un campo con amplias proyecciones teóricas y aplicadas.

En el caso euclidiano, Calderón y Vaillancourt demostraron que los operadores pseudo-diferenciales con símbolos en la clase $S_{\rho,\rho}^0(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ son acotados en $L^2(\mathbb{R}^n)$ para algún $0 \leq \rho < 1$, véase [4, 5]. Este resultado no puede extenderse cuando $\rho = 1$, es decir, existen símbolos en $S_{1,1}^0(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ cuyos operadores pseudo-diferenciales asociados no son acotados en L^2 ; para un argumento clásico de este hecho debido a Hörmander, consúltese [9]. Además, Fefferman [10] probó la acotación $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ -BMO(\mathbb{R}^n) para operadores pseudo-diferenciales con símbolos en la clase $S_{\rho,\delta}^m(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, con $m = -n(1 - \rho)/2$ donde $0 \leq \delta < \rho \leq 1$. Fefferman también obtuvo la acotación en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para estas clases cuando $m \leq -n(1 - \rho)|1/p - 1/2|$ y $1 < p < \infty$. En vista de ejemplos clásicos debidos a Wainger y Hirschman, el resultado de Fefferman es óptimo para multiplicadores de Fourier. Cabe destacar que el desarrollo histórico del problema de la acotación en L^p de operadores pseudo-diferenciales ha sido discutido en \mathbb{R}^n , por ejemplo, en [13, 17].

Los operadores pseudo-diferenciales con símbolos en las clases de Hörmander pueden definirse en variedades C^∞ mediante cartas locales. Por ello, se considera el toro $\mathbb{T}^n := \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ como un grupo aditivo cociente y una n -variedad, con el atlas preferido de sistemas de coordenadas dado por la aplicación de restricción $x \mapsto x + \mathbb{Z}^n$ en conjuntos abiertos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, véase McLane [11]. Se nota que en [1], Agranovich proporciona una definición global de operadores pseudo-diferenciales en el círculo $\mathbb{S}^1 = \mathbb{T}^1$, en lugar de la formulación local que trata al círculo como una variedad. Mediante la transformada de Fourier, esta definición se extendió al toro \mathbb{T}^n . Además, se ha demostrado que las clases (ρ, δ) de Agranovich y Hörmander son equivalentes, gracias al teorema de equivalencia de McLane [11]. En este trabajo, se consideran operadores pseudo-diferenciales toroidales en el contexto del cálculo pseudo-diferencial en el toro desarrollado por Ruzhansky, Turunen y Vainniko [14, 15]. Asimismo, cotas L^p en el círculo que pueden extenderse al toro se encuentran en [18], en el marco clásico de la teoría de Calderón-Zygmund. Por otro lado, el análogo toroidal del resultado de Fefferman fue probado por Delgado en [8] para el toro, aunque aún se requiere que $\delta < \rho$. Se nota que, para $0 \leq \delta < 1$ y $0 < \rho \leq 1$, Álvarez y Hounie [2] probaron la acotación $L^p(\mathbb{R}^n)$ - $L^q(\mathbb{R}^n)$ de operadores pseudo-diferenciales cuando $p \leq q$, incluso con $\delta \geq \rho$. Este resultado fue extendido al caso toroidal en [7]. Para otros trabajos sobre acotación L^p de operadores pseudo-diferenciales, se remite al lector a [6, 12, 16].

En este capítulo se revisarán aspectos básicos del análisis armónico en \mathbb{R}^n y \mathbb{T}^n . Se recuerda que \mathbb{R}^n es un grupo aditivo respecto a la suma usual de vectores con subgrupo aditivo \mathbb{Z}^n . Entonces, se define al toro n -dimensional como el grupo cociente $\mathbb{T}^n := \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$. Además, el toro puede ser identificado con el conjunto $[0, 1)^n$ y se le puede considerar con la topología cociente. A lo largo de este trabajo, se fijará la medida de Lebesgue en \mathbb{R}^n . Para cualquier punto $x := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, se denotará la norma euclídeana como

$$|x| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Sin embargo, podría ser problemático considerar potencias negativas de la norma euclídeana, debido a que se desvanece en cero. Por lo que se considerará una función que se comporta asintóticamente similar, pero no presenta el mismo problema

$$\langle x \rangle := \sqrt{1 + |x|^2}.$$

5.1. Espacios de Lebesgue en \mathbb{R}^n y \mathbb{T}^n

Sea Ω un subconjunto medible de \mathbb{R}^n . Por simplicidad, se supondrá que Ω es abierto o cerrado.

Definición 5.1.1. Dado $1 \leq p < \infty$. Se dice que una función medible $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ se encuentra en $L^p(\Omega)$ si su norma

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

es finita. Para el caso $p = \infty$, se dice que $f \in L^\infty(\Omega)$ si es esencialmente acotada. Es decir, si

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} := \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)| < \infty,$$

donde $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|$ se define como el menor número real M tal que es mayor que $|f(x)|$ casi para todo $x \in \Omega$, i.e. excepto fuera de un conjunto de medida cero.

Cabe destacar que en realidad los elementos de los espacios $L^p(\Omega)$ son clases de equivalencias de funciones iguales casi en todo $x \in \Omega$. Sin embargo, es un detalle técnico menor y se acostumbra a tratarlos como funciones. Además, cuando Ω sea claro por el contexto, simplemente se denotará $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ como $\|\cdot\|_{L^p}$. Ahora, se discutirán propiedades importantes de los espacios de Lebesgue.

Proposición 5.1.2 (Desigualdad de Young). *Sean $1 < p, q < \infty$, tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Entonces para todos $a, b > 0$, se tiene que*

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Como consecuencia, para $f \in L^p(\Omega)$ y $g \in L^q(\Omega)$, se tiene que $fg \in L^1(\Omega)$ y

$$\|fg\|_{L^1} \leq \frac{1}{p}\|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{q}\|g\|_{L^q}^q.$$

Demostración. Esto es consecuencia del hecho que $x \mapsto e^x$ es una función convexa. Entonces

$$ab = e^{\ln a + \ln b} = e^{\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q} \leq \frac{1}{p} e^{\ln a^p} + \frac{1}{q} e^{\ln b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Completando así la prueba. □

Particularmente cuando $p = 2 = q$, se tiene la conocida como desigualdad de Cauchy.

Proposición 5.1.3 (Desigualdad de Hölder). *Sean $1 \leq p, q \leq \infty$, tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Entonces, para $f \in L^p(\Omega)$ y $g \in L^q(\Omega)$, se tiene que $fg \in L^1(\Omega)$ y*

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Demostración. Para el caso $p = 1$ o $p = \infty$, el resultado es trivial. Así que se considerará el caso $1 < p < \infty$, que es una aplicación de la proposición anterior. Primero, se supone que $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^q} = 1$. Entonces, se tiene que

$$\|fg\|_{L^1} \leq \frac{1}{p}\|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{q}\|g\|_{L^q}^q = 1.$$

Ahora, se nota que si $\|f\|_{L^p}$ o $\|g\|_{L^q}$ se anulan, entonces se trivializa la desigualdad. Por lo que se puede considerar el caso más general en el que ninguna de las normas se anula de la siguiente manera

$$\left\| \frac{f}{\|f\|_{L^p}} \frac{g}{\|g\|_{L^q}} \right\|_{L^1} \leq 1.$$

El resultado sigue de la linealidad de la norma L^1 . □

En el caso $p = 2 = q$ se obtiene la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Proposición 5.1.4 (Desigualdad de Minkowski). *Dado $1 \leq p \leq \infty$, sean $f, g \in L^p(\Omega)$. Entonces se tiene que*

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Particularmente, $\|\cdot\|_{L^p}$ satisface la desigualdad triangular y $L^p(\Omega)$ es un espacio normado.

Demostración. Para $p = 1$ o $p = \infty$ el resultado se obtiene gracias a la desigualdad triangular del módulo en los números complejos. Ahora, para $1 < p < \infty$ se tiene que

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{L^p}^p &\leq \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} (|f| + |g|) dx \\ &= \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |f| dx + \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |g| dx \\ &\leq \left(\int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)\frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left[\left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{1/p} \right] \\ &= \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}). \end{aligned}$$

Aquí, la primera desigualdad es la desigualdad triangular de los números complejos y la segunda es la desigualdad de Hölder, por lo que se concluye lo deseado. □

Ahora se introducen dos resultados importantes y de bastante utilidad. Sin embargo, sus demostraciones requieren de herramientas de teoría de la medida o del análisis complejo que se encuentran fuera del alcance de este trabajo. Por lo que simplemente se enuncian y se recomienda al lector investigar los detalles.

Proposición 5.1.5 (Monotonía de la norma L^p). *Sea $f : \Omega_1 \times \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ y sea $1 \leq p \leq \infty$. Se supone que $f(\cdot, y) \in L^p(\Omega_1)$ para casi todo y , y que $y \mapsto \|f(\cdot, y)\|_{L^p}$ se encuentra en $L^1(\Omega_2)$. Entonces $f(x, \cdot) \in L^1(\Omega_2)$ para casi todo x , la función $x \mapsto \int_{\Omega_2} f(x, y) dy$ se encuentra en $L^p(\Omega_1)$, y*

$$\left\| \int_{\Omega_2} f(\cdot, y) dy \right\|_{L^p(\Omega_1)} \leq \int_{\Omega_2} \|f(\cdot, y)\|_{L^p(\Omega_1)} dy.$$

A continuación se presenta un resultado clásico de la interpolación de operadores y espacios de funciones. Para una discusión más profunda de estas técnicas, se recomienda revisar Bergh y Löfstrom [3].

Teorema 5.1.6 (Interpolación de Riesz-Thorin). *Sea $T : L^{p_0}(\Omega) + L^{p_1}(\Omega) \rightarrow L^{q_0}(\Omega) + L^{q_1}(\Omega)$ un operador lineal tal que*

$$\|Tf\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}, \quad \|Tf\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}.$$

Para cualquier $0 < \theta < 1$, se definen

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

Entonces, T extiende a un operador continuo de $L^{p_\theta}(\Omega)$ en $L^{q_\theta}(\Omega)$. Además,

$$\|Tf\|_{L^{q_\theta}} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^{p_\theta}}.$$

Se continúa con el programa de definiciones y propiedades en los espacios de Lebesgue.

Definición 5.1.7 (Convoluciones). Para funciones $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ se define su convolución como

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy.$$

Se puede notar que el cambio de variable $y \mapsto x-u$ implica la conmutatividad, es decir $f * g = g * f$.

Nota 5.1.8. En la definición anterior existe la pregunta sobre la convergencia de la integral. Para definir la convolución de forma rigurosa, se podría definir primero para funciones que cumplan condiciones de regularidad más fuertes, como las del espacio de Schwartz que se definirá en la siguiente sección, para luego definir el operador $*$: $L^1 \times L^1 \rightarrow L^1$ que estaría bien definido gracias a la siguiente propiedad.

Proposición 5.1.9 (Desigualdad de Young para convoluciones). *Sean $1 \leq p, q, r \leq \infty$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$, y sean $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$. Entonces se tiene que*

$$\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Demostración. Se nota que gracias al teorema 5.1.6 es suficiente demostrar

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}, \quad \|f * g\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^t}, \quad (5.1.1)$$

para $\frac{1}{t} + \frac{1}{p} = 1$. En efecto, bastaría con considerar el operador $f * \cdot$, los parametros

$$p_0 = 1, \quad p_1 = t, \quad q_0 = p, \quad q_1 = \infty.$$

y $\|f\|_{L^p}$ como ambas constantes de estimación. Al aplicar la interpolación

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{p} + \frac{\theta}{\infty}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{t},$$

se obtiene la condición indicada para los parametros p, q, r . Ahora, se procede a demostrar el primer estimativo de (5.1.1). Este se obtiene como resultado de la monotonía de la norma L^p , véase la proposición 5.1.5. En efecto,

$$\begin{aligned} \|f * g\|_{L^p} &= \left\| \int_{\mathbb{R}^n} f(\cdot - y)g(y) \, dy \right\|_{L^p} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \|f(\cdot - y)\|_{L^p} |g(y)| \, dy \\ &\leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}. \end{aligned}$$

Por otra parte, el segundo estimativo es resultado de la desigualdad de Hölder

$$\begin{aligned} \|f * g\|_{L^\infty} &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| \, dy \\ &\leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^t}. \end{aligned}$$

Concluyendo con el resultado deseado. \square

Se concluye esta sección con un resultado importante sobre convergencia en espacios L^p

Teorema 5.1.10 (Convergencia dominada de Lebesgue). *Sea $(f_k)_{k=1}^\infty$ una secuencia de funciones medibles en Ω tales que convergen puntualmente a f para casi todo $x \in \Omega$. Se supone que existe $g \in L^1(\Omega)$ tal que $|f_k| \leq g$ para todo k . Entonces f es integrable y*

$$\int_{\Omega} f \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, dx.$$

Nota 5.1.11. Una implicación del resultado anterior es el hecho que los espacios L^p son completos, y por consecuencia son espacios de Banach. Particularmente, el espacio L^2 es un espacio de Hilbert con producto interno dado por

$$\langle f, g \rangle_{L^2} := \int_{\Omega} f \bar{g} \, dx,$$

donde \bar{z} es el conjugado en los números complejos.

5.2. Transformada de Fourier en \mathbb{R}^n

Ahora, se procede a definir y mostrar propiedades importantes de la transformada de Fourier, una herramienta fundamental para el estudio de las ecuaciones diferenciales en general y los operadores pseudo-diferenciales en particular.

Definición 5.2.1 (Transformada de Fourier en \mathbb{R}^n). Dada $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, se define su transformada de Fourier como

$$(\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n} f)(\xi) = \widehat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) \, dx,$$

para cualquier $\xi \in \mathbb{R}^n$.

Proposición 5.2.2. *La transformada de Fourier es un operador continuo $\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n} : L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ con norma uno:*

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^1}.$$

Además, \widehat{f} es continua en todas partes.

Demostración. El estimativo es resultado de la desigualdad de Minkowski para integrales clásica

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) \, dx \right| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-2\pi i x \cdot \xi}| |f(x)| \, dx \\ &\leq \|f\|_{L^1}. \end{aligned}$$

Ahora, la continuidad es consecuencia del teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Para cualquier $\xi_k \rightarrow \xi$ se define

$$h_k(x) := e^{-2\pi i x \cdot \xi_k} f(x)$$

Entonces, se tiene que $|h_k| \leq |f|$ y se obtiene que

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi_k} f(x) dx.$$

Que es exactamente $\widehat{f}(\xi) = \lim \widehat{f}(\xi_k)$, el resultado deseado. \square

A pesar de que la transformada de Fourier está bien definida en el espacio $L^1(\mathbb{R}^n)$, este presenta ciertas limitaciones técnicas debido a los pocos requerimientos de regularidad para las funciones en este espacio. Es muy útil tener acceso a otras herramientas resultantes de continuidad, diferenciabilidad, y decaimiento. Por lo tanto, se introduce notación que será importante a lo largo de este trabajo.

Definición 5.2.3 (Notación de multi-índice). Para $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \beta := (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{N}_0^n$, se define

$$\partial^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}.$$

De forma similar, $x^\beta := x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n}$. Se dice que $\alpha \leq \beta$ si $\alpha_i \leq \beta_i$ para todo i . Además, se denota la longitud del multi-índice como $|\alpha| := \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ y su factorial como $\alpha! := \alpha_1! \cdots \alpha_n!$.

Definición 5.2.4 (Espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$). Se dice que una función suave (infinitamente diferenciable) $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ se encuentra en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ si se cumple que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta \partial^\alpha \varphi(x)| < \infty,$$

para cualesquiera multi-índices $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$. Ahora, se dice que $\varphi_j \rightarrow \varphi$ en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ si

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta \partial^\alpha (\varphi_j - \varphi)(x)| \rightarrow 0,$$

cuando $j \rightarrow \infty$ para cualesquiera multi-índices $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$.

Proposición 5.2.5. Para cualquier $1 \leq p \leq \infty$ se tiene que $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ con encaje continuo.

Demostración. El caso $p = \infty$ es trivial, pues las funciones en el espacio de Schwartz son acotadas por definición. Sea $\varphi_j \rightarrow 0$ en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, entonces

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_j(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle x \rangle^{pN} |\varphi_j(x)|^p \langle x \rangle^{-pN} dx \\ &\lesssim \max_{|\beta| \leq N} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta \varphi_j(x)|^p \int_{\mathbb{R}^n} \langle x \rangle^{-pN} dx \\ &\rightarrow 0, \end{aligned}$$

donde $N \in \mathbb{N}$ se escoge de manera que la última integral converga. \square

Teorema 5.2.6. Sea $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Entonces $2\pi i \xi_j \widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{\partial_j \varphi}(\xi)$ y $2\pi i x_j \widehat{\varphi}(\xi) = -\partial_j \widehat{\varphi}(\xi)$

Demostración. Para la primera expresión se procede por integración por partes

$$\begin{aligned} \widehat{\partial_j \varphi}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \partial_{x_j} \varphi(x) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_{\xi_j} e^{-2\pi i x \cdot \xi}) \varphi(x) dx \\ &= 2\pi i \xi_j \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

Se nota que no aparece el término con la frontera debido a que φ se desvanece en el infinito. Ahora, para la segunda expresión

$$\partial_{\xi_j} \widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} (-2\pi i x_j) \varphi(x) dx.$$

Concluyendo la prueba. □

Por lo que se puede concluir lo siguiente

Corolario 5.2.7. *Sea $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Entonces,*

$$\xi^\beta \partial^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) = (2\pi i)^{|\alpha| - |\beta|} (-1)^{|\alpha|} \widehat{\partial^\beta [x^\alpha \varphi]}(\xi).$$

Por lo que

$$\begin{aligned} |\xi^\beta \partial^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)| &\leq |2\pi i|^{|\alpha| - |\beta|} \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\beta [x^\alpha \varphi(x)]| dx \\ &\leq |2\pi i|^{|\alpha| - |\beta|} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(1 + |x|)^{n+1} \partial^\beta [x^\alpha \varphi(x)]| \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|)^{-n-1} dx \\ &= C \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(1 + |x|)^{n+1} \partial^\beta [x^\alpha \varphi(x)]| \\ &< \infty. \end{aligned}$$

Particularmente, $\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n}$ mapea $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ en sí mismo. Además, por el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, la transformada de Fourier es un operador continuo.

En realidad, es un isomorfismo en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Para ello se demostrarán algunos lemas útiles.

Lema 5.2.8 (Fórmula de multiplicación para la transformada de Fourier). *Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}g dx = \int_{\mathbb{R}^n} f\widehat{g} dx$.*

Demostración. Aplicando el teorema de Fubini

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}g dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot y} f(y) dy \right] g(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot y} g(x) dx \right] f(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f\widehat{g} dy \end{aligned}$$

Concluyendo la prueba. □

Lema 5.2.9 (Transformada de Fourier para Gaussiana). *Se tiene que*

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} e^{-\varepsilon \pi^2 |x|^2} dx = (\pi \varepsilon)^{-n/2} e^{-|\xi|^2 / \varepsilon},$$

para todo $\varepsilon > 0$. Gracias al cambio de variable $x \mapsto 2\pi x$ y $\varepsilon \mapsto 2\varepsilon$, esto equivale a

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} e^{-\varepsilon^2 |x|^2 / 2} dx = (2\pi / \varepsilon)^{-n/2} e^{-|\xi|^2 / (2\varepsilon)}.$$

Demostración. La segunda expresión sigue del caso unidimensional

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-it\tau} e^{-t^2/2} dt &= e^{-\tau^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t+i\tau)^2/2} dt \\ &= e^{-\tau^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt \\ &= \sqrt{2\pi} e^{-\tau^2/2}. \end{aligned}$$

Con el cambio de variable $t \mapsto \sqrt{\varepsilon}t$ y $\tau \mapsto \tau/\sqrt{\varepsilon}$ se tiene que

$$\sqrt{\varepsilon} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-it\tau} e^{-\varepsilon t^2/2} dt = \sqrt{2\pi} e^{-\tau^2/(2\varepsilon)}.$$

El caso multidimensional sigue del producto de las integrales unidimensionales. \square

Teorema 5.2.10 (Fórmula de inversión de Fourier). *La transformada de Fourier es un isomorfismo de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ en sí mismo con inverso dado por*

$$(\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n}^{-1}f)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot \xi} f(\xi) d\xi.$$

Demostración. El teorema de convergencia dominada de Lebesgue permite realizar la sustitución

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n}^{-1}\widehat{\varphi})(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot \xi} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot \xi} \widehat{\varphi}(\xi) e^{-2\varepsilon\pi^2|\xi|^2} d\xi \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i(x-y) \cdot \xi} \varphi(y) e^{-2\varepsilon\pi^2|\xi|^2} dy d\xi. \end{aligned}$$

Con el cambio de variable $y \mapsto y + x$ se obtiene que

$$(\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n}^{-1}\widehat{\varphi})(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i y \cdot \xi} \varphi(y+x) e^{-2\varepsilon\pi^2|\xi|^2} dy d\xi.$$

Por el teorema de Fubini y la transformada de Fourier para Gaussianas se tiene que

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n}^{-1}\widehat{\varphi})(x) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y+x) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i y \cdot \xi} e^{-2\varepsilon\pi^2|\xi|^2} d\xi dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y+x) (2\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|y|^2/(2\varepsilon)} dy \end{aligned}$$

Con un último cambio de variable $y \mapsto \sqrt{\varepsilon}z$ se concluye

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}_{\mathbb{R}^n}^{-1}\widehat{\varphi})(x) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\sqrt{\varepsilon}z+x) (2\pi)^{-n/2} e^{-|z|^2/2} dz \\ &= (2\pi)^{-n/2} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2/2} dz = \varphi(x). \end{aligned}$$

Finalizando con la prueba. \square

El siguiente teorema relaciona la transformada de Fourier con las convoluciones

Teorema 5.2.11. *Sean $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ entonces se cumple que $\widehat{\varphi * \psi}(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi)\widehat{\psi}(\xi)$ y que $\widehat{\varphi\psi}(\xi) = (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})(\xi)$.*

Demostración. Para la primera expresión se tiene que

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi * \psi}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} (\varphi * \psi)(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i(x-y) \cdot \xi} \varphi(x-y) e^{-2\pi i y \cdot \xi} \psi(y) dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i z \cdot \xi} \varphi(z) e^{-2\pi i y \cdot \xi} \psi(y) dy dz \\ &= \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi). \end{aligned}$$

Ahora, para la segunda expresión

$$\begin{aligned}
 (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(\xi - y) \widehat{\psi}(y) dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot (\xi - y)} \varphi(x) \widehat{\psi}(y) dx dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot y} \widehat{\psi}(y) dy \right] e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(x) \psi(x) dx = \widehat{\varphi\psi}(\xi).
 \end{aligned}$$

Completando la prueba. \square

5.3. Transformada de Fourier en \mathbb{T}^n

TODO TODO

5.4. Distribuciones y espacios de Sobolev en \mathbb{R}^n

En esta sección se inicia introduciendo el espacio de distribuciones templadas que permite extender la transformada de Fourier a un espacio más general que $L^1(\mathbb{R}^n)$.

Definición 5.4.1 (Distribuciones templadas $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$). Se define el *espacio de distribuciones templadas* como el espacio de funcionales lineales continuos $u : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$. En este caso, se entiende la continuidad en el sentido que si $\varphi_j \rightarrow \varphi$ en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, entonces se tiene que $u(\varphi_j) \rightarrow u(\varphi)$ en \mathbb{C} . Además, se dice que $u_j \rightarrow u$ en $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ si $u_j(\varphi) \rightarrow u(\varphi)$ para todo $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

Las funciones en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ se les conoce como las funciones de prueba del espacio de distribuciones templadas. Otra notación usual para $u(\varphi)$ es $\langle u, \varphi \rangle$.

Nota 5.4.2 (Funciones como distribuciones). Se puede considerar a $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ como una distribución templada. Se define el funcional u_f de la siguiente manera

$$\langle u_f, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} f \varphi dx.$$

Claramente es un funcional lineal. La continuidad es resultado de la desigualdad de Hölder y el encaje continuo de las funciones de prueba en el espacio L^q . En efecto, para $\varphi_j \rightarrow \varphi$ en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ se tiene que

$$|\langle u_f, \varphi_j \rangle - \langle u_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^p} \|\varphi_j - \varphi\|_{L^q}.$$

Por simplicidad se denota $\langle u_f, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle$.

Particularmente, para $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, se puede motivar la definición de distintas propiedades de distribuciones mediante la manipulación del funcional u_φ mencionado anteriormente. Por ejemplo, en vista de la integración por partes tenemos que

$$\langle \partial_j \varphi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_j \varphi) \psi dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi (\partial_j \psi) dx = -\langle \varphi, \partial_j \psi \rangle.$$

Por lo que definimos la derivada en el sentido de distribuciones de la siguiente manera

Definición 5.4.3.

5.5. Distribuciones y espacios de Sobolev en \mathbb{R}^n

TODO TODO

5.6. Espacios de Hardy en \mathbb{R}^n y \mathbb{T}^n

TODO TODO

6.1. Definición y propiedades básicas en \mathbb{R}^n

TODO TODO

6.2. Definición y propiedades básicas en \mathbb{T}^n

TODO TODO

Continuidad de operadores pseudo-diferenciales

7.1. Continuidad en espacios de Lebesgue

TODO TODO

7.2. Continuidad en espacios de Sobolev

TODO TODO

CAPÍTULO 8

Conclusiones

CAPÍTULO 9

Recomendaciones

- [1] Agranovich, M. S.: *Spectral properties of elliptic pseudodifferential operators on a closed curve*. Functional Analysis and Its Applications, 13(4):279–281, 1980.
- [2] Alvarez, J. y J. Hounie: *Estimates for the kernel and continuity properties of pseudo-differential operators*. Arkiv för Matematik, 28(1–2):1–22, 1990.
- [3] Bergh, J. y J. Lofstrom: *Interpolation spaces*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. 1976.
- [4] Calderón, A. P. y R. Vaillancourt: *On the boundedness of pseudo-differential operators*. Journal of the Mathematical Society of Japan, 23(2), 1971.
- [5] Calderón, A. P. y R. Vaillancourt: *A class of bounded pseudo-differential operators*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 69(5):1185–1187, 1972.
- [6] Cardona, D.: *Weak type $(1,1)$ bounds for a class of periodic pseudo-differential operators*. Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, 5(4):507–515, 2014.
- [7] Cardona, D. y M. A. Martínez: *Boundedness of pseudo-differential operators on the torus revisited, I*. 2025. preprint.
- [8] Delgado, J.: *L^p -bounds for pseudo-differential operators on the torus*. En *Pseudo-Differential Operators, Generalized Functions and Asymptotics*, páginas 103–116. 2013.
- [9] Duoandikoetxea, J.: *Fourier Analysis*. American Mathematical Society, Providence, 2001.
- [10] Fefferman, C.: *L^p bounds for pseudo-differential operators*. Israel Journal of Mathematics, 14(4):413–417, 1973.
- [11] McLean, W.M.: *Local and global description of periodic pseudo-differential operators*. Mathematische Nachrichten, 150:151–161, 1991.
- [12] Molahajloo, S. y M.W. Wong: *Pseudo-differential operators on \mathbb{S}^1* . En Rodino, L. y M.W. Wong (editores): *New Developments in Pseudo-differential Operators*, páginas 297–306. Birkhäuser, 2008.
- [13] Nagase, M.: *On some classes of L^p -bounded pseudodifferential operators*. Osaka Journal of Mathematics, 23(2):425–440, 1986.
- [14] Ruzhansky, M. y M. Turunen: *On the Fourier analysis of operators on the torus*. En Toft, J., M.W. Wong y H. Zhu (editores): *Modern Trends in Pseudo-Differential Operators*, volumen 172 de *Operator Theory: Advances and Applications*, páginas 87–105. Birkhäuser, 2007.

- [15] Ruzhansky, M. y V. Turunen: *Pseudo-differential operators and symmetries: Background analysis and advanced topics*. Birkhäuser, Basel, 2010.
- [16] Ruzhansky, M. y V. Turunen: *Quantization of Pseudo-Differential Operators on the torus*. Journal of Fourier Analysis and Applications, 16:943–982, 2010.
- [17] Wang, L.: *Pseudo-differential operators with rough coefficients*. Tesis de Doctorado, McMaster University, 1997.
- [18] Wong, M. W.: *Discrete Fourier Analysis*. Birkhäuser, 2011.

ANEXO A

Planos de Construcción
