

# TUM Analysis für Informatik [MA0902], WiSe 2022/2023

Mitschriften basierend auf der Vorlesung von Prof. Dr. Silke Rolles

Zuletzt aktualisiert: 24. Februar 2023

# Introduction

## About

Hier sind die wichtigsten Konzepte / Formeln der Analysis Vorlesung von Prof. Dr. Silke Rolles im Wintersemester 2022/2023 zusammengefasst.

Die erstellten Notizen sind stark an den Vorlesungsfolien von Prof. Dr. Silke Rolles orientiert.

Die Mitschriften selbst sind in Markdown geschrieben und werden mithilfe einer GitHub-Action nach jedem Push mithilfe von [Pandoc](#) zu einem PDF konvertiert.

Eine stets aktuelle Version der PDFs kann über [analysis\\_für\\_informatik\\_MA0902\\_WS2223\\_merge.pdf](#)

## How to Contribute

1. Fork [this](#) Repository
2. Commit and push your changes to **your** forked repository
3. Open a Pull Request to this repository
4. Wait until the changes are merged

## Contributors



# Inhaltsverzeichnis

Introduction . . . . .	1
About . . . . .	1
How to Contribute . . . . .	1
Contributors . . . . .	1
<b>1. Reelle Zahlen</b>	<b>5</b>
1.1 Zahlenmengen . . . . .	5
Definition Abzählbarkeit . . . . .	5
Anordnung von Körpern . . . . .	5
1.2 Eigenschaften der reellen Zahlen . . . . .	5
Beschränktheit . . . . .	5
Supremumsaxiom in den reellen Zahlen . . . . .	5
$\mathbb{R}$ ist archimedisch . . . . .	6
Die rationalen Zahlen liegen dicht in $\mathbb{R}$ . . . . .	6
1.3 Wichtige Ungleichungen . . . . .	6
Dreiecksungleichung . . . . .	6
Cauchy-Schwarz Ungleichung . . . . .	6
<b>2. Folgen</b>	<b>7</b>
2.0 Definition . . . . .	7
Rechenregeln Grenzwerte . . . . .	7
2.1 Konvergenz . . . . .	7
Definition Konvergenz . . . . .	7
Definition Divergenz . . . . .	7
Asymptotische Äquivalenz . . . . .	7
Beschränktheit . . . . .	8
Einschließungsregel . . . . .	8
2.2 Monotone Folgen . . . . .	8
Definition . . . . .	8
Hilfreiche Formeln . . . . .	8
<b>3. Reihen</b>	<b>9</b>
3.1 Definition . . . . .	9
Definition . . . . .	9
Hilfreiche Reihen . . . . .	9
3.2 Konvergenzkriterien . . . . .	9
Notwendige Bedingung . . . . .	9
Majorantenkriterium . . . . .	9
Minorantenkriterium . . . . .	10
Quotientenkriterium . . . . .	10
Leibnitz Kriterium (Alternierende Reihen) . . . . .	10
3.3 Wert einer Reihe . . . . .	10
Wert einer Reihe . . . . .	10
3.4 Rechenregeln Reihen . . . . .	11
Addition von Reihen . . . . .	11
Multiplikation mit einer Konstanten . . . . .	11
Addition von konvergenten und divergenten Reihen . . . . .	11
Divergenz des Kehrwertes . . . . .	11

Umordnungssatz . . . . .	11
Multiplikation von Reihen . . . . .	11
3.5 Eigenschaften der Exponentialfunktion . . . . .	11
<b>4. Stetigkeit</b>	<b>12</b>
4.1 Definition . . . . .	12
Definition Stetigkeit . . . . .	12
Beispiel Stetigkeit einer Funktion $f : \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ . . . . .	12
Konvergenz von Folgen in $\mathbb{R}^d$ . . . . .	12
Stetigkeit der Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$ . . . . .	12
Komposition stetiger Funktionen . . . . .	12
4.2 Zwischenwertsatz . . . . .	13
4.3 Häufungspunkte . . . . .	13
Satz von Bolzano-Weierstrass . . . . .	13
4.4 Existenz von Maxima und Minima . . . . .	13
Abgeschlossenheit von Mengen . . . . .	13
Beschränktheit von Mengen . . . . .	13
Kompaktheit von Mengen . . . . .	14
Satz von Maximum und Minimum . . . . .	14
<b>5. Wichtige Funktionen</b>	<b>15</b>
5.1 Umkehrfunktion . . . . .	15
Definition Umkehrfunktion . . . . .	15
Stetigkeit von Umkehrfunktionen . . . . .	15
5.2 Logarithmus . . . . .	15
Definition Logarithmus . . . . .	15
Asymptotisches Verhalten von $\exp$ und $\ln$ . . . . .	15
Allgemeine Potenzfunktion . . . . .	16
5.3 Trigonometrische Funktionen . . . . .	16
Reihendarstellung der Trigonometrischen Funktionen . . . . .	16
Umkehrfunktionen der Trigonometrischen Funktionen . . . . .	16
<b>Differenzierbarkeit</b>	<b>17</b>
Landau Symbole . . . . .	17
Definition . . . . .	17
Spezielle Ableitungen . . . . .	17
Ableitungsregeln . . . . .	18
Ableitungsregeln für Potenzen . . . . .	18
Ableitungen Triigonometrischer Funktionen . . . . .	18
Kettenregel . . . . .	18
Ableitung der Umkehrfunktion . . . . .	18
Beispiele . . . . .	18
<b>Anwendungen der Ableitung</b>	<b>19</b>
Extrema . . . . .	19
Mittelwertsatz . . . . .	19
Verallgemeinerter Mittelwertsatz . . . . .	19
Spezialfall Satz von Rolle . . . . .	19
Monotonie . . . . .	19
Monotoniekriterium . . . . .	20
Hinreichende Kriterien für Extrema . . . . .	20
Berechnung von Grenzwerten . . . . .	20
Regel von L'Hospital . . . . .	20
Höhere Ableitungen . . . . .	20
Krümmungsverhalten . . . . .	20
Kurvendiskussion . . . . .	21
<b>Integration</b>	<b>22</b>
Riemann Integration . . . . .	22
Bestimmtes Integral . . . . .	22

Eigenschaften . . . . .	22
Mittelwertsatz . . . . .	22
Stammfunktion . . . . .	22
Integrationsmethoden . . . . .	23
Partialbruchzerlegung . . . . .	23
Partielle Integration . . . . .	23
Integration durch Substitution . . . . .	23
<b>Mehr über Integrale</b>	<b>24</b>
Uneigentliche Integrale . . . . .	24
Parameterabhängige Integrale . . . . .	24
Vertauschung von Summation und Integration . . . . .	25
Abschätzungen von Summen und Reihen . . . . .	25
Integralkriterium für Konvergenz von Reihen . . . . .	26
<b>Potenzreihen</b>	<b>27</b>
Taylorsche Formel . . . . .	27
Restglied . . . . .	27
Konvergenzradius . . . . .	28
Cauchy-Hadamard-Kriterium . . . . .	28
Analytische Funktionen . . . . .	28
<b>Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher</b>	<b>29</b>
Partielle Ableitung . . . . .	29
Gradient . . . . .	29
Total differenzierbare Funktionen . . . . .	29
Tangentialebene . . . . .	29
Hesse-Matrix . . . . .	29
Extremwerte . . . . .	30
Vorgehensweise zur Bestimmung von Extrema . . . . .	30
Totale Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}^n$ . . . . .	30
Jacobimatrix . . . . .	30
<b>Differenzialgleichungen</b>	<b>31</b>
Anfangswertprobleme . . . . .	31
Separierbare DGL . . . . .	31
Inhomogene DGL erster Ordnung . . . . .	31
Variation der Konstanten . . . . .	31
Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung . . . . .	32

# 1. Reelle Zahlen

## 1.1 Zahlenmengen

### Definition Abzählbarkeit

$A$  ist abzählbar, wenn es eine surjektive Abbildung von  $\mathbb{N}$  auf  $A$  gibt. ( $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ )

- Mit anderen Worten:  $A$  kann durchnummeriert werden
- Beispiele:
  - $\mathbb{Q}$  ist abzählbar (Alle Brüche können “schlangenartig” durchnummeriert werden, siehe Diagonalargument)
  - $\mathbb{R}$  ist nicht abzählbar (Widerspruchsbeweis)

### Anordnung von Körpern

Der Körper  $\mathbb{R}$  ist angeordnet da:

1.  $\forall a \in \mathbb{R}$  gilt entweder:
  - $a = 0$  oder
  - $a > 0$  oder
  - $a < 0$
2.  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  mit  $a, b > 0$  gilt:
  - $a + b > 0$  und
  - $a \cdot b > 0$

Der Körper  $\mathbb{C}$  kann nicht angeordnet werden da:

- Angenommen: Sei  $a \in \mathbb{C}$  und  $a \neq 0$  dann muss entweder:
  - $a > 0$ , und laut definition von Anordnung auch  $a \cdot a > 0$  oder
  - $-a > 0$ , und somit auch  $(-a) \cdot (-a) = a^2 > 0$
- Somit gilt in jedem Fall  $a^2 > 0$ 
  - Sei  $a = i$  dann gilt  $a^2 = -1$
  - Das ist ein Widerspruch

## 1.2 Eigenschaften der reellen Zahlen

### Beschränktheit

Eine Menge  $M \subseteq \mathbb{R}$  ist nach oben beschränkt, falls sein  $s_0 \in \mathbb{R}$  existiert, sodass  $\forall s \in M$  gilt:  $s \leq s_0$

- Die Zahl  $s_0$  heißt obere Schranke von  $M$

### Supremumsaxiom in den reellen Zahlen

Jede nichtleere, nach oben beschränkte Menge von  $\mathbb{R}$  hat eine kleinste obere Schranke, diese heißt  $\sup M \in \mathbb{R}$

Jede nichtleere, nach unten beschränkte Menge von  $\mathbb{R}$  hat eine größte untere Schranke, diese heißt  $\inf M \in \mathbb{R}$

Falls das Supremum oder das Infimum einer Menge  $M$  auch selbst in  $M$  liegt, dann wird es auch als Maximum bzw. Minimum von  $M$  bezeichnet

- Konventionen:
  - $\sup M = \infty$  falls  $M$  nicht nach oben beschränkt ist
  - $\inf M = -\infty$  falls  $M$  nicht nach unten beschränkt ist
  - $\sup \emptyset = -\infty$

### **$\mathbb{R}$ ist archimedisch**

$\forall a \in \mathbb{R}$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $a < n$

### **Die rationalen Zahlen liegen dicht in $\mathbb{R}$**

$\forall a, b \in \mathbb{R}$  mit  $a < b$  existiert  $r \in \mathbb{N}$  mit  $a < r < b$

## **1.3 Wichtige Ungleichungen**

### **Dreiecksungleichung**

$\forall x, y \in \mathbb{R}$  gilt:

- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $|x + y| \geq ||x| - |y||$

### **Cauchy-Schwarz Ungleichung**

$\forall x, y \in \mathbb{R}$  gilt:

- $|\langle x, y \rangle| \leq ||x| \cdot |y||$
- “Der Betrag vom Skalarprodukt ist kleiner oder gleich dem Produkt der Beträge der Vektoren”

# 2. Folgen

## 2.0 Definition

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist eine Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $n \mapsto a_n$

## Rechenregeln Grenzwerte

Falls  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$  dann gilt:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot a$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$  falls  $b \neq 0$

## 2.1 Konvergenz

### Definition Konvergenz

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert nach  $a \in \mathbb{C}$  falls:

- $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |a_n - a| < \varepsilon$

Kurzschreibweisen:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$
- $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$

### Definition Divergenz

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  divergiert falls:

- $\forall a \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 |a_n - a| \geq \varepsilon$

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  divergiert gegen  $\infty$  / konvergiert uneigentlich falls:

- $\forall K > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 a_n \geq K$

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  divergiert gegen  $-\infty$  / konvergiert uneigentlich falls:

- $\forall K > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 a_n \leq -K$

Teilfolgen

- Sollte es eine Teilfolge geben, die nicht konvergiert, dann ist die gesamte Folge nicht konvergent

### Asymptotische Äquivalenz

Falls  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$  und  $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$  mit  $a, b \neq 0$  dann gilt:

- $a_n \simeq b_n$  falls  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$  bzw.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$

Außerdem: Falls  $a_n \simeq b_n$  dann gilt:



- Es sind entweder beide Folgen konvergent oder beide divergent
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$  gilt nur für konvergente, asymptotisch gleiche Folgen.

## Beschränktheit

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist beschränkt falls  $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} |a_n| \leq K$

- Insbesondere ist eine Folge beschränkt falls sie konvergiert

## Einschließungsregel

Falls  $a_n \leq b_n \leq c_n$  für alle bis auf endlich viele  $n$  dann gilt:

- Falls  $a \in \mathbb{R}$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$  dann gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$

## 2.2 Monotone Folgen

### Definition

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist monoton wachsend falls  $a_n \leq a_{n+1}$  für alle  $n \in \mathbb{N}$

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist monoton fallend falls  $a_n \geq a_{n+1}$  für alle  $n \in \mathbb{N}$

- Zusammenhang mit Supremum und Infimum
  - Falls  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine monoton wachsende Folge ist dann gilt:
    - \*  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$
  - Falls  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine monoton fallende Folge ist dann gilt:
    - \*  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$

### Hilfreiche Formeln

#### Bernoulli-Ungleichung

- $(1+x)^n \geq 1+nx$  für  $x > -1$  und  $n \in \mathbb{N}$

#### Binomialkoeffizienten

- $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

#### Endliche Geometrische Summe

- $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

# 3. Reihen

## 3.1 Definition

### Definition

Eine Reihe  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist eine Reihe für die Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit

- $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$
- Hierbei ist  $s_n$  die n-te Partialsumme der Reihe.

Falls  $s_n$  konvergiert, dann heißt die Reihe konvergent. Der Grenzwert heißt dann der Wert der Reihe.

Falls die Reihe der Absolutbeträge einer Folge konvergiert, dann heißt die ursprüngliche Reihe *absolut konvergent*

### Hilfreiche Reihen

#### Harmonische Reihe

- $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$
- $s_n$  divergiert nach  $\infty$

#### Geometrische Reihe

- $s_n = \sum_{k=0}^n q^k$
- $s_n$  divergiert nach  $\infty$  falls  $|q| \geq 1$  und konvergiert nach  $\frac{1}{1-q}$  falls  $|q| < 1$

#### Teleskopreihe

- $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$
- $s_n$  konvergiert gegen 1

## 3.2 Konvergenzkriterien

### Notwendige Bedingung

Damit  $s_n$  konvergieren kann muss  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  gelten.

### Majorantenkriterium

Falls  $|a_n| \leq b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , und  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , dann ist  $a_n$  konvergent.

Beispiel:

- $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{k^3+k}$
- $a_k = \frac{k}{k^3+k} \leq \frac{k}{k^3} = \frac{1}{k^2}$

- Da  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$  konvergiert, ist auch  $s_n$  konvergent.

### Minorantenkriterium

Falls  $|a_n| \leq b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , und  $a_n$  divergiert, dann ist auch  $b_n$  divergent.

Beispiel:

- $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$
- $a_k = \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{k}$
- Da  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  divergiert, ist auch  $s_n$  divergent.

### Quotientenkriterium

Sei  $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ .

- Falls  $q < 1$ , dann ist konvergiert die Summe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .
- Für  $q > 1$  divergiert diese.
- Ansonsten ist keine Aussage möglich.

Beispiel:

- $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n!}$
- $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$
- Da  $q < 1$ , ist  $s_n$  konvergent.

### Leibnitz Kriterium (Alternierende Reihen)

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  monoton fallend mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

- Dann konvergiert die alternierende Reihe  $s = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$

Beispiel:

- $s_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{2^k}$
- Da  $a_k = \frac{1}{2^k}$  monoton fallend ist, und gegen 0 konvergiert, ist  $s_n$  konvergent.

## 3.3 Wert einer Reihe

### Wert einer Reihe

Die Summe einer Reihe ist der Grenzwert der Partialsummen.

Beispiele für konvergente Reihen:

- $\lim_{x \downarrow 0} x^a =$ 
  - 0 falls  $a > 0$
  - 1 falls  $a = 0$
  - $\infty$  falls  $a < 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a =$ 
  - 0 falls  $a < 0$
  - 1 falls  $a = 0$
  - $\infty$  falls  $a > 0$

- $\lim_{x \downarrow 0} \ln(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$

### 3.4 Rechenregeln Reihen

#### Addition von Reihen

Seien  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  und  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  **konvergente** Reihen. Dann folgt, dass auch die Summe der Beiden Reihen konvergiert:

- $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$

#### Multiplikation mit einer Konstanten

Falls  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  eine konvergente Reihe ist, dann konvergiert auch  $\sum_{k=1}^{\infty} c \cdot a_k$  mit  $c \in \mathbb{R}$ .

#### Addition von konvergenten und divergenten Reihen

Seien  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  eine konvergente Reihe und  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  eine divergente Reihe. Dann divergiert auch die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ .

#### Divergenz des Kehrwertes

Sei  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  eine konvergente Reihe positiver Zahlen. Dann divergiert  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k}$ .

#### Umordnungssatz

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konvergiert absolut} \iff \sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Jede Umordnung von Reihenelementen muss gegen denselben Grenzwert konvergieren.

#### Multiplikation von Reihen

Sind  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  und  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  absolut konvergent, dann ist auch  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$  mit  $c_k = \sum_{l=0}^{\infty} a_l b_{k-l}$  (Cauchy-Produkt) absolut konvergent.

### 3.5 Eigenschaften der Exponentialfunktion

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad \exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

- $\exp(w + z) = \exp(w) * \exp(z)$
- $\exp(0) = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)} \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $\exp(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist streng monoton wachsend
- $|\exp(z)| \leq \exp(|z|) \quad \forall z \in \mathbb{C}$

# 4. Stetigkeit

## 4.1 Definition

### Definition Stetigkeit

Eine Funktion  $f : \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^q$  mit Definitionsbereich  $\mathbb{D}$  ist stetig im Punkt  $x$  falls:

- Für alle Folgen  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  in  $\mathbb{D}$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  gilt:

$$- \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$$

- Man schreibt auch:

$$- \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ist eine Funktion in allen Punkten  $x \in \mathbb{D}$  stetig, nennt man sie auch *stetig*.

### Beispiel Stetigkeit einer Funktion $f : \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$

Um die Stetigkeit einer Funktion  $f : \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  zu prüfen zeige, dass:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$

Beispiel:  $f(x) = |x|$

- $|f(x) - f(x_0)| = ||x| - |x_0|| \leq |x_n - x_0|$ 
  - Für  $x_n \rightarrow x_0$  gilt  $|x_n - x_0| \rightarrow 0$
  - $\implies f$  ist stetig

### Konvergenz von Folgen in $\mathbb{R}^d$

Eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  in  $\mathbb{R}^d$  konvergiert gegen einen Punkt  $x \in \mathbb{R}^d$ , falls alle Komponenten der Folge gegen die entsprechenden Komponenten von  $x$  konvergieren.

Beispiel:

- $x_n = (1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{n^2})$
- Die Folge konvergiert gegen den Punkt  $(1, 0)$  da die Komponenten gegen 1 bzw. 0 konvergieren

### Stetigkeit der Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$

Die Exponentialfunktion  $e^x$  ist in  $\mathbb{C}$  stetig.

### Komposition stetiger Funktionen

Seien  $f : \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^q$  und  $g : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^s$  stetige Funktionen. Dann ist auch  $g \circ f$  stetig.

Beispiele für stetige Funktionen:

- $f(x) = c$
- $f(x) = x$
- $f(x, y) = x + y$
- $f(x, y) = x \cdot y$

- $f(x, y) = \frac{x}{y}$  mit  $\mathbb{D} = \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$

Damit sind auch Summen und Produkte stetiger Funktionen stetig.

- Somit sind insbesondere auch Polynome stetig
- Rationalen Funktionen mit  $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$  mit  $p$  und  $q$  Polynomen sind auf ihrem Definitionsbereich stetig

## 4.2 Zwischenwertsatz

Falls eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig auf dem Intervall  $[a, b]$  ist, dann nimmt sie jeden Wert zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$  an.

Beispiel:

- Hat  $f(x) = \cos(x) - x$  eine Nullstelle auf  $[0, \pi/2]$ ?
  - $f(0) = 1$  und  $f(\pi/2) = -\pi/2$
  - Da die Funktion stetig ist, nimmt sie auf  $[0, \pi/2]$  jeden Wert zwischen 1 und  $-\pi/2$  an. Somit  $\exists x \in [0, \pi/2]$  mit  $f(x) = 0$

## 4.3 Häufungspunkte

Sei  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  eine Teilfolge von  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- Dann heißt  $a^*$  ein *Häufungspunkt* von  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  falls es eine Teilfolge mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a^*$  gibt

Falls die Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert, dann ist der Häufungspunkt der Folge gleich dem Grenzwert.

Beispiel:

- $a_n = (-1)^n$
- Diese Folge hat die Teilfolgen  $(a_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$  und  $(a_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$  welche jeweils konstant 1 bzw  $-1$  sind.
  - Somit hat die Folge  $a_n$  den Häufungspunkt 1 und  $-1$

## Satz von Bolzano-Weierstrass

Jede beschränkte Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  hat mindestens eine konvergente Teilfolge und somit auch mindestens einen Häufungspunkt.

Diese Aussage lässt sich auch auf  $\mathbb{R}^d$  mit  $d \geq 2$  übertragen. Dabei heißt eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit  $x_n \in \mathbb{R}^d$  beschränkt, falls:

- $\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} \ ||x_n||_2 \leq M.$

## 4.4 Existenz von Maxima und Minima

Ein Punkt  $x \in D$  heißt:

- Minimumstellen von  $f$  falls  $f(x) \leq f(y)$  für alle  $y \in D$
- Maximumstellen von  $f$  falls  $f(x) \geq f(y)$  für alle  $y \in D$

Nicht jede Funktion hat ein Maximum bzw. Minimum (z.B.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$ )

## Abgeschlossenheit von Mengen

Eine Menge  $A \in \mathbb{R}^d$  heißt abgeschlossen, falls der Grenzwert jeder Konvergenten Folgen aus  $A$  wieder in  $A$  liegt.

- $x_n \in A \forall n$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \implies x \in A$

## Beschränktheit von Mengen

Eine Menge  $A \in \mathbb{R}^d$  heißt beschränkt, falls es eine positive Zahl  $M$  gibt, sodass für alle  $x \in A$   $|x| \leq M$  gilt.

## Kompaktheit von Mengen

Eine Menge  $A \in \mathbb{R}^d$  heißt kompakt, falls sie abgeschlossen und beschränkt ist.

Beispiel:  $[0, 1]$

- $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$  ist abgeschlossen, da für alle  $0 \leq x_n \leq 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  gilt, dass  $x \in [0, 1]$
- Diese Menge ist auch beschränkt, da z.B.  $|x| \leq 1$  für alle  $x \in [0, 1]$ 
  - Somit ist  $[0, 1]$  kompakt

Beispiel:  $[0, 1)$

- Diese Menge ist nicht abgeschlossen, da z.B.  $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n} = 1$  und  $1 \notin [0, 1)$
- Somit ist diese Menge auch nicht kompakt.

Jede kompakte Menge  $K \in \mathbb{R}$   $K \neq \emptyset$  ist beschränkt und besitzt somit auch ein Maximum und ein Minimum.

Wenn  $K \in \mathbb{R}^d$  kompakt ist  $\iff$  Jede Folge aus  $K$  besitzt eine Konvergente Teilfolge mit Grenzwert in  $K$ .

Wenn  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  stetig ist und  $K$  kompakt ist, dann ist auch  $f(K)$  bzw. das Bild von  $f$  kompakt.

- Somit ist insbesondere auch  $f([a, b])$  kompakt, falls  $f$  stetig ist. Somit besitzt  $f([a, b])$  auch ein Maximum und ein Minimum.

## Satz von Maximum und Minimum

Jede stetige Funktion  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  besitzt ein Maximum und ein Minimum in  $K$ , falls  $K$  kompakt ist.

Somit existieren  $\underline{x}, \bar{x} \in K$  mit  $f(\underline{x}) \leq f(x) \leq f(\bar{x})$  für alle  $x \in K$ .

- $\underline{x} = \arg \min_{x \in K} f(x)$  bzw.  $f(\underline{x}) = \min_{x \in K} f(x)$
- $\bar{x} = \arg \max_{x \in K} f(x)$  bzw.  $f(\bar{x}) = \max_{x \in K} f(x)$

# 5. Wichtige Funktionen

## 5.1 Umkehrfunktion

### Definition Umkehrfunktion

Eine Funktion  $f : \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^q$  heißt bijektiv, falls für alle  $y \in B$  genau ein  $x \in \mathbb{D}$  existiert, sodass  $f(x) = y$  gilt.

- Man schreibt auch:  $f^{-1} : B \rightarrow \mathbb{D}, y \mapsto x$

### Stetigkeit von Umkehrfunktionen

Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige, und streng monoton wachsende Funktion.

- Dann ist  $f : I \rightarrow f(I)$  bijektiv.
- Und  $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$  stetig und streng monoton wachsend.

## 5.2 Logarithmus

### Definition Logarithmus

Der natürliche Logarithmus ist definiert als:

- $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $x \mapsto \ln(x)$

Er ist die Umkehrfunktion von  $e^x$ . Somit gilt auch:

- $e^{\ln(x)} = x$  für alle  $x \in (0, \infty)$
- $\ln(e^x) = x$  für alle  $x \in \mathbb{R}$

Rechenregeln:

- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$  für alle  $x, y > 0$
- $\ln(\frac{x}{y}) = \ln(x) - \ln(y)$  für alle  $x, y > 0$
- $\ln(x^k) = k \ln(x)$  für alle  $k \in \mathbb{Z}$  und  $x > 0$

Wichtige Werte:

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(e) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$

### Asymptotisches Verhalten von $\exp$ und $\ln$

- Die Exponentialfunktion wächst schneller gegen unendlich als jedes Polynom:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$
- $x$  wächst schneller gegen unendlich als jede Potenz des Logarithmus:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(\ln x)^m} = \infty$
- Mehrfache Anwendung des Logarithmus führt zu langsamerem Wachstum:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\ln \ln x} = \infty$



## Allgemeine Potenzfunktion

Definition:

- $x^a = e^{a \ln x}$

Spezialfälle:

- $\forall n \in \mathbb{N} : x^n = e^{n \ln x} = e^{\ln x} \cdot e^{\ln x} \dots e^{\ln x} \text{ (n-mal)} = x \cdot x \dots x \text{ (n-mal)}$
- $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ , denn  $(x^{1/n})^n = (e^{\frac{1}{n} \ln x})^n = e^{\ln x} = x$

Logarithmus zur Basis  $b$ :

$$\forall b > 1 \text{ und } a > 0$$

$$\log_b(a) = \frac{\ln(a)}{\ln b}$$

## 5.3 Trigonometrische Funktionen

Komplexe Zahlen mit Betrag 1 können in folgender Form dargestellt werden (Eulersche Formel):

- $e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Dies ist äquivalent zu:

- $\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Daraus können auch die Additionstheoreme für die Trigonometrischen Funktionen abgeleitet werden:

- $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\sin(x + y) = \cos x \sin y + \sin x \cos y$

Außerdem wird der Tangens und die Cotangens definiert als:

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  wenn  $\cos x \neq 0$
- $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$  wenn  $\sin x \neq 0$

## Reihendarstellung der Trigonometrischen Funktionen

Die Trigonometrischen Funktionen können auch als unendliche Summen dargestellt werden:

- $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$
- $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$

Über diese Reihendarstellung lassen sich auch Grenzwerte bestimmen:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}}{x} = \dots = 1$

## Umkehrfunktionen der Trigonometrischen Funktionen

Die Umkehrfunktionen der Trigonometrischen Funktionen sind:

- $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$   
–  $\arcsin(x) : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$   
–  $\arccos(x) : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
- $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (-\infty, \infty)$   
–  $\arctan(x) : (-\infty, \infty) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

# Differenzierbarkeit

## Landau Symbole

- $f(x) = O(g(x))$  für  $x \rightarrow x_0$  wenn:
  - $\exists \epsilon > 0 \quad \exists C > 0 \quad \forall x \text{ mit } ||x - x_0|| < \epsilon \quad |f(x)| \leq C|g(x)|$
  - “f ist in der Nähe von  $x_0$  bis auf Konstanten asymptotisch kleiner gleich g”
- $f(x) = O(g(x))$  für  $x \rightarrow \infty$  wenn:
  - $\exists M > 0 \quad \exists C > 0 \quad \forall x > M \quad |f(x)| \leq C|g(x)|$
  - “Im unendlichen ist f bis auf Konstanten kleiner gleich g”
- $f(x) = o(g(x))$  für  $x \rightarrow x_0$  wenn:
  - $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
  - “f ist asymptotisch kleiner als g”

## Definition

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$  auf einem offenen Intervall  $I \subseteq \mathbb{R}$  ist differenzierbar in  $x_0 \in I$ , falls für eine Zahl  $f'(x_0) \in \mathbb{R}$  folgende Linearisierung gültig ist:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|) \quad \text{für } x \rightarrow x_0$$

Hierbei approximiert die Tangente die Funktion für  $x \rightarrow x_0$  besser als jede andere Gerade:

$$x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Differenzierbarkeit in  $x_0$  impliziert auch Stetigkeit in diesem Punkt.

Die Steigung der Tangente  $f'(x_0)$  bezeichnet man als Ableitung von  $f$  an der Stelle  $x_0$ .

Die Ableitung kann durch Umformung der oben genannten Linearisierung berechnet werden:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0) \\ \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= f'(x_0) \quad (\text{Differenzenquotient}) \end{aligned}$$

- Ist eine Funktion in jedem Punkt differenzierbar so heißt die Funktion differenzierbar.
- Nicht jede stetige Funktion ist differenzierbar (z.B. Betragsfunktion).

## Spezielle Ableitungen

- $f(x) = e^x \quad \longrightarrow \quad f'(x) = e^x$
- $f(x) = \sin x \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \cos x$
- $f(x) = \cos x \quad \longrightarrow \quad f'(x) = -\sin x$

## Ableitungsregeln

- (a)  $(cf)'(x) = cf'(x)$  für alle  $c \in \mathbb{R}$
- (b)  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$  Summenregel
- (c)  $(fg)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$  Produktregel
- (d)  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$  falls  $g(x) \neq 0$  Quotientenregel

## Ableitungsregeln für Potenzen

Ist  $f(x) = x^a$  mit  $a \in \mathbb{R}$ , so gilt:

$$f'(x) = ax^{a-1}$$

## Ableitungen Triigonometrischer Funktionen

- $f(x) = \tan x \longrightarrow f'(x) = 1 + \tan(x)^2 = \frac{1}{\cos(x)^2}$
- $f(x) = \cot x \longrightarrow f'(x) = -1 - \cot(x)^2 = \frac{1}{\sin(x)^2}$

## Kettenregel

- $f(x) = g(h(x)) \longrightarrow f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$

## Ableitung der Umkehrfunktion

- $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$  Falls  $f$  bijektiv und in  $x$  differenzierbar ist.

## Beispiele

Aus der Regel für Ableitung der Umkehrfunktion folgt:

- Ableitung des Logarithmus

$$- \ln'(x) = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x}$$

- Ableitung von arcsin

$$- \arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- Ableitung von arccos

$$- \arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos(x))} = \frac{1}{-\sin(\arccos(x))} = \frac{1}{-\sqrt{1-\cos^2(\arccos(x))}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- Ableitung von arctan

$$- \arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{\sec^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1+x^2}$$

# Anwendungen der Ableitung

## Extrema

Eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  hat bei  $x_0$  ein:

- globales Maximum, wenn  $f(x_0) \geq f(x)$  für alle  $x \in [a, b]$
- globales Minimum, wenn  $f(x_0) \leq f(x)$  für alle  $x \in [a, b]$
- lokales Maximum, wenn es ein  $\epsilon > 0$  gibt, sodass  $f(x_0) \geq f(x)$  für alle  $x \in [x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon] \cap [a, b]$
- lokales Minimum, wenn es ein  $\epsilon > 0$  gibt, sodass  $f(x_0) \leq f(x)$  für alle  $x \in [x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon] \cap [a, b]$

Ersetzt man  $\leq$  mit  $<$  und  $\geq$  mit  $>$  spricht man von strikten Maxima und Minima.

Eine Notwendige Bedingung für ein Maximum oder Minimum ist, dass die Ableitung an der Stelle  $x_0$  gleich 0 ist.

## Mittelwertsatz

Der Mittelwertsatz besagt, dass eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  welche auf dem Intervall  $[a, b]$  stetig ist und auf  $(a, b)$  differenzierbar ist, ein  $\xi \in (a, b)$  besitzt, sodass

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

Das heißt, dass die Steigung der Tangente an der Stelle  $\xi$  gleich der Sekantensteigung zwischen den Punkten  $(a, f(a))$  und  $(b, f(b))$  ist.

## Veralgemeinerter Mittelwertsatz

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

## Spezialfall Satz von Rolle

Ist  $f(a) = f(b)$ , so besitzt  $f$  auf  $(a, b)$  eine waagerechte Tangente.

## Monotonie

Eine Funktion  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ist auf  $I$ :

- monoton steigend, falls
  - $\forall x, y \in I : x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- monoton fallend, falls
  - $\forall x, y \in I : x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$
- streng monoton steigend, falls
  - $\forall x, y \in I : x \leq y \implies f(x) < f(y)$
- streng monoton fallend, falls

## Monotoniekriterium

Ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $[a, b]$  differenzierbar, dann gilt:

- $f'(x) > 0 \ \forall x \in [a, b] \implies f$  ist streng monoton steigend
- $f'(x) < 0 \ \forall x \in [a, b] \implies f$  ist streng monoton fallend
- $f'(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b] \iff f$  ist monoton steigend
- $f'(x) \leq 0 \ \forall x \in [a, b] \iff f$  ist monoton fallend

## Hinreichende Kriterien für Extrema

Eine Funktion nimmt auf einem Intervall  $I$  ein

- **Maximum** an, wenn
  - Die Ableitung links von  $x_0$  stets größer gleich 0 ist und die Ableitung rechts von  $x_0$  stets kleiner gleich 0 ist.
- **Minimum** an, wenn
  - Die Ableitung links von  $x_0$  stets kleiner gleich 0 ist und die Ableitung rechts von  $x_0$  stets größer gleich 0 ist.
- Analog kann man ein lokales Maximum und Minimum bestimmen, wenn man nur einen kleinen Bereich um  $x_0$  betrachtet.

Außerdem:

- $f''(x_0) > 0 \implies f$  hat ein striktes, lokales Minimum an  $x_0$
- $f''(x_0) < 0 \implies f$  hat ein striktes, lokales Maximum an  $x_0$

## Berechnung von Grenzwerten

### Regel von L'Hospital

Ist  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $(a, b)$  differenzierbar und  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \in \{0, \infty\}$ , dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

falls der Grenzwert von  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert.

## Höhere Ableitungen

Die höheren Ableitungen einer Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sind die Funktionen  $f^{(n)} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , welche durch die Rekursion  $f^{(n)}(x) = f^{(n-1)}(x)$  mit  $f^{(0)}(x) = f(x)$  definiert werden.

- $n$ -mal differenzierbar heißt, dass alle Ableitungen bis zur  $n$ -ten Ableitung existieren. (Falls  $n = \infty$  schreibt man  $f \in C^\infty$ )
- $n$ -mal stetig differenzierbar heißt, dass alle Ableitungen bis zur  $n$ -ten Ableitung stetig sind.

## Krümmungsverhalten

Eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist:

- **konvex**
  - falls alle Punkte der Funktion im Intervall  $[a, b]$  unterhalb der Verbindungsline  $(a, f(a))$  und  $(b, f(b))$  liegen.
  - $\iff f''(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b]$
- **strikt konvex**
  - falls  $f''(x) > 0 \ \forall x \in [a, b]$
- **konkav**
  - falls alle Punkte der Funktion im Intervall  $[a, b]$  oberhalb der Verbindungsline  $(a, f(a))$  und  $(b, f(b))$  liegen.

- $\iff f''(x) \leq 0 \ \forall x \in [a, b]$
- **strikt konkav**
  - falls  $f''(x) < 0 \ \forall x \in [a, b]$

## Kurvendiskussion

Bei der Kurvendiskussion geht es darum, das Verhalten einer Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  zu beschreiben.

Man interessiert sich für:

- Definitionsbereich
- Randverhalten
- Unstetigkeiten
- Differenzierbarkeit
- Extrema
- Monotonie
- Krümmung
- Graph

# Integration

## Riemann Integration

Bei der Riemann Integration geht es darum, die Fläche unter einer Kurve zu bestimmen. Dazu wird die Kurve in kleine Rechtecke unterteilt und die Fläche der Rechtecke addiert.

Lässt man die breite der Rechtecke gegen 0 gehen. Erhält man die orientierte Fläche unter der Kurve.

## Bestimmtes Integral

Das Bestimmte Integral ist die Fläche unter der Kurve zwischen zwei Punkten  $a$  und  $b$ .

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

## Eigenschaften

- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^a f(x) dx = 0$

Bestimmte Integrale ( $\int_a^b f(x) dx$ ):

- behalten die positivität der Funktion bei
- behalten die monotonie eigenschaften zwischen zwei Funktionen bei
- haben linearitäts eigenschaften
- sind in Teilintegrale aufteilbar

## Mittelwertsatz

Es gilt:  $\int_a^b f(x)p(x) dx = f(\xi) \int_a^b p(x) dx$  mit  $\xi \in [a, b]$

Falls  $p(x)$  integrierbar ist und  $p(x) > 0$ . Außerdem muss  $f$  stetig sein.

## Stammfunktion

Eine Stammfunktion ist eine Funktion  $F(x)$ , die abgeleitet die Funktion  $f(x)$  ergibt.

Beispiel:

- $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  für  $x \in [a, b]$
- Dies ist der Hauptsatz der Integralrechnung. Es gilt  $F'(x) = f(x)$  falls  $f(x)$  stetig

Alle Stammfunktionen einer Funktion unterscheiden sich nur durch eine Konstante.

Eine Stammfunktion kann auch als unbestimmtes Integral geschrieben werden:  $\int f(t)dt = F(x) + C$

## Integrationsmethoden

### Partialbruchzerlegung

Bei der Partialbruchzerlegung wird eine Funktion in Brüche zerlegt.

zum Beispiel:  $\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}$

Diese können dann leicht integriert werden:

Beispiel:

$$\bullet \int \frac{1}{x^2-4} dx = \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{1}{x+2} dx = \ln|x-2| - \ln|x+2|$$

### Partielle Integration

Bei der partiellen Integration kann ein Produkt von zwei Funktionen elegant integriert werden.

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\text{Beispiel: } \int \sin(x)x dx = -\cos(x)x + \int \cos(x)dx = -\cos(x)x + \sin(x)$$

### Integration durch Substitution

Ein Produkt von zwei Funktionen, von welchen ein Faktor die Ableitung der inneren Funktion der anderen Funktion ist, kann durch Substitution integriert werden.

$$\int_a^b f(g(t))g'(t)dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)dx$$

Beispiel:

$$\begin{aligned} \bullet & \int_1^2 (x^2 + 1)^2 * 2x \, dx \\ & - \text{Wähle } y = x^2 + 1, \text{ damit gilt: } dy = 2x dx \\ & - \text{Es gibt zwei äquivalente Möglichkeiten:} \\ & 1. \int_1^2 (y^2) * \frac{2x}{2x} dy = \int_1^2 y^2 dy = \left[ \frac{y^3}{3} \right]_1^2 = \left[ \frac{(x^2+1)^3}{3} \right]_1^2 = 39 \\ & 2. \int_1^2 (y^2) * \frac{2x}{2x} dy = \int_1^2 y^2 dy = \left[ \frac{y^3}{3} \right]_2^5 = \frac{5^3}{3} - \frac{2^3}{3} = 39 \end{aligned}$$

### Verschiebungsregel

Aus der Substitutionsregel kann man auch die Verschiebung der Grenzen ableiten:

$$\bullet \int_a^b f(x+c)dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x)dx$$

### Skalierungsregel

$$\bullet \int_a^b f(cx)dx = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x)dx$$



# Mehr über Integrale

## Uneigentliche Integrale

Sind die Grenzen des Integrals Unendlich, oder hat die Funktion dort eine Polstelle, kann man einfach den Grenzwert des Integrals verwenden.

Jedoch muss ein Integral auf dem ganzen Bereich wohldefiniert sein. Ansonsten muss es in Teilintegrale aufgeteilt werden.

$$\bullet \int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$$

Beispiel:

$$\bullet \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{-1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-1}{b} - \frac{-1}{1} = 1$$

Es ergibt sich auch:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \text{für } \alpha > 1 \\ \infty & \text{für } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

## Parameterabhängige Integrale

Falls eine Funktion von mehreren Variablen abhängt (z.B.  $f(x, y) = x^2 + y$ ) kann auch nach nur einer der Variablen integriert werden.

Falls  $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig ist, gilt:

- $F(x) = \int_c^d f(x, y)dy$  ist auch stetig
- Satz von Fubini:
  - $\int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx = \int_c^d \int_a^b f(x, y)dx dy$
  - Das heißt, die Reihenfolge der Integrale darf getauscht werden
- Falls  $f$  eine stetige partielle Ableitung  $\partial_y f$  besitzt:
  - $F'(x) = \int_c^d \partial_y f(x, y)dy$
  - Das heißt Integral und Ableitung dürfen vertauscht werden

Beispiel:

- Integralsinus
  - $Si(b) = \int_0^b \frac{\sin(x)}{x} dx$
  - $\lim_{b \rightarrow \infty} Si(b) = \frac{\pi}{2}$

## Vertauschung von Summation und Integration

Existiert eine konvergente Majorante der Summe für alle  $x \in [a, b]$ , so können Integration und Summation vertauscht werden.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx$$

Beispiel:

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-t)^k \quad \forall |t| < 1 \quad (\text{geometrische Reihe})$$

Eine konvergente Majorante für die Summe ist die geometrische Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} |x|^k$  mit  $|t| \leq |x| < 1$ .

Damit kann man Summe und Integration vertauschen:

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^x (-t)^k dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}$$

Da:

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x) \quad \forall |x| < 1$$

folgt gleichzeitig:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

## Abschätzungen von Summen und Reihen

Für ganzzahlige Integrationsgrenzen und einen stetigen und monotonen Integranden können Integrale durch Summen von Funktionswerten und umgekehrt abgeschätzt werden.

- $f$  monoton wachsend:
  - Anschaulich: Das Integral liegt zwischen den Summen der links- bzw. rechtsseitigen Funktionswerte, da die Funktion monoton wachsend ist.
  - Analog liegt die Summe der rechten Funktionswerte zwischen dem Integral des linken und dem des rechten Intervalls.

$$\sum_{k=a}^{b-1} f(x) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \sum_{k=a+1}^b f(x) \leq \int_{a+1}^{b+1} f(x) dx$$

- $f$  monoton fallend:
  - Analog liegt das Integral bei monoton fallenden Funktionen zwischen den Summen der rechten bzw. linken Funktionswerte.
  - Die Summe der rechten Funktionswerte liegt zwischen dem Integral des rechten und des linken Intervalls.

$$\int_{a+1}^{b+1} f(x) dx \leq \sum_{k=a+1}^b f(x) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \sum_{k=a}^{b-1} f(x)$$

## Integralkriterium für Konvergenz von Reihen

Ist  $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  monoton fallend. Dann gilt für  $n \in \mathbb{N}$ :

$$0 \leq \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx \leq f(1)$$

Äquivalent:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ konvergiert} \iff \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ konvergiert}$$

Beispiel: Riemannsche Zetafunktion

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad \forall s > 1$$

Da  $f(x) = \frac{1}{x^s}$  monoton fallend ist, gilt:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \text{ konvergiert} \iff \int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx = \frac{1}{s-1} \text{ konvergiert} \iff s > 1$$

Somit ist  $\zeta(s)$  für  $s > 1$  konvergent.

# Potenzreihen

Wir kennen folgende Potenzreihen:

$$\begin{aligned}e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} & \forall x \in \mathbb{R} \\ \sin(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} & \forall x \in \mathbb{R} \\ \cos(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} & \forall x \in \mathbb{R} \\ \ln(1+x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} & \forall |x| < 1 \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k & \forall |x| < 1 \\ (1+x)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k & \forall |x| < 1 \\ (1+x)^a &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{a}{k} x^k & \forall |x| < 1\end{aligned}$$

## Taylorsche Formel

Ist  $f : (a - \epsilon, a + \epsilon)$  mit  $\epsilon > 0$   $n$ -mal stetig differenzierbar, so gilt:

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n)$$

Für  $h \rightarrow 0$  bezeichnet man:

$$T_{n,a}f(h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (h-a)^k$$

als  $n$ -tes Taylorpolynom von  $f$  um  $a$ .

## Restglied

Es lässt sich zeigen, dass das Restglied folgendermaßen aussieht:

$$R_{n+1}f(a, x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

Dabei ist  $\xi$  ein Punkt zwischen  $a$  und  $x$ .

Insgesamt also:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_{n+1}f(a, x)$$

Für eine beliebig oft differenzierbare Funktion  $f$  **und** das Restglied  $R_{n+1}f(a, x)$  gegen 0 konvergiert, gilt:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Dies ist die Taylorreihe von  $f$  um  $a$ .

## Konvergenzradius

Zu jeder Potenzreihe  $P_n(x)$  gibt es einen Konvergenzradius  $r \geq 0$ :

$$|x| < r \implies \sum_{k=0}^n a_k x^k \text{ konvergiert} \quad |x| > r \implies \sum_{k=0}^n a_k x^k \text{ divergiert}$$

Der Konvergenzradius ist der kleinste  $r$  für den die Potenzreihe konvergiert.

## Cauchy-Hadamard-Kriterium

Falls die Folge  $a_k$  konvergiert, so gilt:

$$r = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}}$$

Damit konvergiert die Potenzreihe, wenn  $|x - a| < r$ . Die Randpunkte  $x = a + r$  und  $x = a - r$  müssen einzeln betrachtet werden.

## Analytische Funktionen

Eine Funktion  $f$  heißt analytisch, wenn sie in einem offenen Gebiet  $U$  in der Nähe eines Punktes  $a$  durch eine Taylorreihe um  $a$  beschrieben werden kann.

Äquivalent: Bei der Konvergenzradius der Potenzreihe  $P_n(x)$  um  $a$  gilt  $r > 0$ .

Sind  $f$  und  $g$  in  $x$  analytisch, mit den Konvergenzradien  $r_f$  und  $r_g$ , so gilt:

1. Die Koeffizienten sind eindeutig bestimmbar:  $a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$
2.  $f'(x)$  ist in  $a$  analytisch und  $f'(x) = \sum_{k=0}^n \frac{d}{dx}(a_k x^k) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}$  wenn  $|x - a| \leq r_f$
3.  $F(x)$  ist in  $a$  analytisch und  $F(x) = \sum_{k=0}^n \int_a^x a_k t^k dt = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$  wenn  $|x - a| \leq r_f$
4.  $(f + g)(x)$  ist in  $a$  analytisch und  $(f + g)(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k$  wenn  $|x - a| \leq \min(r_f, r_g)$
5.  $f \cdot g(x)$  ist in  $a$  analytisch und  $(f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} x^k$  wenn  $|x - a| \leq \min(r_f, r_g)$

# Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher

## Partielle Ableitung

### Gradient

Der Gradient von  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ist ein Vektor mit  $n$  Komponenten:

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \partial_{x_2} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \partial_{x_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Die Transponierte des Gradienten ist:

$$Df(x) := (\nabla f(x))^T$$

### Total differenzierbare Funktionen

Falls  $f$  stetig partiell differenzierbar ist nennt man  $f$  total differenzierbar.

Damit kann man  $f(x+h) = f(x) + Df(x)h + \iota(h)$  als annäherung für  $f(x+h)$  verwenden.

Beispiele:

- $f(x) = \langle a, x \rangle$  ist total differenzierbar, da  $f(x+h) = \langle a, x+h \rangle = \langle a, x \rangle + \langle a, h \rangle = f(x) + a^T h = f(x) + Df(x)h$ 
  - Es gilt  $\text{grad}f(x) = a$  und somit  $Df(x) = a^T$
- $f(x) = x^T A x$  ist total differenzierbar, mit  $A$  symmetrisch.
  - Es gilt  $\text{grad}f(x) = 2Ax$

### Tangentialebene

Die Tangentialebene an  $f$  in  $x$  ist die Ebene, die durch  $x$  geht und die “Steigungen”  $Df(x)$  hat.

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + \iota(\|x - x_0\|)$$

### Hesse-Matrix

Die Hesse-Matrix von  $f$  in  $x$  ist eine  $n \times n$  Matrix, die die zweiten Ableitungen von  $f$  in  $x$  enthält.

$$Hf(x) := \begin{pmatrix} \partial_{x_1}^2 f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \partial_{x_1 x_2} f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \dots & \partial_{x_1 x_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \partial_{x_2 x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \partial_{x_2}^2 f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \dots & \partial_{x_2 x_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{x_n x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \partial_{x_n x_2} f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \dots & \partial_{x_n}^2 f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Sind alle zweiten partiellen Ableitungen  $\partial_{x_i x_j} f$  stetig, dann ist  $Hf$  symmetrisch.

## Extremwerte

Extremwerte in  $\mathbb{R}^n$  sind Punkte, an denen der Funktionswert  $f$  maximal oder minimal ist.

- Notwendige Bedingung:
  - $\nabla f(x) = \text{grad}f(x) = 0$
  - Falls die Hesse-Matrix  $Hf(x)$  positiv semidefinit ist, dann ist  $x$  ein lokales Minimum  
ansonsten falls  $Hf(x)$  negativ semidefinit ist, dann ist  $x$  ein lokales Maximum
    - \* (positiv/negativ semidefinit bedeutet, dass alle Eigenwerte größer/kleiner gleich 0 sind)
- Hinreichende Bedingung:
  - $\nabla f(x) = 0$  und  $Hf(x)$  ist positiv/negativ definit
    - \* Das heist alle Eigenwerte sind größer/kleiner 0

## Vorgehensweise zur Bestimmung von Extrema

1. Bestimme kritische Punkte von  $f$ . ( $\nabla f(x) = 0$ )
2. Für jeden kritischen Punkt  $x$  bestimme die Hesse-Matrix  $Hf(x)$
3. Prüfe, definitheit der Hesse-Matrix
  - Alle Eigenwerte sind größer 0:  $x$  ist ein striktes lokales Minimum
  - Alle Eigenwerte sind kleiner 0:  $x$  ist ein striktes lokales Maximum
  - Alle Eigenwerte größer gleich 0:  $x$  ist ein Minimum
  - Alle Eigenwerte kleiner gleich 0:  $x$  ist ein Maximum
  - Sonst:  $x$  ist ein Sattelpunkt
4. Es muss dabei auch auf Globale Extrema geprüft werden

## Totale Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}^n$

Eine Funktion  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ist in  $x$  total differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  gibt, so dass

$$f(x+h) = f(x) + Ah + \iota(h)$$

Das heist man kann die Funktion  $f$  in  $x$  mithilfe einer lineare Abbildung  $A$  annähern.

Diese Matrix heißt die Jacobimatrix von  $f$  in  $x$  und wird mit  $Jf(x)$  bezeichnet.

## Jacobimatrix

Die Jacobimatrix von  $f$  in  $x$  ist eine  $m \times n$  Matrix, die die partiellen Ableitungen von  $f$  in  $x$  enthält.

$$A = Df(x) := Jf(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Zum Beispiel:

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 + z \cdot \sin(x) \\ y^2 + z \end{pmatrix} \Rightarrow Jf(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x + z \cdot \cos(x) & 2y & \sin(x) \\ 0 & 2y & 1 \end{pmatrix}$$

# Differenzialgleichungen

## Anfangswertprobleme

Sei  $y'(x) = f(x, y(x))$  eine DGL mit Anfangswert  $y(a) = y_0$ .

Gesucht ist die Lösung  $y(x)$  der DGL, welche die Anfangsbedingung erfüllt.

## Separierbare DGL

Eine DGL ist separierbar, wenn sie in der Form  $y'(x) = f(x)g(y(x))$  vorliegt.

Dann gilt:

$$\begin{aligned} y' &= f(x)g(y) \\ \implies \frac{dy}{dx} &= f(x)g(y) \implies \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx \implies \ln |g(y)| = \int f(x)dx + C \implies g(y) = Ce^{\int f(x)dx} \\ \implies y &= Ce^{\int f(x)dx} \end{aligned}$$

## Inhomogene DGL erster Ordnung

Eine DGL erster Ordnung ist inhomogen, wenn sie in der Form  $y'(x) + a(x)y(x) = f(x)$  vorliegt.

Falls  $f(x) = 0$  ist, ist die DGL homogen. Solche DGL lassen sich einfach mit Separation lösen.

Eigenschaften:

- Sei  $\mathcal{H}$  die Menge der Lösungen der homogenen DGL  $y'(x) + a(x)y(x) = 0$ .
- Sei  $\mathcal{I}$  die Menge der Lösungen der inhomogenen DGL  $y'(x) + a(x)y(x) = f(x)$ . Es gilt:
  - $y_i \in \mathcal{I}, y_h \in \mathcal{H} \implies y_i + y_h \in \mathcal{I}$
  - $y_{i1}, y_{i2} \in \mathcal{I} \implies y_{i1} - y_{i2} \in \mathcal{H}$
  - $\mathcal{I} = y_i + \mathcal{H} := \{y_i + y_h \mid y_i \in \mathcal{I}, y_h \in \mathcal{H}\}$ 
    - \* Somit können alle Lösungen der inhomogenen DGL durch erzeugt werden, indem man eine beliebige Lösung der inhomogenen DGL zu den Lösungen der homogenen DGL addiert.

## Variation der Konstanten

Durch variation der Konstanten können inhomogene DGL erster Ordnung gelöst werden.

Sei  $y'(x) + a(x)y(x) = f(x)$  eine inhomogene DGL erster Ordnung.

1. Berechne die Lösung der homogenen DGL  $y'(x) + a(x)y(x) = 0$ .
  - Diese hat die Form  $y_h(x) = Ce^{-\int a(x)dx}$ .
2. Wähle den Ansatz  $y(x) = C(x)e^{-\int a(x)dx}$  und setze diesen in die Ausgangsgleichung ein.
  - Man erhält:  $C'(x)e^{-\int a(x)dx} - a(x) \cdot C(x)e^{-\int a(x)dx} + a(x) \cdot C(x)e^{-\int a(x)dx} = f(x)$
  - Durch vereinfachung erhält man  $C'(x) = f(x) \cdot e^{\int a(x)dx}$
  - Und somit  $C(x) = \int f(x) \cdot e^{\int a(x)dx} dx + C_0$



- Damit kann  $y_i(x) = C(x)e^{-\int a(x)dx} = \left(\int f(x) \cdot e^{\int a(x)dx} dx + C_0\right) \cdot e^{-\int a(x)dx}$  berechnet werden.
- 3. Damit kann durch Addition die Lösung der inhomogenen DGL berechnet werden:
  - $y(x) = y_i(x) + y_h(x) = \left(\int f(x) \cdot e^{\int a(x)dx} dx + C_0\right) \cdot e^{-\int a(x)dx} + Ce^{-\int a(x)dx} = e^{-A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x f(t) \cdot e^{A(t)} dt\right)$

## Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung

Lineare Differentialgleichungen haben die Form:

- $y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = f(x)$

Dabei gibt es kein allgemeines Verfahren zur Lösung, weshalb wir nur den Spezialfall mit konstanten Koeffizienten  $a(x) = a$  und  $b(x) = b$  betrachten.

Sei  $y''(x) + ay'(x) + by(x) = f(x)$  eine inhomogene DGL zweiter Ordnung.

1. Lösen der homogenen DGL  $y''(x) + ay'(x) + by(x) = 0$  mit dem Lösungsansatz  $y = e^{\lambda x}$ 
  - Dies entspricht dem Lösen der quadratischen Gleichung  $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$
  - Fall 1: Zwei reelle Lösungen
    - Die allgemeine Lösung ist:  $y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$  mit  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  beliebig.
  - Fall 2: Eine reelle Lösung
    - Die allgemeine Lösung ist:  $y(x) = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}$
  - Fall 3: Zwei komplexe Lösungen
    - Real- und Imaginärteil von  $e^{\lambda_1 x}$  bzw.  $e^{\lambda_2 x}$  sind reelle Lösungen der homogenen DGL
    - Die allgemeine Lösung ist:  $y(x) = c_1 e^{-\frac{a}{2}x} (c_1 \cos(\omega x) + c_2 \sin(\omega x))$
2. Finden einer speziellen Lösung der inhomogenen DGL  $y''(x) + ay'(x) + by(x) = f(x)$  mit einem Lösungsansatz in einer Form die  $f(x)$  entspricht.
  - $e^{\alpha t} (a_1 \cos(\omega t) + a_2 \sin(\omega t))$
  - $\sum_{k=0}^n a_k t^k$
3. Alle Lösungen der inhomogenen DGL sind gegeben durch die spezielle Lösung aus Schritt 2 addiert mit der allgemeinen Lösung der homogenen DGL aus Schritt 1