

Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Ciencias e Ingeniería



Prueba elemental del teorema del número primo vía la identidad de Selberg

Trabajo de investigación para optar el grado académico de
Bachiller en Matemáticas

Autor

MANUEL ALEJANDRO LOAIZA VASQUEZ

DNI 70452019

Asesor

ALFREDO BERNARDO POIRIER SCHMITZ

ORCID 0000-0003-2789-3630

DNI 10803756

Lima, Perú

Julio 2023

Agradecimientos

Primero, quiero agradecer profundamente a mi asesor por su guía y comprensión durante mi carrera universitaria. Alfredo es un asesor fantástico: un oráculo de perspicaces observaciones, balanceado con humor y anécdotas sobre su experiencia.

Aún recuerdo hace unos años atrás, cuando cursaba el cuarto ciclo, haber aprendido un poco sobre teoría de números para los regionales de ICPC y divertirme con Alfredo leyendo elegantes artículos desarrollando aproximadamente el 60% de este trabajo, el cual lo presentamos en el 2020 y ganamos el primer concurso de iniciación a la investigación en estudios generales ciencias. Un compañero y yo comenzamos a trabajar con Alfredo tras tomar el curso Tópicos de Análisis al inicio de la pandemia luego de una charla conjunta en la que nos escogió como asesorados:

La idea es salir de requisitos formales lo antes posible y seguir avanzando en sus carreras de investigadores. Las tesis deben tomarse como un juego, y como tal, las deben dar por finiquitadas lo antes posible.

Desafortunadamente, no seguí la línea de investigación que Alfredo visionó puesto que la pandemia hizo florecer en mí el entusiasmo de construir los bloques fundamentales de nuestras aplicaciones, dedicándome profesionalmente a la Ingeniería de Software en paralelo a la carga académica los dos años y medio posteriores, motivo por el cual el 40% restante de esta tesis está siendo concluido durante este décimo ciclo universitario.

Quiero agradecer a mis amistades a lo largo de los años: Marcelo Gallardo, Jemisson Coronel, Diego Hurtado de Mendoza y Hans Acha. Tengo la suerte de haber trabajado con estas personas supertalentedas.

Finalmente, quiero agradecer a mi familia por su apoyo constante e incondicional.

Abstract

One central theme of number theory is the distribution of the prime numbers over the positive integers. In one direction, from the works of Hadamard, de la Vallée Poussin and Newman, we know that the PNT (Prime Number Theorem) can be worked by complex analysis methods. On another direction, Selberg, Erdős, and Levinson proved the PNT using elementary techniques in the sense that it uses only real analysis. Less than a decade ago, Choudhary has strengthened Levinson's proof.

In this thesis, we establish another proof for the PNT still using Selberg's identity but simpler than Choudhary's in several respects refining the works mentioned above.

Keywords: Prime Number Theorem, Selberg's Identity, Analytic Number Theory.

2020 Mathematics Subject Classification: 11A25, 11A41.

Resumen

Un tema central en la teoría de números es la distribución de los números primos sobre los enteros positivos. En una dirección, de los trabajos de Hadamard, de la Vallée Poussin and Newman, nosotros sabemos que el PNT (de su acrónimo en inglés *Prime Number Theorem*, Teorema del Número Primo) es cierto por métodos del análisis complejo. En otra dirección, Selberg, Erdős y Levinson probaron el PNT vía técnicas elementales, en el sentido de que solo usan análisis real. Hace menos de una década, Choudhary fortaleció la prueba de Levinson.

En esta tesis, establecemos otra prueba para el PNT aún usando la identidad de Selberg pero más simple que la de Choudhary en muchos aspectos refinando los trabajos mencionados.

Palabras clave: Teorema del Número Primo, Identidad de Selberg, Teoría Analítica de Números.

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Nuestros resultados	1
1.2	Nuestras técnicas	2
1.3	Notación	2
2	Preliminares matemáticos	3
3	La identidad de Selberg	5
4	La función resto	17
5	Experimentación numérica	20
5.1	Algoritmos	20
5.2	Estimados	24
	Bibliografía	24

Capítulo 1

Introducción

El teorema del número primo ha sido extensivamente estudiado [Bre60, Cho17, Dia82, Erd49, Lev69, Liu22, New80, Ric21, Sel49, Sha59]. Este teorema afirma que la función $\pi(x)$ se aproxima asintóticamente a $x/\ln x$.

En 1852, Chebyshev [Che52] acota $\pi(x)/(x/\ln x)$ y concluye que el límite es igual a 1 en caso exista. En 1896, Hadamard [Had96] y de la Vallée Poussin probaron el PNT vía la función ζ de Riemann. En 1949, Selberg [Sel49] probó este teorema elegantemente sin uso de análisis complejo. Un par de meses luego, Erdős [Erd49] probó el teorema mediante el abuso de estimados tauberianos. En 1959, Shapiro [Sha59] prueba un par de teoremas tauberianos y equivalencias relacionadas a [Erd49], lo cual desembocó también en una nueva prueba del PNT. En 1969, Levinson [Lev69] se inspira de [Sel49, Bre60] para crear una demostración elemental profundizando el estudio de la función resto. En 2017, Choudhary [Cho17] prueba elementalmente el PNT reemplazando ciertos resultados de [Lev69] por corolarios de [Sha59].

1.1 Nuestros resultados

El propósito de este trabajo es presentar una nueva prueba elemental del PNT tras demostrar la fórmula de Selberg en todo rigor.

Empezamos enunciando la fórmula asintótica de Selberg. En todo lo que sigue los símbolos p y q se referirán a números primos positivos.

Teorema 1.1 (Identidad de Selberg). *Para todo número real x mayor o igual a 1 se cumple la fórmula*

$$\sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q = 2x \ln x + O(x).$$

Ahora enunciamos uno de los todopoderosos teoremas de la teoría analítica de números. Considere $\pi(x)$ la función que cuenta la cantidad de números primos menores o iguales a x .

Teorema 1.2 (Teorema del número primo). *El límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x}$ existe y es igual a 1.*

1.2 Nuestras técnicas

Para obtener nuestros resultados, describiremos a continuación cómo hemos hecho uso del análisis real y la teoría analítica de números.

Identidad de Selberg. [Sel49, sección 2] nos provee esta identidad como la herramienta más poderosa para alcanzar el premio gordo. Para demostrarla, usaremos como hoja de ruta [Cho17] sin utilizar las fórmulas que derivan de [Cho17, teorema 3.17] ni los estimados tauberianos de Shapiro desarrollados en [Cho17, sección 4]. En su reemplazo, utilizaremos nuestra creatividad y ciertos resultados de [Apo76, Dia82, TI51].

Función resto. Nuestro análisis de la función resto es una modificación de las propiedades estudiadas en [Sel49, sección 3] usando la desigualdad

$$|R(x)| \leq \frac{2}{\ln^2 x} \sum_{n \leq x} \frac{\ln n}{n} \left| R\left(\frac{x}{n}\right) \right| + O\left(\frac{x}{\ln x}\right)$$

en reemplazo de

$$|R(x)| \leq \frac{1}{\ln x} \sum_{n \leq x} \left| R\left(\frac{x}{n}\right) \right| + O\left(x \frac{\ln \ln x}{\ln x}\right).$$

1.3 Notación

Emplearemos $f(x) = O(g(x))$ en vez de $f \in O(g)$ a pesar de que no se trate de una igualdad de conjuntos sino pertenencia de una función a una clase determinada de funciones. De la misma manera trataremos la aritmética entre familias de funciones con notación O . Los símbolos p y q , en caso de no especificarse, harán referencia a números primos positivos.

Capítulo 2

Preliminares matemáticos

En ruta al PNT tendremos que recordar algunas definiciones y estimados bastante conocidos.

Dada una función g denotamos $O(g(x))$ al conjunto de funciones

$$O(g(x)) = \{f : \text{existe una constante positiva } c \text{ y un momento } x_0 \text{ tal que} \\ 0 \leq f(x) \leq cg(x) \text{ para todo } x \geq x_0\}.$$

Teorema 2.1 (Fórmula de sumación de Euler). *Si f tiene una derivada continua f' en el intervalo $[a, b]$, con $0 < a < b$, entonces se satisface*

$$\sum_{a < n \leq x} f(n) = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b (t - [t])f'(t) dt + f(a)([a] - a) - f(b)([b] - b).$$

Teorema 2.2 (Fórmula de sumación de Abel). *Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ una función aritmética y $A(x) = \sum_{n \leq x} a(n)$. Si f es una función con derivada continua en el intervalo $[y, x]$ con $0 < y < x$, entonces se cumple*

$$\sum_{y < n \leq x} a(n)f(n) = A(x)f(x) - A(y)f(y) - \int_y^x A(t)f'(t) dt.$$

Para dos funciones aritméticas f y g definimos su **producto de Dirichlet** como la función aritmética h definida puntualmente por

$$h(n) = f * g(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Teorema 2.3 (Fórmula de Inversión de Möbius). *La ecuación*

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

equivale a

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

La función **μ de Möbius** es definida como de costumbre. Primero ponemos $\mu(1) = 1$. Si $n > 1$, expresamos $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ como producto de primos distintos y definimos

$$\mu(n) = \begin{cases} (-1)^k & \text{si } \alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para n entero positivo la función **Λ de Mangoldt** está dada por

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \ln p & \text{si } n = p^m \text{ para algún } m \geq 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Observe que Λ se define de modo que se satisfaga $\Lambda * \mathbf{1} = \ln$.

Para $x > 0$ definimos la función **Ψ de Chebyshev** con la fórmula

$$\Psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) = \sum_{\substack{m=1 \\ p^m \leq x}}^{\infty} \sum_p \Lambda(p^m) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{p \leq x^{1/m}} \ln p.$$

Para todo $x > 0$ definimos la función **ϑ de Chebyshev** mediante la ecuación

$$\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p.$$

Capítulo 3

La identidad de Selberg

El objetivo de este capítulo es demostrar [Sel49, ecuación 2.8]. La prueba clásica de Selberg depende de la función número de divisores de n denotada por $\tau(n)$ y la función $\theta_n(x)$ definida como $\sum_{d|n} \mu(d) \ln^2(x/d)$. Nosotros no usamos estas funciones sino utilizamos las fórmulas asintóticas de [Cho17, corolario 4.2]. Choudhary enuncia estas como corolarios de los teoremas tauberianos de [Sha59] desarrollados en [Cho17, teorema 4.1]. En contraste, nuestras pruebas son transparentes en uso de aquellos teoremas tauberianos y serán fruto de resultados clásicos de [Apo76] junto con brillantes ideas de artículos que gravitan en torno al tema.

Lema 3.1. *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right),$$

aquí $\gamma \approx 0.5772 \dots$ es una constante conocida como **la constante de Euler**.

Demostración. La función $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 1/x$ es continua y diferenciable en toda la recta, conque podemos aplicar el **teorema 2.1** en cualquier intervalo $[2, k]$ y así obtener

$$\sum_{n=2}^k \frac{1}{n} = \int_1^k \frac{dt}{t} + \int_1^k (t - \lfloor t \rfloor) \left(\frac{1}{-t^2} \right) dt = \ln k - \int_1^k \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt,$$

lo cual conduce de inmediato a

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \ln k = 1 - \int_1^k \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt.$$

Para analizar qué ocurre cuando $k \rightarrow \infty$ escribimos

$$\gamma = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \ln k \right) = 1 - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_1^k \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt \right) = 1 - \int_1^\infty \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt, \quad (3.1)$$

límite que existe, pues al tenerse

$$\int_1^k \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt \leq \int_1^k \frac{1}{t^2} dt = 1 - \frac{1}{k} \leq 1$$

la convergencia queda garantizada por monotonicidad.

Finalmente, para establecer la fórmula anunciada reemplazamos (3.1) tras el uso del **teorema 2.1** y obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} &= \int_1^x \frac{1}{t} dt + \int_1^x (t - \lfloor t \rfloor) \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt - (x - \lfloor x \rfloor) \left(\frac{1}{x} \right) + 1 \\ &= \ln x - \int_1^x \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt + 1 - \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x} \\ &= \ln x - \int_1^x \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt + 1 - \int_1^\infty \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt + \int_1^\infty \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt - \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x} \\ &= \ln x + \gamma + \int_x^\infty \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2} dt - \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x} \\ &\leq \ln x + \gamma + \int_x^\infty \frac{1}{t^2} dt - \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x} \\ &= \ln x + \gamma + \frac{1 - (x - \lfloor x \rfloor)}{x}, \end{aligned}$$

alcanzando así nuestro objetivo. □

Lema 3.2. *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\sum_{n \leq x} \ln n = x \ln x - x + O(\ln x).$$

Demostración. Esta vez utilizamos el **teorema 2.1** en $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \ln x$, función continua y diferenciable en toda la recta real positiva:

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \ln n &= \int_1^x \ln t dt + \int_1^x \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t} dt + (\lfloor x \rfloor - x) \ln x \\ &= x \ln x - x + 1 + \int_1^x \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t} dt + (\lfloor x \rfloor - x) \ln x \\ &\leq x \ln x - x + 1 + \int_1^x \frac{1}{t} dt + \ln x \\ &= x \ln x - x + 1 + 2 \ln x. \end{aligned}$$

Como 1 está dominado por $\ln x$, se cumple $\sum_{n \leq x} \ln n = x \ln x - x + O(\ln x)$, lo anunciado. □

Lema 3.3. *Para toda función aritmética f se cumple*

$$\sum_{n \leq x} \sum_{d|n} f(d) = \sum_{n \leq x} f(n) \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor.$$

Demostración. Sean f y g dos funciones aritméticas, F y G sus respectivas cumulativas; es decir, $F(x) = \sum_{n \leq x} f(n)$ y $G(x) = \sum_{n \leq x} g(n)$. La cumulativa del producto de Dirichlet de f y g está dada por

$$\sum_{n \leq x} f * g(n) = \sum_{n \leq x} \sum_{cd=n} f(c)g(d) = \sum_{c \leq x} \sum_{d \leq x/c} f(c)g(d) = \sum_{c \leq x} f(c) \sum_{d \leq x/c} g(d) = \sum_{c \leq x} f(c)G\left(\frac{x}{c}\right). \quad (3.2)$$

En particular, cuando $g = \mathbf{1}$, su cumulativa es

$$\sum_{n \leq x} \mathbf{1}(n) = \sum_{n \leq x} 1 = \lfloor x \rfloor.$$

De este modo, al introducir $G(x) = \lfloor x \rfloor$ en (3.2) se logra

$$\sum_{n \leq x} \sum_{d|n} f(d) = \sum_{n \leq x} f * \mathbf{1}(n) = \sum_{n \leq x} f(n) \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor,$$

lo buscado. □

Lema 3.4. *Para todo número real x tenemos*

$$\lfloor x \rfloor = x + O(1).$$

Demostración. Sea $x = n + r$ un número real no negativo, con n entero y $0 \leq r < 1$. De esta manera, por definición de máximo entero obtenemos $\lfloor x \rfloor = n = x - r = x + O(1)$ concluyendo trivialmente con la propiedad. □

Lema 3.5 ([Che52]). *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\Psi(x) = O(x).$$

Demostración. Usaremos el desarrollo de los estimados de Chebyshev de [Dia82, sección 3] dado por

$$A \leq \liminf \frac{\Psi(x)}{x} \leq \limsup \frac{\Psi(x)}{x} \leq \frac{6A}{5},$$

con

$$A = -\frac{\ln 1}{1} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 5}{5} - \frac{\ln 30}{30} \approx 0.921292...$$

Reescribimos la parte derecha de la desigualdad con valor absoluto ya que es una función positiva cual $\limsup |\Psi(x)|/x \leq 6A/5$. Por definición, existe n_0 a partir del cual se tiene $|\Psi(x)|/x \leq 6A/5$, para todo $x \geq n_0$. Como ello equivale a $|\Psi(x)| \leq (6A/5)x$, se consigue $\Psi(x) = O(x)$. □

Lema 3.6. *La función de Mangoldt se puede expresar como el producto de Dirichlet $\Lambda = \mu * \ln$.*

Demostración. Esta fórmula equivale a $\Lambda * \mathbf{1} = \ln$ vía el [teorema 2.3](#). \square

Lema 3.7. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$\sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} = \ln x + O(1).$$

Demostración. El desarrollo de $\ln = \Lambda * \mathbf{1}$ cual $\ln n = \sum_{d|n} \Lambda(d)$ lleva a

$$\sum_{n \leq x} \ln n = \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \Lambda(d).$$

Una aplicación directa del [lema 3.3](#) deriva en

$$\sum_{n \leq x} \ln n = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor.$$

De acá, en uso del [lema 3.4](#) conseguimos

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \ln n &= \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \left(\frac{x}{n} + O(1) \right) = x \sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} + O \left(\sum_{n \leq x} \Lambda(n) \right) \\ &= x \sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} + O(\Psi(x)) = x \sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} + O(x) \end{aligned}$$

dado que, por el [lema 3.5](#), $\Psi(x) = O(x)$ claramente implica $O(\Psi(x)) = O(x)$. Si aplicamos el [lema 3.2](#) al lado izquierdo desembocamos en

$$x \ln x - x + O(\ln x) = x \sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} + O(x).$$

Al despejar obtenemos

$$\sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} = \ln x - 1 + O(1) + O \left(\frac{\ln x}{x} \right) = \ln x + O(1),$$

pues $-1 + O(1) + O(\ln x/x)$ es acotado. \square

Lema 3.8. Para $f, g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sujetos a $g(x) = \sum_{n \leq x} f(x/n) \ln x$ tenemos

$$\sum_{n \leq x} \mu(n) g \left(\frac{x}{n} \right) = f(x) \ln(x) + \sum_{n \leq x} f \left(\frac{x}{n} \right) \Lambda(n).$$

Demostración. Desarrollemos la sumatoria que queremos analizar

$$\begin{aligned}
\sum_{n \leq x} \mu(n) g\left(\frac{x}{n}\right) &= \sum_{n \leq x} \mu(n) \sum_{m \leq x/n} f\left(\frac{x}{nm}\right) \ln\left(\frac{x}{n}\right) \\
&= \sum_{nm \leq x} \mu(n) \ln\left(\frac{x}{n}\right) f\left(\frac{x}{nm}\right) \\
&= \sum_{c \leq x} f\left(\frac{x}{c}\right) \sum_{d|c} \mu(d) \ln\left(\frac{x}{d}\right) \\
&= \sum_{n \leq x} f\left(\frac{x}{n}\right) \sum_{d|n} \mu(d) \left[\ln\left(\frac{x}{n}\right) + \ln\left(\frac{n}{d}\right) \right] \\
&= \left[\sum_{n \leq x} f\left(\frac{x}{n}\right) \ln\left(\frac{x}{n}\right) \sum_{d|n} \mu(d) \right] + \left[\sum_{n \leq x} f\left(\frac{x}{n}\right) \sum_{d|n} \mu(d) \ln\left(\frac{n}{d}\right) \right] \\
&= f(x) + \ln x + \sum_{n \leq x} f\left(\frac{x}{n}\right) (\mu * \ln)(n).
\end{aligned}$$

Con ello, finalmente, utilizamos el **lema 3.6** para concluir lo deseado. \square

Lema 3.9. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$\ln^2 x = O(\sqrt{x}).$$

Demostración. Como sabemos que para todo $x \geq 1$ se cumple que $x > \ln x$ (vía análisis de la derivada de $x - \ln x$), se obtiene

$$\ln^2 x = \ln^2 \left((x^{1/4})^4 \right) = 16 \ln^2 (x^{1/4}) < 16 (x^{1/4})^2 = 16\sqrt{x}.$$

\square

Lema 3.10. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$\Psi(x) \ln x + \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) = 2x \ln x + O(x).$$

Demostración. Para utilizar el **lema 3.8**, definimos convenientemente $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \Psi(x) - x + \gamma + 1.$$

Primero le brindaremos a $g(x) = \sum_{n \leq x} f(x/n) \ln x$ una expansión diferente cual es

$$\begin{aligned}
g(x) &= \sum_{n \leq x} f\left(\frac{x}{n}\right) \ln x = \sum_{n \leq x} \left(\Psi\left(\frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n} + \gamma + 1 \right) \ln x \\
&= \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \ln x - x \ln x \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} + (\gamma + 1) \ln x \sum_{n \leq x} 1.
\end{aligned} \tag{3.3}$$

Analicemos por separado cada sumatoria de (3.3).

La primera resulta ser

$$\sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) = \sum_{n \leq x} \sum_{d \leq x/n} \Lambda(d) = \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_{n \leq x} (\Lambda * \mathbf{1})(n) = \sum_{n \leq x} \ln n,$$

de tipo $x \ln x - x + O(\ln x)$ por el lema 3.2. Al multiplicar el logaritmo obtenemos la expresión

$$\sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \ln x = x \ln^2 x - x \ln x + O(\ln^2 x).$$

Para la segunda recurrimos al lema 3.1 y logramos

$$-x \ln x \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = -x \ln x \left(\ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right) \right) = -x \ln^2 x - \gamma x \ln x + O(\ln x).$$

Para la tercera necesitamos el lema 3.4:

$$(\gamma + 1) \ln x \sum_{n \leq x} 1 = (\gamma + 1) \ln x [x] = (\gamma + 1) \ln x (x + O(1)) = (\gamma + 1)x \ln x + O(\ln x).$$

Finalmente, juntamos los tres resultados y obtenemos

$$\begin{aligned} g(x) &= x \ln^2 x - x \ln x + O(\ln^2 x) - x \ln^2 x - \gamma x \ln x + O(\ln x) + (\gamma + 1)x \ln x + O(\ln x) \\ &= O(\ln^2 x) + O(\ln x) = O(\ln^2 x). \end{aligned}$$

Del lema 3.8 obtenemos entonces

$$\sum_{n \leq x} \mu(n) g\left(\frac{x}{n}\right) = (\Psi(x) - x + \gamma + 1) \ln x + \sum_{n \leq x} \left(\Psi\left(\frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n} + \gamma + 1 \right) \Lambda(n). \quad (3.4)$$

El remate consiste en analizar ambos miembros de la desigualdad por separado. Tatuzawa e Iseki [TI51] trabajaron (3.4) mediante integrales. Nosotros hemos evitado aquello astutamente haciendo uso de la desigualdad triangular junto con el hecho de que se cumple $g(x) = O(\ln^2 x)$ para obtener a la izquierda

$$\left| \sum_{n \leq x} \mu(n) g\left(\frac{x}{n}\right) \right| \leq \sum_{n \leq x} \left| g\left(\frac{x}{n}\right) \right| = O\left(\sum_{n \leq x} g\left(\frac{x}{n}\right) \right) = O\left(\sum_{n \leq x} \ln^2\left(\frac{x}{n}\right) \right).$$

Con esta expresión, el lema 3.9 nos conduce a

$$\sum_{n \leq x} \mu(n) g\left(\frac{x}{n}\right) = O\left(\sum_{n \leq x} \sqrt{\frac{x}{n}} \right) = O\left(\sqrt{x} \sum_{n \leq x} \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = O(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = O(x). \quad (3.5)$$

El término de la derecha en (3.4) lo reordenamos cual

$$\Psi(x) \ln x + \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - x \ln x - x \sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n} + (\gamma + 1)\Psi(x). \quad (3.6)$$

Merced al [lema 3.5](#) y el [lema 3.7](#) reducimos (3.6) a

$$\begin{aligned}\Psi(x) \ln x + \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - x \ln x - x(\ln x + O(1)) + O(x) \\ = \Psi(x) \ln x + \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - 2x \ln x + O(x).\end{aligned}\quad (3.7)$$

Finalmente, igualamos (3.5) con (3.7) y obtenemos

$$\Psi(x) \ln x + \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - 2x \ln x + O(x) = O(x),$$

equivalente a lo aseverado. \square

La prueba del lema siguiente es remedo del argumento utilizado en [\[Lev69, lema 4\]](#) para liquidar

$$\Psi(x) = \pi(x) \ln x + O\left(\frac{x \ln \ln x}{\ln x}\right).$$

Lema 3.11. *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\Psi(x) = \vartheta(x) + O(\sqrt{x} \ln x).$$

Demostración. Directo de la definición observamos que se cumple

$$\Psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \vartheta(x^{1/n}).$$

Notemos que al mismo tiempo esta sumatoria tiene apenas una cantidad finita de términos efectivos puesto que la función ϑ solo tiene sentido cuando es evaluada en valores mayores o iguales a 2. Para un x específico, hallamos ese momento m mediante la desigualdad $x^{1/m} \geq 2$, pues elevándola al cuadrado $x^{2/m} \geq 4 > e$ y aplicándole logaritmo $(2/m) \ln x > 1$ obtenemos $2 \ln x > m$. Notamos que para valores mayores que $m = \lfloor 2 \ln x \rfloor$ los constituyentes de la suma son nulos. Ahora podemos reescribir a Ψ como

$$\Psi(x) = \vartheta(x) + \vartheta(x^{1/2}) + \cdots + \vartheta(x^{1/m}) = \vartheta(x) + \sum_{n=2}^m \vartheta(x^{1/n}).$$

Para el análisis de $\sum_{n=2}^m \vartheta(x^{1/n})$ desdoblamos

$$\sum_{n=2}^m \vartheta(x^{1/n}) = \sum_{n=2}^m \sum_{p \leq x^{1/n}} \ln p.$$

Trataremos de darle forma manipulativa sencilla. Si un número primo p será inmiscuido en la sumatoria, su logaritmo contribuirá a la sumatoria tantas veces como las raíces de x lo permitan: entre 1 y k , donde k es el máximo entero que obedece $p^k \leq x$. Fácilmente hallamos que este máximo está dado por $k = \lfloor \ln x / \ln p \rfloor$.

Por su parte, para forzar por lo menos $p^2 \leq x$, se necesita $p \leq \sqrt{x}$, detalle importante que aprovecharemos.

Ahora analicemos la forma equivalente

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^m \sum_{p^n \leq x} \ln p &= \sum_{p \leq \sqrt{x}} \sum_{2 \leq n \leq \lfloor \ln x / \ln p \rfloor} \ln p = \sum_{p \leq \sqrt{x}} \ln p \sum_{2 \leq n \leq \lfloor \ln x / \ln p \rfloor} 1 \leq \sum_{p \leq \sqrt{x}} \ln p \left\lfloor \frac{\ln x}{\ln p} \right\rfloor \\ &\leq \sum_{p \leq \sqrt{x}} \ln p \left(\frac{\ln x}{\ln p} \right) = \sum_{p \leq \sqrt{x}} \ln x = \ln x \sum_{p \leq \sqrt{x}} 1 \leq \ln x \sum_{n \leq \sqrt{x}} 1 \leq \ln x \sqrt{x}, \end{aligned}$$

lo que permite concluir $\sum_{n=2}^m \vartheta(x^{1/n}) = O(\sqrt{x} \ln x)$. Con lo anterior queda establecida la relación $\Psi(x) = \vartheta(x) + O(\sqrt{x} \ln x)$. \square

Lema 3.12. *La serie*

$$\sum_{p=2}^{\infty} \frac{\ln p}{p(p-1)}$$

tomada sobre los primos converge.

Demostración. El primer paso es notar que el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n(n-1)} n^{3/2}$$

vale 0 como se deduce al descomponer

$$\frac{\ln n}{n(n-1)} n^{3/2} = \left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}} \right) \left(\frac{n}{n-1} \right).$$

Analizamos el límite de lo que está dentro del paréntesis de la izquierda; es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = \frac{\infty}{\infty}.$$

Como este es de la forma ∞/∞ , aplicamos la regla de L'Hospital

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1/(2\sqrt{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{n}} = 0.$$

A la derecha tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 1/n} = \frac{1}{1 - 0} = 1.$$

Como ambos límites existen, por aritmética de límites obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n(n-1)} n^{3/2} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} \right) = 0 \cdot 1 = 0.$$

Por supuesto, lo mismo es válido si crecemos a lo largo de primos, conque se tiene

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\ln p}{p(p-1)} p^{3/2} = 0.$$

Por definición entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe un n_0 a partir del cual se tiene

$$\frac{\ln p}{p(p-1)} p^{3/2} < \varepsilon$$

De este modo, al hacer $p_0 = \lfloor n_0 \rfloor + 1$, sabemos que para todo $p \geq p_0$ se tendrá

$$\sum_{p \geq p_0} \frac{\ln p}{p(p-1)} < \sum_{p \geq p_0} \frac{\varepsilon}{p^{3/2}}.$$

Como el menor primo es 2, logramos el estimado

$$\sum_{p \geq p_0} \frac{\ln p}{p(p-1)} < \sum_{p \geq p_0} \frac{\varepsilon}{p^{3/2}} \leq \int_1^\infty \frac{\varepsilon}{x^{3/2}} dx < 2\varepsilon.$$

Esto, por supuesto, lleva a

$$\sum_{p=2}^\infty \frac{\ln p}{p(p-1)} < \sum_{p < p_0} \frac{\ln p}{p(p-1)} + 2\varepsilon,$$

lo que equivale a la convergencia absoluta de la serie. □

Lema 3.13. *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\vartheta(x) \ln x + \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p = 2x \ln x + O(x).$$

Demostración. El primer paso es comparar la sumatoria con otra más a tono con nuestros intereses:

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p &= \sum_{n \leq x} \sum_{m \leq x/n} \Lambda(m) \Lambda(n) - \sum_{p \leq x} \sum_{q \leq x/p} \ln q \ln p \\ &= \sum_{nm \leq x} \Lambda(n) \Lambda(m) - \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q. \end{aligned}$$

En el primero de los dos sumandos sobrevivientes, la función de Mangoldt solo actúa sobre las potencias de los primos. En particular, todas las combinaciones de primos con potencias iguales a uno van de la mano con la sumatoria que estamos restando a la derecha. De esta manera, apenas sobreviven aquellos términos con al menos uno de los exponentes mayor o igual a dos. De este modo, se consigue

$$\begin{aligned} \sum_{nm \leq x} \Lambda(n) \Lambda(m) - \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q &\leq \sum_{\substack{p^n q^m \leq x \\ n \geq 2 \\ m \geq 1}} \ln p \ln q + \sum_{\substack{p^n q^m \leq x \\ n \geq 1 \\ m \geq 2}} \ln p \ln q \\ &= 2 \sum_{\substack{p^n q^m \leq x \\ n \geq 2 \\ m \geq 1}} \ln p \ln q = 2 \sum_{\substack{p^n \leq x \\ n \geq 2}} \ln p \sum_{\substack{q^m \leq x/p^n \\ m \geq 1}} \ln q = O\left(\sum_{\substack{p^n \leq x \\ n \geq 2}} \ln p \Psi\left(\frac{x}{p}\right)\right), \end{aligned}$$

puesto que tras la desigualdad contamos por partida doble aquellos pares cuyos productos no son enteros libres de cuadrados. Para continuar, utilizamos el [lema 3.5](#) en la última igualdad y logramos

$$\sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p = O\left(\sum_{\substack{p^n \leq x \\ n \geq 2}} \ln p \frac{x}{p^n}\right) = O\left(x \sum_{\substack{p^n \leq x \\ n \geq 2}} \frac{\ln p}{p^n}\right).$$

Llegado este punto, nuevamente notamos que la contribución en la cola es exclusiva de los primos sujetos a $p^2 \leq x$. Asimismo, los términos de la sumatoria están dominados por una serie geométrica, por lo que conseguimos

$$\begin{aligned} O\left(x \sum_{\substack{p^n \leq x \\ n \geq 2}} \frac{\ln p}{p^n}\right) &= O\left(x \sum_{p \leq \sqrt{x}} \ln p \sum_{n \geq 2} \frac{1}{p^n}\right) = O\left(x \sum_{p \leq \sqrt{x}} \ln p \sum_{m \geq 0} \frac{1}{p^{m+2}}\right) \\ &= O\left(x \sum_{p \leq \sqrt{x}} \frac{\ln p}{p^2} \sum_{m \geq 0} \frac{1}{p^m}\right) = O\left(x \sum_{p \leq \sqrt{x}} \frac{\ln p}{p^2} \left(\frac{1}{1 - 1/p}\right)\right) \\ &= O\left(x \sum_{p \leq \sqrt{x}} \frac{\ln p}{p^2} \left(\frac{p}{p-1}\right)\right) = O\left(x \sum_{p \leq \sqrt{x}} \frac{\ln p}{p(p-1)}\right). \end{aligned}$$

Como según el [lema 3.12](#) la serie $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{\ln p}{p(p-1)}$ converge, las sumas parciales están acotadas, y reducimos a

$$\sum_{n \leq x} \Psi\left(\frac{x}{n}\right) \Lambda(n) - \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p = O\left(x \sum_{p=2}^{\infty} \frac{\ln p}{p(p-1)}\right) = O(x).$$

Al inmiscuir el [lema 3.10](#), esta relación se troca por

$$2x \ln x + O(x) - \Psi(x) \ln x - \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p = O(x),$$

o lo que es lo mismo por

$$\Psi(x) \ln x + \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p = 2x \ln x + O(x).$$

De acá, el uso consecutivo del [lema 3.11](#) (para Ψ) lleva a

$$2x \ln x + O(x) = (\vartheta(x) + O(\sqrt{x} \ln x)) \ln x + \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p$$

y del [lema 3.9](#) (para $\ln^2 x$) a

$$\begin{aligned}\vartheta(x) \ln x + O(\sqrt{x} \ln^2 x) + \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p &= \vartheta(x) \ln x + O(\sqrt{x} \sqrt{x}) + \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p \\ 2x \ln x + O(x) &= \vartheta(x) \ln x + O(x) + \sum_{p \leq x} \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \ln p.\end{aligned}$$

□

Lema 3.14. *La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge a un número menor o igual a 2.*

Demostración. Esto es sencillo si utilizamos sumas telescópicas:

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^k \frac{1}{n^2} \leq 1 + \sum_{n=2}^k \frac{1}{n(n-1)} = 1 + \sum_{n=2}^k \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 + \left(\frac{1}{2-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{k}.$$

El resultado se sigue de inmediato. □

Finalmente el resultado teórico más importante de este capítulo.

Teorema 3.15 ([Sel49]). *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q = 2x \ln x + O(x).$$

Nota. En la fórmula dada arriba es indistinto si tomamos p y q distintos o si se permite que sean iguales. En efecto, la diferencia entre una y otra alternativa es apenas

$$\sum_{p^2 \leq x} (\ln p)^2 \leq \sum_{p^2 \leq x} (\ln x^{1/2})^2 \leq \frac{\sqrt{x} \ln^2 x}{4} = O(x).$$

Prueba de la fórmula de Selberg. Consolidemos la siguiente diferencia en una única suma

$$\begin{aligned}\vartheta(x) \ln x - \sum_{p \leq x} \ln^2 p &= \sum_{p \leq x} \ln p \ln x - \sum_{p \leq x} \ln p \ln p \\ &= \sum_{p \leq x} \ln p (\ln x - \ln p) \\ &= \sum_{p \leq x} \ln p \ln \left(\frac{x}{p} \right).\end{aligned}\tag{3.8}$$

A continuación recurrimos a una versión gruesa del [lema 3.1](#); al ser $1/x$ acotado para $x \geq 0$, obtenemos para la serie armónica

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right) = \ln x + O(1),$$

o, lo que es lo mismo,

$$\ln x = \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} + O(1).$$

Reemplazamos este nuevo estimado en (3.8) para conseguir

$$\begin{aligned} \vartheta(x) \ln x - \sum_{p \leq x} \ln^2 p &= \sum_{p \leq x} \ln p \ln \left(\frac{x}{p} \right) = \sum_{p \leq x} \ln p \left(\sum_{n \leq x/p} \frac{1}{n} + O(1) \right) \\ &= \sum_{p \leq x} \ln p \sum_{n \leq x/p} \frac{1}{n} + O \left(\sum_{p \leq x} \ln p \right) = \sum_{p \leq x} \sum_{n \leq x/p} \frac{\ln p}{n} + O \left(\sum_{p \leq x} \ln p \right) \\ &= \sum_{n \leq x} \sum_{p \leq x/n} \frac{\ln p}{n} + O \left(\sum_{p \leq x} \ln p \right) = \sum_{n \leq x} \sum_{p \leq x/n} \frac{\ln p}{n} + O(\vartheta(x)). \end{aligned} \quad (3.9)$$

Pero una combinación del lema 3.5 y el lema 3.11 muestra que $\Psi(x)$ y $\vartheta(x)$ están en $O(x)$, propiedad que utilizaremos en la forma $O(\vartheta(x)) = O(x)$.

A continuación desdoblamos uno de los sumandos en (3.9) para llegar a

$$\begin{aligned} \vartheta(x) \ln x - \sum_{p \leq x} \ln^2 p &= \sum_{n \leq x} \sum_{p \leq x/n} \frac{\ln p}{n} + O(x) \\ &= \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} \sum_{p \leq x/n} \ln p + O(x) \\ &= \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} \cdot \vartheta \left(\frac{x}{n} \right) + O(x) \\ &= O \left(x \sum_{n \leq x} \frac{1}{n^2} \right) + O(x) \\ &= O(2x) + O(x) \\ &= O(x), \end{aligned}$$

pues la sumatoria de recíprocos al cuadrado está acotada por 2.

Para el remate es cuestión de reemplazar en el lema 3.13 y lograr

$$\begin{aligned} 2x \ln x + O(x) &= \vartheta(x) \ln x + \sum_{p \leq x} \vartheta \left(\frac{x}{p} \right) \ln p \\ &= \sum_{p \leq x} \ln^2 p + O(x) + \sum_{p \leq x} \vartheta \left(\frac{x}{p} \right) \ln p \\ &= \sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{p \leq x} \sum_{q \leq x/p} \ln q \ln p \\ &= \sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q, \end{aligned}$$

la fórmula de Selberg. □

Capítulo 4

La función resto

En este capítulo extraeremos propiedades mágicas de la función resto definida como $R(x) = x - \vartheta(x)$ [Sel49, sección 3] para posteriormente probar cómodamente el PNT como en la presentación original de Selberg.

Lema 4.1. *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$R(x) \ln x = - \sum_{p \leq x} \ln p R\left(\frac{x}{p}\right) + O(x).$$

Demostración. Sustituiremos ϑ en función de R en [lema 3.13](#)

$$\begin{aligned} x \ln x + O(x) &= R(x) \ln x + \sum_{p \leq x} \ln p \vartheta\left(\frac{x}{p}\right) \\ &= R(x) \ln x + \sum_{p \leq x} \ln p \left(\frac{x}{p} + R\left(\frac{x}{p}\right)\right) \\ &= R(x) \ln x + x \sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p} + \sum_{p \leq x} \ln p R\left(\frac{x}{p}\right). \end{aligned}$$

Podría parecer que estamos listos, mas aparece un detalle minúsculo por ajustar. Para remediar este defecto trabajamos en su reemplazo con [Mer74, teorema 2]

$$\sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p} = \ln x + O(1).$$

Gracias a ello inferimos

$$R(x) \ln x + x \ln x + O(x) + \sum_{p \leq x} \ln p R\left(\frac{x}{p}\right) = x \ln x + O(x)$$

y el resultado se desprende de manera inmediata. □

Lema 4.2. *Para todo $x \geq 1$ tenemos*

$$\sum_{pq \leq x} \frac{\ln p \ln q}{pq} = \frac{1}{2} \ln^2 x + O(\ln x).$$

Demostración. Aplicamos [Mer74, teorema 2] en la siguiente sumatoria

$$\sum_{q \leq x/p} \frac{\ln q}{q} = \ln x - \ln p + O(1)$$

y acumulamos

$$\begin{aligned} \sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p} \left(\sum_{q \leq x/p} \frac{\ln q}{q} \right) &= \sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p} (\ln x - \ln p + O(1)) \\ &= \ln x \sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p} - \sum_{p \leq x} \frac{\ln^2 p}{p} + O \left(\sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p} \right) \\ &= \ln x (\ln x + O(1)) - () + O(\ln x) + O(1) \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 x + O(\ln x). \end{aligned}$$

□

Lema 4.3. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$\sum_{pq \leq x} \frac{\ln p \ln q}{pq \ln pq} = \ln x + O(\ln \ln x).$$

Demostración. Definamos $f : [2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 1/\ln x$ y $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $a(n) = \sum_{pq=n} (\ln p \ln q)/pq$. Luego aplicamos el [teorema 2.2](#) y reemplazamos el estimado del [lema 4.2](#) para obtener

$$\begin{aligned} \sum_{2 < pq \leq x} \frac{\ln p \ln q}{pq} \cdot \frac{1}{\ln pq} &= \sum_{pq \leq x} \frac{\ln p \ln q}{pq} \cdot \frac{1}{\ln x} - \int_2^x \left(\sum_{pq \leq t} \frac{\ln p \ln q}{pq} \right) \left(-\frac{1}{t \ln^2 t} \right) dt \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln^2 x + O(\ln x) \right) \frac{1}{\ln x} + \int_2^x \left(\frac{\ln^2 t}{2} + O(\ln t) \right) \left(\frac{1}{t \ln^2 t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \ln x + O(1) + \int_2^x \frac{1}{2t} dt + O \left(\int_2^x \frac{1}{t \ln t} dt \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln x + O(1) + \frac{1}{2} (\ln x - \ln 2) + O(\ln \ln x - \ln \ln 2) \\ &= \ln x + O(\ln \ln x) \end{aligned}$$

validando la afirmación.

□

Lema 4.4. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$R(x) \ln x = \sum_{pq \leq x} \frac{\ln p \ln q}{\ln pq} R \left(\frac{x}{pq} \right) + O(x \ln \ln x).$$

Demostración. TODO.

□

Lema 4.5. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$|R(x)| \leq \frac{1}{\ln x} \sum_{n \leq x} \left| R\left(\frac{x}{n}\right) \right| + O\left(\frac{x \ln \ln x}{\ln x}\right).$$

Demostración. Sumamos las expresiones obtenidas en [lema 4.1](#) y [lema 4.4](#) □

Lema 4.6. Para todo $x \geq 1$ tenemos

$$\sum_{n \leq x} \frac{R(n)}{n^2} = O(1).$$

Demostración. TODO. Sumas parciales de [[Mer74](#), teorema 2] en

$$\sum_{n \leq x} \frac{\vartheta(n)}{n^2} = \ln x + O(1).$$

□

Lema 4.7. Existe $K_1 > 0$ tal que para $x' > x > 4$ tenemos

$$\left| \sum_{x \leq n \leq x'} \frac{R(n)}{n^2} \right| < K_1.$$

Demostración. TODO. □

Lema 4.8. Para $x' > x > 4$ existen $y \in [x, x']$ y $K_2 \geq 1$ tales que

$$\left| \frac{R(y)}{y} \right| < \frac{K_2}{\ln(x'/x)}.$$

Demostración. TODO. □

Lema 4.9. Para $\delta < 1$ y $x > 4$ existe $y \in [x, e^{K_2/\delta}x]$ tal que $|R(y)| < \delta y$.

Demostración. TODO. □

Lema 4.10. Para $y' > y > 4$ tal que $y/2 \leq y' \leq 2y$ tenemos

$$|R(y')| \leq |R(y)| + |y' - y| + O\left(\frac{y'}{\ln y'}\right).$$

Demostración. TODO. □

Lema 4.11. Existe $y \in (x, e^{K_2/\delta}x)$ tal que para todo $y' \in [y/2, 2y]$ con $\delta < 1$ y $x > 4$ tenemos

$$\left| \frac{R(y')}{y'} \right| < 2\delta + \left| 1 + \frac{y'}{y} \right| + \frac{K_3}{\ln x}.$$

Demostración. TODO. □

Lema 4.12. Para $\delta < 1$, $x > 4$ y $x > e^{K_3/\delta}$, el intervalo $(x, e^{K_2/\delta}x)$ siempre contendrá un subintervalo $(y, e^{\delta/2}y)$ tal que $|R(z)| < 4\delta z$ para todo z en dicho subintervalo.

Demostración. TODO. □

Capítulo 5

Experimentación numérica

5.1 Algoritmos

En esta sección introduciremos a detalle nuestro algoritmo para estimar la fórmula asintótica de Selberg del capítulo 3. Primero, realicemos ciertas manipulaciones a la fórmula demostrada

$$\frac{\sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q - 2x \ln x}{x} = O(1).$$

Por definición, esto significa que existe un momento $n_0 > 0$ y una constante $c > 0$ tales que

$$K(x) = \left| \frac{\sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q - 2x \ln x}{x} \right| \leq c$$

para todo $x \geq n_0$. Convenientemente hemos definido K para poder estimar asintóticamente la identidad de Selberg.

Algorithm 1: Retorna un arreglo dinámico con todos los números primos menores o iguales a x .

```

1 Función ObtenerPrimos( $x$ )
2   Sea  $M[0 \dots x]$  un nuevo arreglo estático
3   Inicializamos  $M[2 \dots x]$  con VERDADERO
4    $M[0] = M[1] = \text{FALSO}$ 
5   Sea  $P$  un nuevo arreglo dinámico
6   for  $n = 2$  to  $x$  do
7     if  $M[n]$  then
8        $\text{INSERT}(P, n)$ 
9     end
10    for  $p \in P$  and  $np \leq x$  do
11       $M[np] = \text{FALSO}$ 
12      if  $p \mid n$  then
13        break
14      end
15    end
16  end
17  return  $P$ 
18 end

```

Algorithm 2: Retorna el máximo primo q mayor o igual a p tal que $pq \leq x$.

```

1  Función ObtenerMáximoPrimo( $p, x, P$ )
2       $l = 0$ 
3       $r = P.length - 1$ 
4      if  $p \cdot P[r] \leq x$  then
5          return  $P[r]$ 
6      end
7      if  $p^2 > x$  then
8          return  $-1$ 
9      end
10     while  $r - l > 1$  do
11          $m = \lfloor (l + r) / 2 \rfloor$ 
12         if  $p \cdot P[m] \leq x$  then
13              $l = m$ 
14         else
15              $r = m$ 
16         end
17     end
18     return  $P[l]$ 
19 end

```

Algorithm 3: Retorna $\sum_{p \leq x} \ln^2 p$ y las sumas parciales de $\sum_{p \leq x} \ln p$.

```

1 Función Sumar1( $x, P$ )
2   Sea  $L[0 \dots x]$  un nuevo arreglo estático
3    $L[0] = 0$ 
4    $s = 0$ 
5    $i = 0$ 
6   for  $n = 1$  to  $x$  do
7     if  $i == P.length$  then
8       break
9     end
10     $L[n] = L[n - 1]$ 
11    if  $P[i] == n$  then
12       $L[n] = L[n] + \ln n$ 
13       $s = s + \ln^2 n$ 
14       $i = i + 1$ 
15    end
16  end
17  return  $s$  y  $L$ 
18 end

```

Algorithm 4: Retorna $\sum_{pq \leq x} \ln p \ln q$.

```

1 Función Sumar2( $x, L, P$ )
2    $s = 0$ 
3   for  $p \in P$  do
4      $q = \text{ObtenerMáximoPrimo}(p, x, P)$ 
5     if  $q == -1$  then
6       break
7     end
8      $s = s + \ln p \cdot (L[q] - L[p - 1])$ 
9   end
10  return  $s$ 
11 end

```

Algorithm 5: Computa $K(x)$

```

1 Función  $K(x)$ 
2    $P = \text{ObtenerPrimos}(x)$ 
3    $s, L = \text{Sumar}_1(x, P)$ 
4    $t = \text{Sumar}_2(x, L, P)$ 
5   return  $|s + t - 2x \ln x| / x$ 
6 end
```

5.2 Estimados

Realizamos nuestros experimentos en una MacBook Pro 15–inch 2017 corriendo Ventura 13.4 con 16GB de RAM y un CPU Quad-Core Intel Core i7 con máxima frecuencia de reloj de 2.9GHz. El procesador contiene 4 núcleos y cada núcleo puede aprovechar 2 hilos con hyper-threading technology habilitada.

```

real 0m3,123s
user 0m2,675s
sys 0m0,436s.
```

Tabla 5.1: Resultado del programa en cada uno de los 28 casos de prueba.

x	$\sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q - 2x \ln x$	$\frac{ \sum_{p \leq x} \ln^2 p + \sum_{pq \leq x} \ln p \ln q - 2x \ln x }{x}$
10	-34.4229638465	3.4422963847
100	-519.2686545658	5.1926865457
1000	-6317.3110617078	6.3173110617
10000	-74463.8721010727	7.4463872101
100000	-859318.2559356594	8.5931825594
1000000	-9747133.5703212193	9.7471335703
1500000	-14918429.3651946987	9.9456195768
2000000	-20177763.7803012519	10.0888818902
2500000	-25505439.7770474999	10.2021759108
3000000	-30875441.5873458827	10.2918138624
3500000	-36291518.9878187147	10.3690054251
4000000	-41746678.7374733434	10.4366696844
4500000	-47221448.8244719136	10.4936552943
5000000	-52725446.2863963772	10.5450892573
5500000	-58263339.7575164592	10.5933345014
6000000	-63830467.8915757891	10.6384113153
6500000	-69414402.9962517989	10.6791389225
7000000	-74998328.6200477667	10.7140469457
7500000	-80619769.8168214446	10.7493026422
8000000	-86252298.0080809856	10.7815372510
8500000	-91907189.6865512790	10.8126105514
9000000	-97554179.0078311940	10.8393532231
9500000	-103244044.9516971762	10.8677942054
10000000	-108942869.8283277971	10.8942869828
15000000	-166436611.9307800680	11.0957741287
20000000	-224778414.1259130784	11.2389207063
25000000	-283766370.6499844969	11.3506548260
30000000	-343248619.2823745428	11.4416206427

Bibliografía

- [Apo76] Tom M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Springer New York, 1976.
- [Bre60] Robert Breusch, *An elementary proof of the prime number theorem with remainder term*, Pacific Journal of Mathematics **10** (1960), no. 2, 487 – 497.
- [Che52] Pafnuty Chebyshev, *Mémoire sur les nombres premiers*, Journal de mathématiques pures et appliquées **1** (1852), no. 17, 366 – 390.
- [Cho17] Abhimanyu Choudhary, *An Elementary Proof of the Prime Number Theorem*, 2017.
- [Dia82] Harold G. Diamond, *Elementary methods in the study of the distribution of prime numbers*, Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society **7** (1982), no. 3, 553 – 589.
- [Erd49] P. Erdős, *On a New Method in Elementary Number Theory Which Leads to An Elementary Proof of the Prime Number Theorem*, Proceedings of the National Academy of Sciences **35** (1949), no. 7, 374–384.
- [Had96] J. Hadamard, *Sur la distribution des zéros de la fonction $\zeta(s)$ et ses conséquences arithmétiques*, Bull. Soc. Math. France **24** (1896), 199–220. MR 1504264
- [Lev69] Norman Levinson, *A Motivated Account of an Elementary Proof of the Prime Number Theorem*, The American Mathematical Monthly **76** (1969), no. 3, 225.
- [Liu22] Zihao Liu, *A Direct Proof of the Prime Number Theorem using Riemann’s Prime-counting Function*, Journal of Physics: Conference Series **2287** (2022), no. 1, 012008.
- [Mer74] Franz Mertens, *Ein Beitrag zur analytischen Zahlentheorie*, Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) **1874** (1874), no. 78, 46–62.
- [New80] D. J. Newman, *Simple Analytic Proof of the Prime Number Theorem*, The American Mathematical Monthly **87** (1980), no. 9, 693.

-
- [Ric21] Florian K. Richter, *A new elementary proof of the Prime Number Theorem*, Bulletin of the London Mathematical Society **53** (2021), no. 5, 1365–1375.
- [Sel49] Atle Selberg, *An Elementary Proof of the Prime-Number Theorem*, The Annals of Mathematics **50** (1949), no. 2, 305.
- [Sha59] Harold N. Shapiro, *Tauberian Theorems and Elementary Prime Number Theory*, Communications on Pure and Applied Mathematics **12** (1959), no. 4, 579–610.
- [TI51] Tikao Tatzuza and Kaneshiroo Iseki, *On Selberg's Elementary Proof of the Prime-Number Theorem*, Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences **27** (1951), no. 7.