

9,0

Nombre del estudiante: **Randalth Cristobal Medina Flores**

```
## -- Attaching packages -----
tidyverse 1.3.0 --

## v ggplot2 3.3.2      v purrr  0.3.4
## v tibble  3.0.3      v dplyr  1.0.2
## v tidyr   1.1.2      v stringr 1.4.0
## v readr   1.3.1      v forcats 0.5.0

## -- Conflicts -----
tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()

library(rio)
library(DescTools)
library(emmeans)
library(modelbased)
library(see)
library(parameters)
library(rio)
library(knitr)
library(flextable)
library(tidyverse)
library(fabriceirin)
library(visdat)
library(vtree)
```

Señala con **letra** (en este documento) la respuesta correcta. Devuelve el documento en formato PDF. Asegúrate de incluir tu nombre.

####1. Llena las palabras faltantes:

El grupo entero de individuos sobre el cual la información es requerida es llamada Los individuos son llamados La es la parte que es examinada para extraer información.



- a. población, variables explicativas, subgrupo
- b. población, unidades de muestreo, muestra**
- b. muestra, unidades de muestreo, población meta
- c. conjunto, ítem de interés, estrato

✓

####2. En un estudio de la ecología de una especie de pez se colectaron las siguientes variables para cada individuo:

Sexo, peso inicial, temperatura corporal, peso ganado.

Escoge la respuesta correcta respecto al tipo de variables que se colectaron

- a. Nominal, racional, racional, racional 
- b. Nominal, racional, intervalo, intervalo
- c. Ordinal, racional, intervalo, racional
- d. Nominal, racional, intervalo, racional 
- e. Ordinal, intervalo, racional, intervalo

####3. A partir de una muestra, el peso (kg) de mapaches del Parque Nacional Manuel Antonio resulta en los siguientes valores.

6.7, 2.7, 2.5, 3.6, 3.4, 4.1, 4.8, 5.9, 8.3

Ayuda: Crea el siguiente objeto "a" en R con los pesos de los mapaches:

```
a <- c(6.7, 2.7, 2.5, 3.6, 3.4, 4.1, 4.8, 5.9, 8.3)
```

¿Cuáles son el peso medio y el desvío estándar?

```
a <- c(6.7, 2.7, 2.5, 3.6, 3.4, 4.1, 4.8, 5.9, 8.3)
```

```
media = mean(a)  
de = sd(a)
```

```
media ## [1] 4.666667
```

```
de ## [1] 1.952562
```

####4. Estos son los largos totales (cm) de 5 caimanes:

165, 175, 176, 159, 170

Ayuda: crea un objeto "b" en R con las medidas de los caimanes:

```
b <- c(165, 175, 176, 159, 170)
```

¿Cuáles son la mediana muestral y la media muestral?

```
b <- c(165, 175, 176, 159, 170)
```

```
media_muestral = mean(b)  
mediana_muestral = median(b)
```

```
media_muestral ## [1] 169
```

```
mediana_muestral ## [1] 170
```

####5. Si la mayoría de los valores de un conjunto de datos son de aproximadamente de la misma magnitud excepto por unas pocas medidas que son bastante más grandes, ¿cómo serán la media y la mediana del conjunto de datos y que forma tendría el histograma?

- a. La media sería más pequeña que la mediana y el histograma sería asimétrico con una larga cola izquierda.
- b. La media será más grande que la mediana y el histograma sería asimétrico con una larga cola derecha. ✓
- b. La media sería más larga que la mediana y el histograma sería asimétrico con una larga cola izquierda.
- c. La media sería más pequeña que la mediana y el histograma sería asimétrico con una larga cola derecha.
- d. La media sería igual a la mediana y el histograma sería simétrico.

####6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO?

- a. La media muestral no es sensible a valores extremos. ✓
- b. El rango muestral no es sensible a valores extremos.
- c. El desvío estándar es una medida de dispersión alrededor de la media.
- c. El desvío estándar es una medida tendencia central alrededor de la media.
- d. Si la distribución es simétrica, entonces la media no es igual a la mediana.

####7. Se te permite escoger 4 números del 1 al 10 (sin reemplazo). ¿Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO?

- a. Los números 4,5,6,7, tienen el mayor desvío estándar.
- b. Los números 1,2,3,4, tienen el mayor desvío estándar.
- c. Los números 1,5,6,10, tienen el mayor desvío estándar.
- d. Los números 1,2,9,10, tienen el mayor desvío estándar. ✓
- d. Los números 7,8,9,10, tienen el menor desvío estándar.

####8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO?:

- a. Los números 3,3,3 tienen un desvío estándar de 3.
- b. Los números 3,4,5 tienen un desvío estándar menor al desvío estándar de los números 1003, 1004, 1005. ✓
- c. La varianza es el desvío estándar al cuadrado.
- c. La moda es el valor que menos se repite.
- d. La media es una medida de dispersión de los datos.

####9. Con los datos “alas.txt” (carpeta Datos) que contiene las longitudes de alas de una especie de aves en 2 localidades diferentes, calcula la media para cada localidad. Inserta un R chunk y escribe el código

```
alas <- import("datos/alas.xlsx")

head(alas)


##   longitud localidad
## 1 29.31140         A
## 2 25.96292         A
## 3 24.47853         A
## 4 22.94904         A
## 5 22.25191         A
## 6 25.20959         A

media_pl <- alas %>%
  group_by(localidad) %>%
  summarise(media = mean(longitud))

## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)

media_pl

##   localidad      media
##   <chr>      <dbl>
## 1 A         24.1
## 2 B         25.2
```



####10. Con los datos “alas.txt” que contiene las longitudes de alas de una especie de aves en 2 localidades diferentes, realiza un gráfico de caja (boxplot) y un gráfico de violín para cada localidad. Inserta un R chunk y escribe el código

```
ggplot(alas, aes(x = localidad, y = longitud)) +
  geom_boxplot() +
  geom_violin(alpha = 0.4) +
  geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.3)
```

