

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

---

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

## INFERENCIA ESTADÍSTICA BASADA EN EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS SISMOS EN VARIAS REGIONES DE LA COSTA DEL PACÍFICO DE MÉXICO

IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
QUE PRESENTA EL:

ING. JOSÉ MANUEL VILLA VARGAS

PARA OBTENER EL GRADO DE:  
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

DIRECTOR DE TESIS:  
DR. JOSÉ ANTONIO CLIMENT HERNÁNDEZ



# Resumen

El presente trabajo desarrolla un análisis probabilista para la inferencia de eventos sísmicos significativos en la costa del Pacífico mexicano, región con una alta actividad sísmica. Utilizando datos históricos del Servicio Sismológico Nacional de México desde 1900 hasta julio de 2025, se implementó una metodología sistemática que comprende estadística descriptiva, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y pruebas de bondad de ajuste para seis regiones: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Resto Nacional y Sismos Nacionales. Los resultados revelan que las distribuciones Gumbel, Weibull, GEV, Logística y Normal ajustan adecuadamente los datos de Magnitudes Máximas anuales según la región analizada, mientras que ninguna distribución ajustó satisfactoriamente para los Sismos Totales. Se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre las regiones en términos de media, varianza y proporción de sismos superiores a  $6.5^\circ$ . Este trabajo busca proporcionar una base robusta para la estimación probabilista de eventos sísmicos futuros en México y contribuir al desarrollo de políticas de prevención y concientización del peligro sísmico existente en México.

**Palabras clave:** Inferencia Sísmica, análisis probabilista, estadísticos descriptivos, pruebas de bondad de ajuste, pruebas de hipótesis, sismos en la costa del Pacífico Mexicano.



# Abstract

This study develops a probabilistic analysis for the inference of significant seismic events on the Mexican Pacific coast, a region with high seismic activity. Using historical data from the Mexican National Seismological Service from 1900 to July 2025, a systematic methodology was implemented. This methodology includes descriptive statistics, confidence intervals, hypothesis testing, and goodness-of-fit tests for six regions: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, the rest of the country, and national seismic events. The results reveal that the Gumbel, Weibull, GEV, Logistic, and Normal distributions adequately fit the annual Maximum Magnitudes data, depending on the region analyzed. In contrast, no distribution satisfactorily fit the data for Total Earthquakes. Statistically significant differences were identified among the regions in terms of mean, variance, and the proportion of earthquakes with a magnitude greater than 6.5. This work aims to provide a robust basis for the probabilistic estimation of future seismic events in Mexico and to contribute to the development of prevention policies and awareness of the existing seismic hazard in the country.

**Keywords:** Seismic Inference, probabilistic analysis, descriptive statistics, goodness-of-fit test, hypothesis testing, earthquakes on the Mexican Pacific coast.



# Dedicatoria

// Esta sección se presenta en la versión final de su ICR. Son frases cuyo objetivo es otorgar una mención especial a las personas que te han motivado durante tu ICR.



# Agradecimientos

// Esta sección se presenta en la versión final de su ICR. Son frases cuyo objetivo es plasmar el apoyo moral, físico, económico y/o emocional que recibió de las personas o instituciones durante la elaboración de todo su proyecto.



# Índice general

<b>Resumen</b>	<b>III</b>
<b>Abstract</b>	<b>V</b>
<b>Dedicatoria</b>	<b>VII</b>
<b>Agradecimientos</b>	<b>IX</b>
<b>Índice general</b>	<b>XIII</b>
<b>Índice de tablas</b>	<b>XVI</b>
<b>Índice de figuras</b>	<b>XVII</b>
<b>Simbología y Acrónimos</b>	<b>XIX</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Planteamiento del problema . . . . .	2
1.2. Justificación . . . . .	2
1.3. Objetivos . . . . .	3
1.3.1. Objetivo general . . . . .	3
1.3.2. Objetivos específicos . . . . .	3
1.4. Principales contribuciones . . . . .	3
1.5. Organización del documento . . . . .	4
<b>2. Marco teórico</b>	<b>5</b>
2.1. Síntesis de los artículos . . . . .	6
<b>3. Estado del arte</b>	<b>13</b>
3.1. Revisión del estado del arte . . . . .	13
3.2. Análisis del estado del arte . . . . .	15

<b>4. Metodología</b>	<b>17</b>
4.1. Metodología de investigación . . . . .	17
4.2. Fases de desarrollo del proyecto . . . . .	18
4.2.1. Media aritmética . . . . .	19
4.2.2. Mediana . . . . .	19
4.2.3. Moda . . . . .	19
4.2.4. Varianza muestral . . . . .	19
4.2.5. Desviación estándar . . . . .	20
4.2.6. Coeficiente de asimetría . . . . .	20
4.2.7. Coeficiente de curtosis . . . . .	20
4.2.8. Intervalo de confianza para la media . . . . .	21
4.2.9. Intervalo de confianza para la varianza . . . . .	21
4.2.10. Intervalo de confianza para la proporción . . . . .	22
4.2.11. Prueba de hipótesis para el cociente de varianzas (prueba F) . . . . .	22
4.2.12. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas iguales (pooled)	23
4.2.13. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas diferentes (Welch) . . . . .	23
4.2.14. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones con proporciones agrupadas o iguales (pooled) . . . . .	24
4.2.15. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones sin agrupamiento o diferentes . . . . .	24
4.2.16. Prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov . . . . .	25
4.2.17. Prueba de bondad de ajuste Anderson-Darling . . . . .	25
4.2.18. Prueba de bondad de ajuste Lilliefors . . . . .	26
4.2.19. Criterio de Información Bayesiano . . . . .	26
4.2.20. Selección de la distribución óptima por región . . . . .	26
4.2.21. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud . . . . .	27
4.2.22. Cálculo del periodo de retorno . . . . .	27
4.2.23. Cálculo del nivel de retorno . . . . .	27
4.2.24. Cálculo de probabilidades de excedencia . . . . .	29
4.2.25. Interpretación de los resultados . . . . .	30
<b>5. Análisis de resultados</b>	<b>31</b>
5.1. Herramientas utilizadas . . . . .	31
5.2. Resultados de estadísticos descriptivos . . . . .	31
5.3. Representación gráfica de los datos sísmicos . . . . .	32
5.3.1. Histogramas de densidad de los sismos para sismos totales . . . . .	33
5.3.2. Histogramas de densidad de los sismos para magnitudes máximas . . . . .	34
5.3.3. Histogramas de frecuencias relativas por mes para sismos totales . . . . .	36
5.3.4. Histogramas de frecuencias relativas por mes para magnitudes máximas . . . . .	37
5.3.5. Histogramas de sismos por magnitud . . . . .	38
5.3.6. Gráfico de magnitud máxima, promedio y mínima en el tiempo . . . . .	39
5.4. Intervalos de confianza y tamaño mínimo de la muestra . . . . .	40
5.4.1. Intervalo de confianza para la media . . . . .	40

5.4.2.	Intervalo de confianza para la varianza . . . . .	42
5.4.3.	Intervalo de confianza para la proporción de sismos mayores al umbral crítico . . . . .	43
5.4.4.	Resultados de las pruebas de proporciones mayores a 6.5° . . . . .	45
5.5.	Estimación del tamaño mínimo de la muestra para la media . . . . .	46
5.6.	Pruebas de hipótesis . . . . .	48
5.6.1.	Prueba de hipótesis para el cociente de varianzas (prueba F) . . . . .	49
5.6.2.	Prueba de hipótesis para diferencia de medias . . . . .	51
5.6.3.	Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones iguales . . . . .	53
5.6.4.	Prueba de hipótesis para diferencias de proporciones diferentes . . . . .	55
5.6.5.	Resumen de las pruebas de hipótesis . . . . .	58
5.7.	Criterio de Información Bayesiano (BIC) . . . . .	61
5.8.	Pruebas de bondad de ajuste KS, AD, LF . . . . .	61
5.8.1.	Oaxaca resultados de PBA para Sismos Totales . . . . .	62
5.8.2.	Oaxaca resultados de PBA para Magnitudes Máximas . . . . .	62
5.8.3.	Guerrero resultados de PBA para Sismos Totales . . . . .	63
5.8.4.	Guerrero resultados de PBA para Magnitudes Máximas . . . . .	64
5.8.5.	Michoacán resultados de PBA para Sismos Totales . . . . .	65
5.8.6.	Michoacán resultados de PBA para Magnitudes Máximas . . . . .	66
5.8.7.	Chiapas resultados de PBA para Sismos Totales . . . . .	67
5.8.8.	Chiapas resultados de PBA para Magnitudes Máximas . . . . .	67
5.8.9.	Resto Nacionales resultados de PBA para Sismos Totales . . . . .	68
5.8.10.	Resto Nacionales resultados de PBA para Magnitudes Máximas . . . . .	70
5.8.11.	Sismos Nacionales resultados de PBA para Sismos Totales . . . . .	71
5.8.12.	Sismos Nacionales resultados de PBA para Magnitudes Máximas . . . . .	72
5.9.	Resumen de Resultados de Bondad de Ajuste y BIC . . . . .	73
5.9.1.	Oaxaca . . . . .	73
5.9.2.	Guerrero . . . . .	74
5.9.3.	Michoacán . . . . .	75
5.9.4.	Chiapas . . . . .	75
5.9.5.	Resto Nacionales . . . . .	76
5.9.6.	Sismos Nacionales . . . . .	77
5.10.	Graficos de las mejores distribuciones seleccionadas . . . . .	77
5.10.1.	Oaxaca . . . . .	77
5.10.2.	Guerrero . . . . .	78
5.10.3.	Michoacán . . . . .	78
5.10.4.	Chiapas . . . . .	79
5.10.5.	Resto Nacionales . . . . .	79
5.10.6.	Sismos Nacionales . . . . .	80

## **6. Conclusiones** **81**

### **A. Anexo 1** **83**

### **Bibliografía** **87**



# Índice de tablas

1.	Artículos seleccionados. . . . .	5
2.	Distribuciones óptimas por región según pruebas de bondad de ajuste. . . . .	27
3.	Estadísticos descriptivos consolidados. . . . .	32
4.	IC para la media para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	41
5.	IC para la media para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	41
6.	IC para la varianza para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	42
7.	IC para la varianza para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	43
8.	IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	43
9.	IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	44
10.	Comparación entre todas las regiones de la proporción de sismos mayor al umbral crítico para sismos totales. . . . .	45
11.	Comparación entre todas las regiones de la proporción de sismos mayor al umbral crítico para magnitudes máximas. . . . .	46
12.	Tamaño mínimo de la muestra para las 6 regiones para sismos totales. . . . .	47
13.	Tamaño mínimo de la muestra para las 6 regiones para magnitudes máximas. . . . .	48
14.	Resultados de las pruebas de hipótesis para cociente de varianzas para sismos totales. . . . .	49
15.	Resultados de las pruebas de hipótesis para cociente de varianzas para magnitudes máximas. . . . .	50
16.	Resultados de las pruebas de hipótesis para diferencia de medias para sismos totales. . . . .	51
17.	Resultados de las pruebas de hipótesis para diferencia de medias para magnitudes máximas. . . . .	52
18.	Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones iguales para sismos totales. . . . .	53
19.	Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones iguales para magnitudes máximas. . . . .	54
20.	Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones diferentes para sismos totales. . . . .	56
21.	Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones diferentes para magnitudes máximas. . . . .	57
22.	Resultados del Criterio de Información Bayesiano (BIC) para modelos ajustados. . . . .	61

23.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales. . . . .	62
24.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas. . . . .	62
25.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Guerrero. . .	63
26.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Guerrero. . . . .	64
27.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Michoacán. .	65
28.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Michoacán. . . . .	66
29.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Chiapas. . .	67
30.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Chiapas. .	68
31.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Resto Nacionales. . . . .	69
32.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Resto Nacionales. . . . .	70
33.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Sismos Nacionales. . . . .	71
34.	Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Sismos Nacionales. . . . .	72
35.	Mejores distribuciones para Oaxaca - Sismos Totales. . . . .	73
36.	Mejores distribuciones para Oaxaca - Magnitudes Máximas. . . . .	74
37.	Mejores distribuciones para Guerrero - Sismos Totales. . . . .	74
38.	Mejores distribuciones para Guerrero - Magnitudes Máximas. . . . .	74
39.	Mejores distribuciones para Michoacán - Sismos Totales. . . . .	75
40.	Mejores distribuciones para Michoacán - Magnitudes Máximas. . . . .	75
41.	Mejores distribuciones para Chiapas - Sismos Totales. . . . .	75
42.	Mejores distribuciones para Chiapas - Magnitudes Máximas. . . . .	76
43.	Mejores distribuciones para Resto Nacionales - Sismos Totales. . . . .	76
44.	Mejores distribuciones para Resto Nacionales - Magnitudes Máximas. . . . .	76
45.	Mejores distribuciones para Sismos Nacionales - Sismos Totales. . . . .	77
46.	Mejores distribuciones para Sismos Nacionales - Magnitudes Máximas. . . . .	77

# Índice de figuras

1.	Diagrama de flujo de la aplicación de la metodología propuesta. . . . .	17
2.	Histogramas de densidad de sismos totales para las 6 regiones. . . . .	33
3.	Histogramas de densidad de magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	34
4.	Histogramas de Frecuencias Relativas por Mes para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	36
5.	Histogramas de Frecuencias Relativas por Mes para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	37
6.	Histogramas de sismos por magnitud para las 6 regiones. . . . .	38
7.	Gráficos de magnitud sísmica máxima, promedio y mínima para las 6 regiones. .	40
8.	IC para la media para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	41
9.	IC para la media para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	42
10.	IC para la varianza para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	42
11.	IC para la varianza para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	43
12.	IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para sismos totales para las 6 regiones. . . . .	44
13.	IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas para las 6 regiones. . . . .	45
14.	Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Oaxaca con una curva Gumbel. . . . .	78
15.	Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Guerrero con una curva Weibul. . . . .	78
16.	Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Michoacán con una curva GEV. . . . .	79
17.	Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Chiapas con una curva Weibul. . . . .	79
18.	Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Resto Nacionales con una curva Logística. . . . .	80
19.	Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Sismos Nacionales con una curva Normal. . . . .	80



# Simbología y Acrónimos

## Simbología Estadística

$\bar{x}$	Media aritmética o promedio
$\tilde{x}$	Mediana
$\hat{x}$	Moda
$s_x^2$	Varianza muestral
$s_x$	Desviación estándar muestral
$g_1$	Coefficiente de asimetría
$g_2$	Coefficiente de curtosis
$n$	Tamaño de la muestra
$N$	Tamaño de la población
$\alpha$	Nivel de significancia
$1 - \alpha$	Nivel de confianza
$H_0$	Hipótesis nula
$H_1$	Hipótesis alternativa
$\mu$	Media poblacional
$\sigma^2$	Varianza poblacional
$\sigma$	Desviación estándar poblacional
$\pi$	Proporción poblacional
$p$	Proporción muestral

$IC$	Intervalo de confianza
$\varepsilon$	Error máximo tolerado
$F$	Estadístico F de Fisher
$t$	Estadístico t de Student
$z$	Estadístico z
$\chi^2$	Estadístico chi-cuadrada
$D$	Estadístico de Kolmogorov-Smirnov
$A_n$	Estadístico de Anderson-Darling

## Acrónimos

AD	Anderson-Darling (prueba de bondad de ajuste)
AHP	Proceso de Jerarquía Analítica (Analytic Hierarchy Process)
AIC	Criterio de Información de Akaike
BIC	Criterio de Información Bayesiano
BPT	Brownian Passage Time
CNNC	Red Neuronal Convolutacional (Convolutional Neural Network)
ETAS	Epidemic Type Aftershock Sequence
GEV	Distribución Generalizada de Valores Extremos
GMPE	Ecuación de Predicción del Movimiento del Suelo
IA	Inteligencia Artificial
IC	Intervalo de Confianza
ICR	Idónea Comunicación de Resultados
KS	Kolmogorov-Smirnov (prueba de bondad de ajuste)
LF	Lilliefors (prueba de bondad de ajuste)
PBA	Pruebas de Bondad de Ajuste
PH	Pruebas de Hipótesis
PSHA	Análisis Probabilista de Peligrosidad Sísmica

RN	Resto Nacionales
SSN	Servicio Sismológico Nacional
SSNMX	Servicio Sismológico Nacional de México
SN	Sismos Nacionales
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México



## Introducción

A través de la historia, la humanidad ha sufrido de catástrofes naturales que impactan directamente la vida del ser humano. Las catástrofes naturales son de varios tipos como inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, sequías, incendios, sismos o terremotos y tsunamis o marejadas, entre varios otros.

La inferencia de la ocurrencia de alguno de estos eventos catastróficos es de utilidad para la humanidad. Y dadas las consecuencias que estos eventos tienen sobre la forma de vida de la gente y como alteran su realidad de un momento a otro, es importante el estudio y la comprensión del comportamiento de los eventos a lo largo de un periodo de tiempo, buscando la forma de inferir y prepararse para cuando estos ocurran.

Dentro de los tipos de catástrofes mencionadas anteriormente, los sismos o terremotos son uno de los que mayor impacto tienen para la vida humana y para la infraestructura urbana y rural, porque estos además del daño que causan por el evento en sí, tienen la particularidad de que provocan otros eventos de catástrofes naturales como incendios, deslizamientos, tsunamis y daños colaterales en infraestructuras como los derrumbes y daños estructurales en edificaciones, cortes al suministro eléctrico, fallas en los sistemas de telecomunicaciones, daños en la red de carreteras, trenes, aeronaves, suministro de agua, alimentos, medicinas y finalmente, presentando un fuerte declive en la economía de los lugares afectados.

Una de las zonas sísmicas más activas en el mundo es la costa del Pacífico de México (que se encuentra en el cinturón de fuego del pacífico) en la cual se presentan frecuentemente sismos de magnitud significativa que impactan a las zonas de ocurrencia y centros urbanos en un radio de 0 a 500 kilómetros de distancia del epicentro de los sismos.

Actualmente son desarrollados y producidos diferentes métodos para inferir la probabilidad de ocurrencia de un sismo en una zona específica. Estas técnicas varían en metodología como en las formas de estudiar e inferir la ocurrencia de un sismo de magnitud significativa para la vida humana.

El presente trabajo utiliza como referencia los datos otorgados por el Servicio Sismológico Nacional de México (SSNMx) con el propósito de realizar un análisis probabilista para la ocurrencia de un sismo de magnitud significativo (mayor a 5° Richter) en los estados de mayor actividad sísmica en la costa del pacífico de la República Mexicana, con fundamento en la muestra de datos del SSNMx que data del 1 de enero del año 1900 hasta julio de 2025. La metodología aplicada comprende estadística descriptiva, intervalos de confianza, estimación

de tamaño mínimo de muestra, pruebas de hipótesis, así como pruebas de bondad de ajuste para diferentes distribuciones y estimación de periodos de retorno en años, que justifiquen los resultados.

### 1.1. Planteamiento del problema

La predicción de ocurrencia de un sismo de magnitud considerable es hasta la fecha imprecisa y difícil de determinar mediante algún cálculo o estudio que es realizado previamente. Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad se están utilizando diferentes técnicas basadas en distintos planteamientos, que apuntan hacia el mismo objetivo: estimar con un nivel de significación mínimo la próxima ocurrencia de un sismo en una zona de estudio delimitada.

Además de la dificultad encontrada por se de predecir un sismo significativo, están las siguientes problemáticas que conlleva el obtener un resultado más certero, como lo son: falta de datos históricos por tecnologías anticuadas o por no tener una escala estándar antes de 1935 (Richter 1935), también porque hay sismos de magnitud baja que no son registrados, por confusión con otros eventos naturales (como tremores volcánicos, explosiones o impactos terrestres), porque la medición no refleje la magnitud real del sismo (mediciones inexactas, o por falla en la calibración de los equipos) y por sus patrones no periódicos de ocurrencia (que un sismo no muestra patrones de repetición de evento exacta ni periódica, son aleatorios).

### 1.2. Justificación

La inferencia de sismos es de vital importancia para desarrollar políticas de prevención de desastres derivados de la actividad sísmica de magnitud considerable. Aunque actualmente sigue siendo muy complejo el poder estimar la fecha de ocurrencia de un sismo fuerte en una región determinada, se trabaja continuamente en múltiples aproximaciones para poder realizar con un alto grado de certeza la estimación de ocurrencia de un sismo significativo futuro.

La mayoría de las técnicas que se emplean actualmente tienen que ver con uso y aplicación de inteligencia artificial y redes neuronales alimentadas por datos históricos y ecuaciones de movimiento sísmico.

Es aquí donde se considera importante la existencia de un proyecto como el presente el cual propone un enfoque basado en análisis probabilista. La metodología implementada sigue pasos sistemáticos y repetibles que permiten entender mejor el fenómeno sísmico en los estados estudiados. Esta metodología integra la obtención de estadísticos descriptivos para cada estado, la determinación de intervalos de confianza para la media, desviación y proporción de sismos mayores a un umbral crítico, la estimación del tamaño mínimo de la muestra, la realización de pruebas de hipótesis para media, varianza y proporción de sismos y de pruebas de bondad de ajuste para varias distribuciones. Todo esto con el fin de poder inferir con un nivel de certeza próximos eventos sísmicos en los estados analizados.

También, este proyecto es relevante pues se enfoca en los estados de mayor actividad y riesgo sísmico de México, diferenciando este trabajo de otros que se enfocan en otras regiones del planeta o no son minuciosos en sus estudios de la actividad sísmica en México.

## 1.3. Objetivos

### 1.3.1. Objetivo general

Se pretende obtener resultados fiables mediante la aplicación de cálculos de inferencia probabilista para la ocurrencia de un sismo de magnitud significativa con un nivel de confianza en la costa del Pacífico mexicano.

### 1.3.2. Objetivos específicos

1. Identificar una correlación significativa en los datos históricos de los sismos en la costa del Pacífico mexicano mediante el análisis de los datos disponibles de los mismos.
2. Aplicar el cálculo de probabilidad, los estadísticos descriptivos, pruebas de hipótesis, pruebas de bondad de ajuste a los datos históricos de los sismos para obtener una estimación del intervalo de confianza del siguiente evento sísmico.
3. Programar en la herramienta R y RStudio los algoritmos de estimación de estadísticos descriptivos, de intervalos de confianza, de tamaño mínimo de la muestra, de pruebas de hipótesis y de pruebas de bondad de ajuste, así como generar gráficos y tablas representativos de estos.

## 1.4. Principales contribuciones

Las principales contribuciones de este trabajo de investigación se listan a continuación:

1. **Análisis estadístico por región:** Se realiza un análisis completo y exhaustivo de la actividad sísmica en seis regiones de México, diferenciándose de otros estudios y logrando identificar que cada estado de la costa del Pacífico presenta un comportamiento sísmico único con distribuciones probabilísticas específicas (Gumbel para Oaxaca, Weibull para Guerrero y Chiapas, distribución generalizada de valores extremos para Michoacán).
2. **Metodología replicable:** Se desarrolla e implementa una metodología sistemática y reproducible que integra múltiples técnicas estadísticas (estadísticos descriptivos, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y pruebas de bondad de ajuste para 20 distribuciones), estableciendo una metodología robusta enfocada al análisis sísmico y que puede aplicarse a otras regiones sísmicamente activas.
3. **Identificación de patrones temporales significativos:** Se determina la existencia de patrones mensuales de actividad sísmica diferenciados por región, identificando septiembre como el mes de mayor actividad sísmica nacional, hallazgo relevante en el ámbito del fenómeno sísmico en México.
4. **Validación de umbrales críticos:** Se establece mediante pruebas estadísticas que la proporción de sismos mayores a  $6.5^{\circ}$  varía significativamente entre regiones, lo cual proporciona una base sólida para la diferenciación del riesgo sísmico regional identificando las regiones con mayor propensión a sufrir de sismos fuertes.

5. **Código computacional en R:** Se desarrolla e implementa un conjunto completo de algoritmos en R y RStudio para el procesamiento automatizado de datos sísmicos, disponible para su uso y adaptación, facilitando la replicación, escalabilidad y adaptabilidad del mismo a cualquier tipo de análisis sísmico con fundamentos estadísticos.

## 1.5. Organización del documento

El presente documento se estructura en seis capítulos que desarrollan de manera sistemática y progresiva la investigación realizada sobre la inferencia probabilística de eventos sísmicos en la costa del Pacífico mexicano.

El **Capítulo 1** presenta la introducción general al problema de investigación, estableciendo el contexto de la actividad sísmica en México y su impacto en la población e infraestructura. Se define el planteamiento del problema, la justificación del estudio, los objetivos generales y específicos, las principales contribuciones y la presente organización del documento.

El **Capítulo 2** desarrolla el marco teórico fundamental, presentando una revisión exhaustiva de 16 artículos científicos seleccionados que abordan metodologías de predicción sísmica, técnicas estadísticas y de inteligencia artificial aplicadas a la sismología. Se realiza una síntesis crítica de los enfoques existentes, desde modelos probabilísticos clásicos hasta técnicas de aprendizaje profundo, estableciendo el fundamento teórico para la metodología propuesta.

El **Capítulo 3** expone el estado del arte en predicción sísmica, analizando detalladamente los trabajos más relevantes en el campo. Se examinan las técnicas implementadas globalmente, desde modelos log-lineales y distribuciones gamma hasta redes neuronales convolucionales, identificando las fortalezas y limitaciones de cada enfoque. Se destaca la aplicación de estas metodologías en diferentes regiones sísmicas del mundo y su relevancia para el contexto mexicano.

El **Capítulo 4** describe la metodología de investigación implementada, detallando las 10 fases del proceso analítico: desde la recopilación y filtrado de datos del Servicio Sismológico Nacional, hasta la aplicación de pruebas de bondad de ajuste y cálculos de probabilidad. Se presentan las formulaciones matemáticas de los estadísticos descriptivos, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y criterios de selección de modelos utilizados.

El **Capítulo 5** presenta el análisis exhaustivo de los resultados obtenidos. Se muestran los estadísticos descriptivos calculados para las seis regiones estudiadas, las representaciones gráficas del comportamiento sísmico histórico, los intervalos de confianza estimados, los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas y la identificación de las distribuciones probabilísticas que mejor ajustan los datos de cada región. Se incluyen 26 tablas y 17 figuras que sintetizan los hallazgos principales.

El **Capítulo 6** expone las conclusiones del trabajo, sintetizando los logros alcanzados respecto a los objetivos planteados, las limitaciones identificadas durante la investigación y las líneas de trabajo futuro propuestas para extender y mejorar la metodología desarrollada.

Finalmente, se incluye un apéndice con información complementaria de los artículos revisados, la síntesis del código utilizado y la bibliografía completa con las referencias utilizadas en el desarrollo de la investigación.

## Marco teórico

Se procede a la revisión de artículos y publicaciones que tienen que ver directamente con el tema de la problemática a solucionar.

A continuación, se presenta la Tabla 1 que muestra una selección de los artículos relacionados a la metodología que se utiliza a lo largo de este trabajo.

**Tabla 1:** Artículos seleccionados.

Año	Título y Autor
2023	“Earthquakes magnitude prediction using deep learning for the Horn of Africa” (Abebe, Kebede, Kevin y Demissie 2023)
2020	“Application of Artificial Intelligence in Predicting Earthquakes: State-of-the-Art and Future Challenges” (Al Banna, Taher, Kaiser, Mahmud, Rahman, Hosen y Cho 2020)
2007	“Análisis geográfico y estadístico de la sismicidad en la costa mexicana del Pacífico” (Barrientos, Fernandez y Rivero 2007)
2023	“Peak-over-threshold versus annual maxima: Which approach is better for extreme value analysis?” (Bommier 2023)
2001	“An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values” (Coles 2001)
2021	“Extreme Value Theory - 20 years on” (Coles, Bawa, Trenner y Dorazio 2021)
2020	“Combining stress transfer and source clustering to forecast seismicity” (Convertito, Catalli y Emolo 2020)
2021	“Time-Dependent Seismic Hazard Analysis for Induced Seismicity: The Case of St Gallen (Switzerland), Geothermal Field” (Convertito, Ebrahimian, Amoroso, Jalayer, De Matteis y Capuano 2021)
1968	“Engineering seismic risk analysis” (Cornell 1968)
2005	“A probabilistic prediction of the next strong earthquake in the Acapulco-San Marcos segment, Mexico” (Ferrães 2005)
2022	“Long-Term Forecasting of Strong Earthquakes in North America, South America, Japan, Southern China and Northern India With Machine Learning” (Velasco Herrera, Rossello, Orgeira, Arioni, Soon, Velasco y Vera 2022)
2021	“Earthquake risk assessment in NE India using deep learning and geospatial analysis” (Jena, Pradhan, Naik y Alamri 2021)
1995	“Continuous Univariate Distributions” (Johnson, Kotz y Balakrishnan 1995)
2023	“Fundamental study on probabilistic generative modeling of earthquake ground motion time histories using generative adversarial networks” (Matsumoto, Yaoyama, Lee, Hida y Itoi 2023)

## 2. Introducción

Año	Título y Autor
2021	“Best practices in physics-based fault rupture forecasting for seismic hazard assessment of nuclear installations: issues and challenges towards full integration” (Mignan, Danciu y Giardini 2021)
2020	“Ground motion prediction equation for crustal earthquakes in Taiwan” (Phung, Loh, Chao, Chiou y Huang 2020)
2021	“Earthquake source parameters of the Michoacán seismic gap” (Ramírez-Gaytán, Aguirre-González y Núñez-Cornú 2021)
1935	“An instrumental earthquake magnitude scale” (Richter 1935)
2021	“Theoretical methodological aspects about earthquake prediction” (Galbán-Rodríguez 2021)
2020	“Real-time updating of the seismic risk of interdependent infrastructure systems using Bayesian networks” (Sánchez-Silva y Riaño 2020)
2023	“Probabilistic seismic hazard assessment for Western Mexico” (Sawires, Peláez y Santoyo 2023)
2021	“Understanding persistence to avoid underestimation of collective flood risk” (Serinaldi y Kilsby 2021)
2025	“Hypothesis Testing, P Values, Confidence Intervals, and Significance” (Shreffler y Huecker 2025)
2024	“Comparative analysis of continuous probability distributions for modeling maximum flood levels” (Shobanke, Olayemi y Olajide 2024)
2020	“Deadly intraslab Mexico earthquake of 19 September 2017 (Mw 7.1): Ground motion and damage pattern in Mexico City” (Singh, Reinoso, Arroyo, Ordaz, Cruz-Atienza, Pérez-Campos, Iglesias y Hjörleifsdóttir 2020)
2021	“Ground motion prediction equation for earthquakes along the Western Himalayan arc” (Singh, Arroyo, Srinivas y Suresh 2021)
2019	“Descriptive analysis and earthquake prediction using boxplot interpretation of soil radon time series data” (Tareen, Nadeem, Kearfott, Abbas, Khawaja y Rafique 2019)
2022	“Regional probability distribution of ground motion parameters using machine learning and Bayesian approaches” (Yaghmaei-Sabegh y Neekmanesh 2022)
2022	“A first-order seismotectonic regionalization of Mexico for seismic hazard and risk estimation” (Zúñiga, Suárez, Figueroa-Soto y Mendoza 2022)

### 2.1. Síntesis de los artículos

Ahora se realiza una descripción del contenido de los artículos seleccionados.

En el artículo de Abebe, Kebede, Kevin y Demissie (2023) se expone que los terremotos son vibraciones de la superficie de la Tierra que pueden causar temblores, incendios, deslizamientos de tierra y fisuras en el terreno que representan una amenaza significativa para la vida humana y la infraestructura. Los autores desarrollan un modelo de aprendizaje profundo para la predicción de magnitudes sísmicas en el Cuerno de África, utilizando datos históricos del catálogo sísmico de la región. El modelo propuesto emplea redes neuronales recurrentes de tipo LSTM (Long Short-Term Memory) para capturar patrones temporales en las secuencias sísmicas. Los resultados muestran que el modelo alcanza una precisión significativa en la predicción de magnitudes, superando a métodos estadísticos tradicionales en la región de estudio.

En el artículo de Al Banna, Taher, Kaiser, Mahmud, Rahman, Hosen y Cho (2020) se presenta una revisión del estado del arte relacionado a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) en la predicción de sismos. Los autores analizan diversos enfoques que incluyen redes neuronales artificiales, máquinas de soporte vectorial, algoritmos genéticos y sistemas difusos. El artículo

identifica que las técnicas de IA han mostrado resultados prometedores en la identificación de patrones precursores de sismos, aunque señala que la predicción sísmica sigue siendo un desafío abierto debido a la complejidad inherente de los procesos tectónicos. Los autores concluyen que la integración de múltiples técnicas de IA con datos geofísicos diversos representa una dirección prometedora para futuras investigaciones.

Para el artículo de Barrientos, Fernandez y Rivero (2007) se realiza el análisis estadístico y geográfico para eventos de tipo sísmico que se han registrado en la costa del Pacífico mexicano en el periodo de 1990 a 2004. El estudio utiliza datos del Servicio Sismológico Nacional para caracterizar la distribución espacial y temporal de la sismicidad en la región. Los autores aplican técnicas de estadística descriptiva y análisis de frecuencias para identificar patrones en la ocurrencia de sismos. Los resultados muestran que la actividad sísmica en la costa del Pacífico mexicano presenta variaciones significativas entre diferentes segmentos de la zona de subducción, con algunas áreas mostrando mayor frecuencia de eventos de magnitud moderada a alta.

En el artículo de Bommier (2023) se realiza un análisis comparativo entre dos metodologías ampliamente utilizadas en el análisis de valores extremos: el enfoque de excedencias sobre umbral (peak-over-threshold, POT) y el método de máximos anuales (block maxima). El autor evalúa ambos enfoques utilizando datos sintéticos y reales, analizando su desempeño en términos de sesgo, varianza y eficiencia en la estimación de cuantiles extremos. Los resultados indican que el método de máximos anuales es preferible cuando se dispone de series temporales largas y los eventos extremos son relativamente frecuentes, mientras que el enfoque POT puede ser más eficiente con muestras pequeñas pero requiere una selección cuidadosa del umbral.

Coles (2001) presenta en su libro “An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values” el marco teórico fundamental de la teoría de valores extremos (Extreme Value Theory, EVT). El autor desarrolla de manera rigurosa los fundamentos matemáticos de las distribuciones de valores extremos, incluyendo la distribución generalizada de valores extremos (GEV), la distribución de Gumbel, la distribución de Weibull y la distribución de Fréchet. El libro presenta métodos de estimación de parámetros, construcción de intervalos de confianza y cálculo de niveles de retorno. Esta obra constituye una referencia fundamental para el análisis probabilístico de eventos extremos en diversas disciplinas, incluyendo la sismología, hidrología y ciencias atmosféricas.

Coles, Bawa, Trenner y Dorazio (2021) publican una revisión actualizada del estado del arte en teoría de valores extremos, veinte años después del libro seminal de Coles (2001). Los autores examinan los avances metodológicos más significativos en el campo, incluyendo nuevos métodos de estimación, técnicas para datos no estacionarios y enfoques bayesianos. El artículo discute las aplicaciones emergentes de la teoría de valores extremos en áreas como el cambio climático, riesgo financiero y peligrosidad sísmica. Los autores identifican desafíos abiertos y direcciones futuras de investigación, destacando la necesidad de desarrollar métodos que permitan modelar la dependencia espacial y temporal en eventos extremos.

En otro trabajo, Convertito, Catalli y Emolo (2020) desarrollan un modelo integrado que combina la transferencia de esfuerzos tectónicos con el análisis de agrupamiento espacial de sismos para mejorar el pronóstico de la sismicidad. El modelo propuesto permite estimar cambios en la tasa de sismicidad considerando tanto los efectos de la transferencia de esfuerzos producida por sismos principales como los patrones de agrupamiento espacial observados en las réplicas. Los autores aplican el modelo a secuencias sísmicas en Italia, demostrando que la integración de ambos enfoques mejora significativamente la capacidad predictiva respecto a modelos que

consideran cada factor por separado.

Convertito, Ebrahimian, Amoroso, Jalayer, De Matteis y Capuano (2021) presentan una técnica innovadora para evaluar el riesgo de sismos inducidos por proyectos de actividad geotérmica. La técnica modifica el enfoque tradicional de análisis probabilístico de peligrosidad sísmica (PSHA) para incorporar la variabilidad temporal de la sismicidad inducida. Los autores aplican la metodología al campo geotérmico de St. Gallen en Suiza, donde la inyección de fluidos ha generado actividad sísmica. Los resultados demuestran que el enfoque dependiente del tiempo proporciona estimaciones más realistas del peligro sísmico durante las diferentes fases de operación del proyecto geotérmico.

Cornell (1968) presenta el artículo fundacional del análisis probabilístico de peligrosidad sísmica (Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA). El autor desarrolla el marco metodológico para cuantificar la probabilidad de que se excedan diferentes niveles de intensidad sísmica en un sitio determinado durante un periodo de tiempo específico. El artículo introduce el concepto de periodo de retorno y establece las bases matemáticas para calcular probabilidades de excedencia asumiendo independencia temporal entre eventos sísmicos. Esta metodología se ha convertido en el estándar internacional para la evaluación de peligrosidad sísmica y es ampliamente utilizada en el diseño de infraestructura crítica, normativas de construcción y políticas de gestión del riesgo sísmico.

Ferrás (2005) desarrolla un análisis probabilista para estimar la ocurrencia del próximo gran terremoto en el segmento Acapulco-San Marcos, México. Estudia los intervalos de tiempos intereventos sísmicos y encuentra que la distribución lognormal describe adecuadamente la recurrencia de terremotos grandes en esta región. El autor utiliza datos históricos de sismos significativos ocurridos en el segmento desde el siglo XIX para calibrar el modelo probabilístico. Los resultados proporcionan estimaciones de la probabilidad condicional de ocurrencia de un sismo mayor en diferentes horizontes temporales, información útil para la planificación de medidas de prevención y mitigación del riesgo sísmico.

Para el artículo de Velasco Herrera, Rossello, Orgeira, Arioni, Soon, Velasco y Vera (2022) se señala la importancia de pronosticar terremotos fuertes a largo plazo como una herramienta fundamental para minimizar los riesgos y las vulnerabilidades de las comunidades afectadas por la actividad sísmica. Los autores desarrollan un modelo de aprendizaje automático que utiliza datos históricos de sismos para identificar patrones de recurrencia en diferentes regiones del mundo, incluyendo América del Norte, América del Sur, Japón, el sur de China y el norte de la India. El modelo propuesto logra identificar ciclos de actividad sísmica que permiten estimar ventanas temporales con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos significativos.

Jena, Pradhan, Naik y Alamri (2021) desarrollan un modelo integrado para la evaluación del riesgo sísmico en el noroeste de la India, combinando técnicas de aprendizaje profundo y análisis geoespacial. El estudio utiliza datos sísmicos históricos, información geológica y parámetros geomorfológicos para construir mapas de susceptibilidad sísmica. Los autores aplican redes neuronales convolucionales para identificar patrones espaciales asociados con la ocurrencia de sismos. Los resultados muestran que el modelo híbrido propuesto supera en precisión a los métodos tradicionales de evaluación del riesgo sísmico en la región de estudio.

Johnson, Kotz y Balakrishnan (1995) presentan en su libro “Continuous Univariate Distributions” una referencia exhaustiva sobre distribuciones de probabilidad continuas. Los autores desarrollan de manera rigurosa las propiedades matemáticas, métodos de estimación de

parámetros y aplicaciones de una amplia variedad de distribuciones, incluyendo la distribución normal, lognormal, Weibull, Gumbel, logística y la distribución generalizada de valores extremos. El libro proporciona fórmulas para el cálculo de cuantiles, momentos y funciones generadoras de momentos. Esta obra constituye una referencia fundamental para la selección y aplicación de distribuciones de probabilidad en el análisis de datos, incluyendo el modelado de valores extremos como magnitudes sísmicas máximas.

En el artículo de Matsumoto, Yaoyama, Lee, Hida y Itoi (2023) se propone un modelo probabilista para la predicción del movimiento del suelo por terremotos llamado modelo de generación de movimiento del suelo. El estudio utiliza redes generativas adversarias (GANs) para generar historias temporales sintéticas del movimiento del suelo que preservan las características estadísticas de los registros sísmicos reales. Los autores entrenan el modelo con datos de acelerogramas registrados en Japón, demostrando que las señales generadas reproducen adecuadamente el contenido frecuencial y la duración de los movimientos sísmicos observados.

Mignan, Danciu y Giardini (2021) desarrollan un marco metodológico integral para el pronóstico probabilístico de rupturas sísmicas aplicado específicamente a la evaluación de peligrosidad sísmica en instalaciones nucleares. Los autores revisan las mejores prácticas en modelado de fuentes sísmicas, incluyendo la caracterización de fallas activas y el cálculo de tasas de ocurrencia. El artículo discute los desafíos asociados con la integración de modelos físicos de ruptura con el análisis probabilístico tradicional, proponiendo enfoques híbridos que combinan información geológica, geodésica y sismológica para mejorar las estimaciones de peligrosidad.

Phung, Loh, Chao, Chiou y Huang (2020) desarrollan una ecuación de predicción del movimiento del suelo (GMPE) específica para sismos corticales en el territorio de Taiwán. El modelo propuesto utiliza un amplio conjunto de registros sísmicos para calibrar los coeficientes de la ecuación, considerando efectos de la magnitud, distancia, tipo de falla y condiciones locales del suelo. Los autores validan el modelo comparando las predicciones con observaciones independientes, demostrando que la GMPE específica para Taiwán proporciona estimaciones más precisas que las ecuaciones genéricas desarrolladas para otras regiones.

Ramírez-Gaytán, Aguirre-González y Núñez-Cornú (2021) realizan un análisis probabilístico exhaustivo de la brecha sísmica de Michoacán utilizando datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) que abarcan desde 1900 hasta la actualidad. Los autores analizan los parámetros de fuente de los sismos ocurridos en la región, identificando patrones de recurrencia y estimando el potencial sísmico de la brecha. El estudio proporciona información relevante para la evaluación de la peligrosidad sísmica en una de las regiones con mayor riesgo de México, donde se espera la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en las próximas décadas.

En el artículo de Richter (1935) se introduce la escala de magnitud Richter para los terremotos, la cual se propone como herramienta para medir la magnitud de los sismos. Esta escala logarítmica permite cuantificar la energía liberada por un terremoto a partir de la amplitud máxima registrada en un sismógrafo estándar. El autor establece las bases para la comparación objetiva entre sismos ocurridos en diferentes lugares y tiempos, contribuyendo significativamente al desarrollo de la sismología cuantitativa moderna.

En el artículo de Galbán-Rodríguez (2021) se realiza un análisis teórico y metodológico sobre la predicción de terremotos, partiendo de su marco conceptual que contextualiza el fenómeno sísmico dentro de las ciencias de la Tierra. El autor revisa las diferentes aproximaciones a la predicción sísmica, desde los métodos empíricos basados en precursores hasta los modelos

estadísticos y físicos. El artículo discute las limitaciones inherentes a la predicción sísmica y propone criterios para evaluar la validez de los pronósticos, contribuyendo a establecer un marco metodológico riguroso para la investigación en este campo.

Sánchez-Silva y Riaño (2020) implementan un modelo de renovación para la actualización en tiempo real del riesgo sísmico en sistemas de infraestructura interdependiente, con aplicaciones a datos sísmicos de la costa del Pacífico mexicano. Los autores desarrollan un enfoque basado en redes bayesianas que permite incorporar nueva información sísmica conforme se registran eventos, actualizando dinámicamente las estimaciones de riesgo. El modelo considera las interdependencias entre diferentes componentes de infraestructura, proporcionando una herramienta para la gestión del riesgo en sistemas complejos.

Para el artículo de Sawires, Peláez y Santoyo (2023) se lleva a cabo una evaluación probabilista actualizada del peligro sísmico en el occidente de México. El estudio utiliza un catálogo sísmico actualizado y modelos de fuentes sísmicas mejorados para calcular curvas de peligrosidad y mapas de aceleración esperada para diferentes periodos de retorno. Los autores comparan sus resultados con estudios previos, identificando diferencias significativas en algunas regiones que se atribuyen a la incorporación de nuevas fuentes sísmicas y a la utilización de ecuaciones de predicción del movimiento del suelo más recientes.

Serinaldi y Kilsby (2021) desarrollan una metodología para el cálculo de probabilidades de excedencia que considera explícitamente la autocorrelación temporal en series de valores extremos. Los autores demuestran que ignorar la persistencia temporal puede conducir a subestimaciones significativas del riesgo colectivo de eventos extremos. El artículo proporciona herramientas para cuantificar el efecto de la autocorrelación en las estimaciones de periodo de retorno y probabilidad de excedencia, con aplicaciones a datos hidrológicos que pueden extenderse al análisis de secuencias sísmicas.

En el artículo de Shreffler y Huecker (2025) se presenta una revisión de los principios estadísticos esenciales para la investigación clínica, incluyendo pruebas de hipótesis, valores  $p$ , intervalos de confianza y significancia estadística. Aunque el enfoque del artículo es clínico, los conceptos presentados son fundamentales para cualquier análisis estadístico riguroso, incluyendo el análisis de datos sísmicos. Los autores discuten la interpretación correcta de los resultados estadísticos y las limitaciones de las pruebas de hipótesis tradicionales.

Para el artículo de Shobanke, Olayemi y Olajide (2024) se realiza un análisis comparativo del desempeño de varias distribuciones de probabilidad continuas en el modelado de niveles máximos de inundación. Los autores evalúan distribuciones como la normal, lognormal, Gumbel, Weibull y la distribución generalizada de valores extremos utilizando datos hidrológicos. El estudio emplea criterios de selección de modelos como el AIC, BIC y pruebas de bondad de ajuste para identificar la distribución óptima. Aunque el contexto es hidrológico, la metodología es directamente aplicable al análisis de magnitudes sísmicas máximas.

Singh, Reinoso, Arroyo, Ordaz, Cruz-Atienza, Pérez-Campos, Iglesias y Hjörleifsdóttir (2020) realizan un análisis retrospectivo del sismo intraplaca de Puebla del 19 de septiembre de 2017 (Mw 7.1), comparando la magnitud observada y el patrón de daños en la Ciudad de México con sismos históricos similares. Los autores analizan los registros de movimiento fuerte para caracterizar las particularidades de este evento, que causó daños significativos a pesar de su distancia al epicentro. El estudio proporciona información valiosa sobre la vulnerabilidad sísmica de la Ciudad de México y la importancia de considerar sismos intraplaca en la evaluación del peligro sísmico.

En el artículo de Singh, Arroyo, Srinivas y Suresh (2021) se desarrolla la ecuación de predicción del movimiento del suelo (GMPE), aplicada a los sismos ocurridos a lo largo del Arco del Himalaya occidental. Los autores utilizan datos de acelerogramas registrados en la región para calibrar los coeficientes del modelo, considerando las características tectónicas particulares de la zona de colisión continental. El estudio proporciona una herramienta para la evaluación de la peligrosidad sísmica en una de las regiones más activas del mundo.

Tareen, Nadeem, Kearfott, Abbas, Khawaja y Rafique (2019) presenta un análisis estadístico descriptivo de series temporales de radón en el suelo, recopiladas durante un año en la zona de Muzaffarabad, la cual es atravesada por la falla de Jhelum que registró el sismo de Cachemira del 8 de octubre de 2005 (Mw 7.6). Los autores aplican técnicas de estadística descriptiva y análisis de boxplot para identificar anomalías en las concentraciones de radón que podrían estar asociadas con actividad sísmica. El estudio explora el potencial del monitoreo de radón como herramienta complementaria para la identificación de precursores sísmicos.

Yaghmaei-Sabegh y Neekmanesh (2022) realizan un análisis regional exhaustivo de parámetros de movimiento del suelo en Irán utilizando más de 100 años de registros sísmicos del catálogo nacional. Los autores aplican técnicas de aprendizaje automático y métodos bayesianos para desarrollar modelos de predicción del movimiento del suelo específicos para diferentes regiones tectónicas del país. El estudio demuestra que los modelos regionales proporcionan estimaciones más precisas que las ecuaciones globales, destacando la importancia de considerar las características tectónicas locales.

Zúñiga, Suárez, Figueroa-Soto y Mendoza (2022) proponen una regionalización sismotectónica de primer orden para México basada en el análisis estadístico exhaustivo del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Los autores identifican regiones con características sísmicas homogéneas utilizando técnicas de agrupamiento espacial y análisis de la distribución de magnitudes. El estudio proporciona un marco de referencia para la evaluación de la peligrosidad sísmica en México, identificando las regiones con mayor potencial de generación de sismos significativos.



## Estado del arte

Es utilizada principalmente la bibliografía encontrada en el capítulo anterior referente a la predicción probabilista sísmica utilizando el método de distribución logaritmo normal y gama, distribución de valores extremos, así como el estado del arte de los métodos desarrollados basados en inteligencia artificial, aprendizaje de máquina (machine learning) y redes neuronales.

Todo esto es aplicado a la solución del problema desde un enfoque que utiliza las técnicas conocidas y los datos estadísticos específicos para el problema a resolver.

### 3.1. Revisión del estado del arte

En esta sección se presenta una revisión del estado del arte de los trabajos más relevantes para este proyecto, con el propósito de enriquecer la metodología propuesta.

Los terremotos son vibraciones de la corteza terrestre (Abebe, Kebede, Kevin y Demissie 2023), las cuales pueden provocar temblores, incendios, deslizamientos de tierra y fracturas en el terreno que representan una amenaza significativa para la vida humana y la infraestructura. La predicción y evaluación del peligro sísmico constituye un área de investigación activa que ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.

Dentro de las distintas formas de realizar inferencia y predicción sísmica se han desarrollado técnicas basadas en IA (Al Banna, Taher, Kaiser, Mahmud, Rahman, Hosen y Cho 2020) para identificar patrones ocultos en los datos sísmicos que podrían preceder a eventos significativos. Estas técnicas incluyen redes neuronales artificiales, máquinas de soporte vectorial y algoritmos de aprendizaje profundo que han mostrado resultados prometedores en diversas regiones del mundo.

Estas técnicas generalmente se cimentan en análisis matemáticos, probabilistas y estadísticos (Convertito, Ebrahimian, Amoroso, Jalayer, De Matteis y Capuano 2021, Matsumoto, Yaoyama, Lee, Hida y Itoi 2023, Sawires, Peláez y Santoyo 2023, Velasco Herrera, Rossello, Orgeira, Arioni, Soon, Velasco y Vera 2022) para estimar la probabilidad de ocurrencia de sismos en una zona determinada. El enfoque probabilístico permite cuantificar la incertidumbre inherente a los procesos sísmicos y proporciona herramientas para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo.

El análisis de valores extremos se sustenta principalmente en dos enfoques metodológicos: el método de máximos anuales y el de excedencias sobre umbral (peak-over-threshold). Bommier

(2023) realiza un análisis comparativo exhaustivo entre ambos enfoques, concluyendo que el método de máximos anuales es preferible cuando se dispone de series temporales largas, como es el caso de los catálogos sísmicos históricos. Este enfoque constituye la base metodológica del presente trabajo.

El marco teórico fundamental para el análisis probabilístico de peligrosidad sísmica fue establecido por Cornell (1968) en su artículo seminal sobre análisis de riesgo sísmico en ingeniería. Este trabajo introduce el concepto de periodo de retorno y establece las bases matemáticas para calcular probabilidades de excedencia, metodología que se ha convertido en el estándar internacional para la evaluación de peligrosidad sísmica y que es aplicada en el presente proyecto.

Con respecto a estos cálculos matemáticos y estadísticos, se utilizan técnicas como los modelos lineales de tipo log-lineal (Barrientos, Fernandez y Rivero 2007), log-normales (Ferrás 2005) y distribuciones de valores extremos (Coles 2001, Shobanke, Olayemi y Olajide 2024) para caracterizar la distribución de magnitudes sísmicas. La selección de la distribución apropiada para cada región es fundamental para obtener estimaciones confiables de peligrosidad.

Johnson, Kotz y Balakrishnan (1995) proporcionan una referencia exhaustiva sobre distribuciones de probabilidad continuas, incluyendo las distribuciones normal, logística, Weibull y Gumbel que son empleadas en este trabajo para modelar las magnitudes máximas anuales en las diferentes regiones de estudio. La correcta caracterización de estas distribuciones permite calcular niveles de retorno y probabilidades de excedencia con rigor matemático.

El cálculo de períodos de retorno y probabilidades de excedencia constituye un componente esencial de la evaluación probabilística de peligrosidad sísmica. Mignan, Danciu y Giardini (2021) desarrollan un marco metodológico para el pronóstico probabilístico de rupturas sísmicas, estableciendo las mejores prácticas para la integración de modelos físicos con el análisis estadístico. Estos conceptos son aplicados en la Fase 10 de la metodología del presente trabajo para estimar cuándo podría ocurrir un sismo de magnitud significativa.

El análisis temporal de la actividad sísmica y el concepto de brecha sísmica han ganado relevancia en años recientes como complemento a los modelos puramente probabilísticos. Sánchez-Silva y Riaño (2020) implementan modelos de renovación para la actualización en tiempo real del riesgo sísmico, mientras que Ramírez-Gaytán, Aguirre-González y Núñez-Cornú (2021) analizan específicamente la brecha sísmica de Michoacán, una de las regiones consideradas en el presente estudio.

La construcción de índices compuestos de peligrosidad sísmica que integren múltiples factores de riesgo representa una tendencia metodológica reciente. Convertito, Catalli y Emolo (2020) desarrollan un modelo que combina la transferencia de esfuerzos tectónicos con el análisis de agrupamiento espacial de sismos, proporcionando un enfoque más completo para el pronóstico de la sismicidad.

Cabe destacar también el análisis hecho con series temporales de gas radón (Tareen, Nadeem, Kearfott, Abbas, Khawaja y Rafique 2019) que más allá de solo buscar patrones en magnitudes, epicentros, fechas y profundidades, busca precursores de sismos mediante análisis estadístico descriptivo de variables geoquímicas. Este tipo de estudios complementan los enfoques basados exclusivamente en datos sismológicos.

Los artículos revisados abarcan distintas áreas geográficas del planeta, como la costa occidental de México (Barrientos, Fernandez y Rivero 2007, Sawires, Peláez y Santoyo 2023,

Zúñiga, Suárez, Figueroa-Soto y Mendoza 2022), el Cuerno de África (Abebe, Kebede, Kevin y Demissie 2023), Taiwán (Phung, Loh, Chao, Chiou y Huang 2020), el Himalaya occidental (Singh, Arroyo, Srinivas y Suresh 2021), Irán (Yaghmaei-Sabegh y Neekmanesh 2022), la India (Jena, Pradhan, Naik y Alamri 2021), Japón (Matsumoto, Yaoyama, Lee, Hida y Itoi 2023) y Suiza (Convertito, Ebrahimian, Amoroso, Jalayer, De Matteis y Capuano 2021). Esta diversidad geográfica permite identificar metodologías aplicables a diferentes contextos tectónicos.

También podemos encontrar trabajos con un enfoque conceptual y metodológico que revisan teorías de predicción sísmica y su evolución a lo largo del tiempo (Galbán-Rodríguez 2021). Estos trabajos proporcionan el marco conceptual necesario para entender las limitaciones inherentes a la predicción sísmica y los criterios para evaluar la validez de los pronósticos.

En el contexto mexicano específico, varios estudios recientes han aplicado metodologías de valores extremos y análisis de brechas sísmicas a diferentes regiones del país. Ramírez-Gaytán, Aguirre-González y Núñez-Cornú (2021) analizan la brecha sísmica de Michoacán, mientras que Sawires, Peláez y Santoyo (2023) desarrollan una evaluación probabilista actualizada del peligro sísmico en el occidente de México. El sismo de Puebla de 2017 analizado por Singh, Reinoso, Arroyo, Ordaz, Cruz-Atienza, Pérez-Campos, Iglesias y Hjörleifsdóttir (2020) evidencia la importancia de considerar diferentes tipos de fuentes sísmicas en la evaluación del peligro.

Desde una perspectiva estadística, Shreffler y Huecker (2025) proporcionan una revisión actualizada de los principios de pruebas de hipótesis, valores  $p$  e intervalos de confianza que son aplicados en las Fases 6 y 8 de la metodología del presente trabajo. Serinaldi y Kilsby (2021) abordan el problema de la persistencia temporal en series de valores extremos, un aspecto relevante para el análisis de secuencias sísmicas.

La escala de magnitud introducida por Richter (1935) constituye la base para la cuantificación de la energía liberada por los sismos y permite la comparación objetiva entre eventos ocurridos en diferentes lugares y tiempos. Esta escala, junto con sus evoluciones posteriores, es utilizada en el presente trabajo para caracterizar la actividad sísmica en las regiones de estudio.

## 3.2. Análisis del estado del arte

La revisión del estado del arte muestra que la predicción y evaluación del peligro sísmico se ha abordado desde múltiples perspectivas: modelos probabilistas clásicos, distribuciones estadísticas de valores extremos, técnicas de inteligencia artificial y enfoques híbridos que combinan información física y estadística. El presente trabajo se enmarca dentro del enfoque probabilístico clásico, utilizando la teoría de valores extremos y las distribuciones estadísticas como herramientas fundamentales.

El marco metodológico establecido por Cornell (1968) para el cálculo de periodos de retorno y probabilidades de excedencia constituye la base conceptual de la Fase 10 del presente trabajo. Este enfoque, complementado con los desarrollos teóricos de Coles (2001) sobre modelado estadístico de valores extremos, permite obtener estimaciones cuantitativas del peligro sísmico con fundamento matemático riguroso.

La selección de distribuciones de probabilidad para modelar magnitudes máximas anuales, documentada exhaustivamente por Johnson, Kotz y Balakrishnan (1995), es un aspecto crítico de la metodología. El análisis comparativo de Shobanke, Olayemi y Olajide (2024) proporciona

criterios objetivos para la selección de la distribución óptima en cada región, enfoque que es aplicado en la Fase 9 mediante pruebas de bondad de ajuste.

Desde una perspectiva metodológica, se identifica un consenso creciente sobre las mejores prácticas para el análisis probabilístico de peligrosidad sísmica: (1) empleo de magnitudes máximas anuales para aplicar la teoría de valores extremos, (2) selección de distribuciones mediante criterios estadísticos objetivos como el BIC y pruebas de bondad de ajuste, (3) estimación de parámetros por máxima verosimilitud, y (4) cálculo de niveles de retorno y probabilidades de excedencia para diferentes horizontes temporales. Estas prácticas son incorporadas en la metodología del presente proyecto.


# Capítulo 4

## Metodología

### 4.1. Metodología de investigación

En este capítulo se presenta la metodología propuesta para realizar el análisis y las evaluaciones de la actividad sísmica en estados de la costa del Pacífico mexicano (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca), en el resto del país (actividad sísmica en México sin considerar los 4 estados mencionados) y de todos los sismos nacionales (actividad sísmica de los 32 estados de México), con el fin de lograr la estimación probabilista de ocurrencia de sismos.

La Figura 1 muestra el diagrama de flujo de la metodología implementada para el presente proyecto.



**Figura 1:** Diagrama de flujo de la aplicación de la metodología propuesta.

### 4.2. Fases de desarrollo del proyecto

Para implementar la metodología propuesta en este capítulo, se dividieron los trabajos de este proyecto en 10 fases, las cuales son presentadas a continuación.

**Fase 1 - Recopilación de datos sísmicos históricos.** Se recopilan los datos históricos de los sismos registrados en la República Mexicana en el periodo 1900 – 2025, desde el portal web del Servicio Sismológico Nacional (México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. d. G., Servicio Sismológico Nacional 2025). Este catálogo proporciona información detallada de cada evento sísmico, las cuales son: fecha, hora, magnitud (en grados Richter), latitud, longitud, profundidad, referencia de localización, fecha (UTC), hora (UTC) y estatus (revisado/no revisado).

**Fase 2 - Filtrado y preparación de los datos.** En esta fase se aplican los siguientes criterios de filtrado y limpieza a los datos sísmicos:

- **Filtrado por magnitud.** Se eliminan sismos con magnitud menor a  $5.0^\circ$ , esto para que el análisis se enfoque en eventos de magnitud moderada a fuerte, que suelen ser sismos perceptibles para la mayoría de la población y que pueden significar un peligro para las personas, la infraestructura y las construcciones.
- **Selección de parámetros.** Se conservan únicamente las variables relevantes para el proyecto que son fecha, hora, magnitud y referencia de localización. Se eliminan las variables que no son relevantes para este proyecto.
- **Limpieza de los datos.** Se eliminan registros con valores vacíos, nulos o no disponibles para garantizar la consistencia e integridad de los datos.
- **División por región.** Se generan archivos individuales con la actividad sísmica para cada una de las 6 regiones estudiadas en este proyecto: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, resto nacionales y sismos nacionales.

**Fase 3 - Generación de conjunto de datos.** Se generan dos grupos de datasets (cada grupo con datasets individuales para cada región):

- **Sismos Totales.** Información de todos los sismos registrados con magnitud  $\geq 5^\circ$ , para cada una de las regiones de estudio, que permita analizar la frecuencia y distribución de los eventos sísmicos ocurridos en cada región.
- **Magnitudes Máximas Anuales.** Información del sismo de mayor magnitud registrado cada año (y de magnitud mínima de  $5^\circ$ ), para cada una de las regiones, que permita aplicar la teoría de valores extremos a este dataset.

**Fase 4 - Cálculo de estadísticos descriptivos.** Se calculan estadísticos descriptivos de los sismos para cada región y para cada grupo (sismos totales y magnitudes máximas anuales). A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos calculados:

### 4.2.1. Media aritmética

La media aritmética  $\bar{x}$  representa el valor promedio de la magnitud de los sismos analizados y se calcula como (Climent Hernández 2022):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad (4.1)$$

donde  $\bar{x}$  es la media aritmética,  $n$  el tamaño de la muestra (número total de sismos) y  $x_k$  es la magnitud del  $k$ -ésimo sismo. Conocer el valor de la media sirve para indicar la magnitud promedio que hubo de los sismos para alguna de las regiones durante el periodo de estudio.

### 4.2.2. Mediana

La mediana  $\tilde{x}$  es el valor central de los datos ordenados (de menor a mayor) y cuyo valor es menos sensible ante valores extremos (sismos muy fuertes) que el de la media aritmética, se calcula como (Climent Hernández 2022):

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{1}{2} \left( x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)} \right) & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \quad (4.2)$$

donde  $\tilde{x}$  es la mediana,  $n$  es el tamaño de la muestra (número total de sismos) y  $x_{(\cdot)}$  es el valor ordenado de manera ascendente de la magnitud de los sismos. Obtener la mediana nos permite conocer el valor que divide a la distribución de los datos sísmicos en dos partes iguales.

### 4.2.3. Moda

La moda  $\hat{x}$  es el valor de magnitud sísmica que aparece más veces dentro del conjunto de datos sísmicos y se encuentra como (Climent Hernández 2022):

$$\hat{x} = \{x_k \in X \mid f_k = \max_{x_j \in X} (f_j)\} \quad (4.3)$$

donde  $\hat{x}$  es la moda,  $f_k$  es la frecuencia de ocurrencia del valor sísmico  $x_k$  y  $X$  se refiere al conjunto de datos con todas las magnitudes sísmicas. Conocer este valor permite saber cuál es la magnitud sísmica que se repite más veces en cada región de estudio.

### 4.2.4. Varianza muestral

La varianza muestral  $s_x^2$  cuantifica la dispersión de los datos sísmicos respecto al valor de la media aritmética y se encuentra como (Climent Hernández 2022):

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \quad (4.4)$$

donde  $s_x^2$  es la varianza,  $n$  es el tamaño de la muestra (número total de sismos),  $x_k$  es el valor de la magnitud del  $k$ -ésimo sismo y  $\bar{x}$  es la media aritmética. Conocer este valor permite saber si en

una región hay gran variación en el valor de magnitud de los sismos registrados (valor alto de varianza) o si en cambio, hay poca variación en la magnitud de los sismos registrados en la región (valor bajo de varianza).

### 4.2.5. Desviación estándar

La desviación estándar  $s_x$  se encuentra al aplicar raíz cuadrada al valor de la varianza, tal y como sigue (Climent Hernández 2022):

$$s_x = \sqrt{s_x^2} \quad (4.5)$$

donde  $s_x$  es la desviación estándar y  $s_x^2$  la varianza. Dado que las unidades de la varianza son cuadráticas, no se pueden comparar directamente con los valores de las muestras de las magnitudes sísmicas, mientras que la desviación estándar facilita los análisis de relación de la dispersión con los valores de los datos sísmicos.

### 4.2.6. Coeficiente de asimetría

El coeficiente de asimetría  $g_1$  mide el grado de simetría de la distribución de los datos sísmicos respecto a la media de estos, se calcula como (Fisher 1922):

$$g_1 = \frac{1}{ns_x^3} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^3 \quad (4.6)$$

donde  $g_1$  es el coeficiente de asimetría,  $n$  es el tamaño de la muestra (número total de sismos),  $s_x$  es la desviación estándar,  $x_k$  es la magnitud del  $k$ -ésimo sismo y  $\bar{x}$  la media. Los posibles resultados de  $g_1$  mostrarían que si es igual a 0 ( $g_1 = 0$ ) la distribución de los datos sísmicos es simétrica (sin sesgo), si es mayor a 0 ( $g_1 > 0$ ) que presenta asimetría positiva o sesgo a la derecha (cola derecha más larga, que indica que hay más sismos de baja magnitud con eventos ocasionales fuertes) y si es menor a 0 ( $g_1 < 0$ ) que presenta asimetría negativa o sesgo a la izquierda (cola izquierda más larga, que indica concentración de sismos hacia las magnitudes altas).

### 4.2.7. Coeficiente de curtosis

El coeficiente de curtosis  $g_2$  mide el grado de apuntamiento (qué tan plana o picuda) o curtosis de la distribución de los datos sísmicos respecto de una distribución normal (gaussiana) y se calcula como (Fisher 1922):

$$g_2 = \frac{1}{ns_x^4} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^4 \quad (4.7)$$

donde  $g_2$  es el coeficiente de curtosis,  $n$  es el tamaño de la muestra (número total de sismos),  $x_k$  es la magnitud del  $k$ -ésimo sismo y  $\bar{x}$  la media. Los posibles resultados de  $g_2$  muestran que si es igual a 0 ( $g_2 = 0$ ) la distribución de los datos sísmicos es mesocúrtica (similar a la normal), si es mayor a 0 ( $g_2 > 0$ ) que presenta distribución leptocúrtica o más picuda que la normal (que indica que hay una mayor concentración de magnitudes sísmicas cercanas a la media con colas más pesadas) y

si es menor a 0 ( $g_2 < 0$ ) que presenta distribución platicúrtica o más aplanada que la normal (que indica que los valores de magnitudes sísmicas están dispersos de una manera uniforme).

**Fase 5 - Representación gráfica del comportamiento sísmico.** Se generan gráficos del comportamiento histórico de los sismos en las regiones analizadas para los dos datasets (sismos totales y magnitudes máximas anuales) en el periodo de 1900 a julio de 2025. Las visualizaciones incluyen:

- **Histogramas de densidad de los sismos.** Gráficos que muestran la distribución de las magnitudes sísmicas, permitiendo identificar la forma de la distribución de los datos de magnitudes sísmicas.
- **Histogramas de frecuencias relativas por mes.** Sirven para identificar patrones de estacionalidad en la ocurrencia de sismos.
- **Histogramas de sismos por magnitud.** Permiten cuantificar el número de eventos en cada rango de magnitud.
- **Gráfico de magnitud máxima, promedio y mínima.** Estos gráficos permiten ver la evolución temporal de las magnitudes mínima, promedio y máxima a lo largo del tiempo, permitiendo identificar tendencias y cambios en el comportamiento sísmico.

**Fase 6 - Estimación de intervalos de confianza.** Se estiman los intervalos de confianza para la media ( $\mu$ ), varianza ( $\sigma^2$ ) y proporción ( $\pi$ ), con un nivel de confianza al 95 %. Estos intervalos de confianza permiten obtener rangos dentro de los cuales se espera que estén los valores poblacionales con un 95 % de probabilidad (Climent Hernández 2022). Los intervalos estimados son:

#### 4.2.8. Intervalo de confianza para la media

Cuando la varianza poblacional es desconocida y se estima a partir de la muestra, se utiliza la distribución t de Student (Student 1908):

$$IC(\mu) = \mu \in \left( \bar{x} - \frac{s_x t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{s_x t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n}} \right) \quad (4.8)$$

donde  $\mu$  es la media,  $\bar{x}$  es la media muestral,  $s_x$  es la desviación estándar,  $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$  es el valor crítico de la distribución t con  $n-1$  grados de libertad,  $\alpha = 0.05$  para un nivel de confianza del 95 % y  $n$  el tamaño de la muestra. Obtener este intervalo de confianza permite estimar con un 95 % de nivel de confianza el rango en el que se encuentra la magnitud promedio verdadera de los sismos para cada región.

#### 4.2.9. Intervalo de confianza para la varianza

Se utiliza la distribución chi-cuadrada ( $\chi^2$ ) para estimar el intervalo de confianza de la varianza poblacional (Climent Hernández 2022):

$$IC(\sigma^2) = \sigma^2 \in \left( \frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) \quad (4.9)$$

donde  $\sigma^2$  es la varianza,  $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2$  y  $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2$  son los valores críticos de la distribución chi-cuadrado con  $n-1$  grados de libertad para los percentiles  $1-\frac{\alpha}{2}$  y  $\frac{\alpha}{2}$ , respectivamente. Este intervalo permite cuantificar la incertidumbre en la estimación de la variabilidad de las magnitudes sísmicas en cada región de estudio.

#### 4.2.10. Intervalo de confianza para la proporción

Se utiliza la aproximación normal para estimar el intervalo de confianza de una proporción poblacional:

$$IC(\pi) = \pi \in \left( p - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) \quad (4.10)$$

donde  $\pi$  es la proporción,  $p$  es la proporción muestral,  $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$  es el valor crítico de la distribución estándar. Este intervalo es útil para estimar la proporción de sismos que exceden un umbral crítico de magnitud definida en  $6.5^\circ$ , la cual permite realizar evaluaciones más certeras del riesgo sísmico.

**Fase 7 - Estimación del tamaño mínimo de la muestra.** Se determina el tamaño mínimo de la muestra para la media ( $\mu$ ), con un error máximo tolerado  $\varepsilon$  y un nivel de confianza del 95 %:

$$n \geq \left\lceil \left( \frac{s_X t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\varepsilon} \right)^2 \right\rceil \quad (4.11)$$

donde  $n$  es el tamaño de la muestra (número total de sismos),  $s_X$  es la desviación estándar,  $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$  es el valor crítico de la distribución  $t$  de Student,  $\varepsilon$  es el error máximo tolerado,  $\lceil \cdot \rceil$  indica que es una función techo (se redondea hacia arriba al entero más cercano). Este cálculo permite determinar si el tamaño de muestra es suficiente para alcanzar una precisión deseada en la estimación de los parámetros.

**Fase 8 - Prueba de hipótesis.** Se aplican pruebas de hipótesis para comparar estadísticamente las características sísmicas entre las diferentes regiones. Estas pruebas permiten tomar decisiones basadas en evidencia estadística sobre si existen diferencias significativas entre poblaciones (Shreffler y Huecker 2025).

En todas las pruebas se utiliza un nivel de significancia de  $\alpha = 0.05$ , lo que implica una probabilidad del 5 % de rechazar incorrectamente la hipótesis nula (error tipo I).

#### 4.2.11. Prueba de hipótesis para el cociente de varianzas (prueba F)

La prueba de hipótesis para el cociente de varianzas permite determinar si dos poblaciones tienen la misma varianza. Se utiliza antes de realizar pruebas de comparación de medias para decidir si se pueden asumir varianzas iguales.

**Hipótesis:**

$$\begin{aligned} H_0 : \sigma_1^2 &= \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 &\neq \sigma_2^2 \end{aligned}$$

**Estadístico de prueba:**

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad (4.12)$$

donde  $s_1^2$  y  $s_2^2$  son las varianzas muestrales de las dos poblaciones y la distribución F tiene  $n - 1$  grados de libertad. Se rechaza  $H_0$  si  $F > F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$  o si  $F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ , donde estos valores son los percentiles críticos de la distribución F. Este cálculo permite determinar si la variabilidad sísmica difiere entre las distintas regiones de estudio.

#### 4.2.12. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas iguales (pooled)

Cuando la prueba F indica que las varianzas son iguales, se utiliza la prueba t para la diferencia de medias con varianzas iguales (pooled):

**Hipótesis:**

$$\begin{aligned} H_0 : \bar{x}_1 &= \bar{x}_2 \\ H_1 : \bar{x}_1 &\neq \bar{x}_2 \end{aligned}$$

**Estadístico de prueba:**

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\left(\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}\right)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (4.13)$$

donde en el denominador se encuentra la varianza agrupada (pooled), que combina la información de ambas muestras para obtener una mejor estimación de la varianza común. Se rechaza  $H_0$  si  $|t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$ . Este cálculo permite determinar si la magnitud promedio de sismos difiere significativamente entre dos regiones.

#### 4.2.13. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas diferentes (Welch)

Cuando las varianzas son significativamente diferentes, se utiliza la prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas diferentes de Welch:

**Hipótesis:**

$$\begin{aligned} H_0 : \bar{x}_1 &= \bar{x}_2 \\ H_1 : \bar{x}_1 &\neq \bar{x}_2 \end{aligned}$$

**Estadístico de prueba:**

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t(v) \quad (4.14)$$

**Grados de libertad:**

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}} \quad (4.15)$$

donde esta prueba es más robusta que la prueba t estándar cuando las varianzas poblacionales son diferentes.

#### 4.2.14. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones con proporciones agrupadas o iguales (pooled)

Esta prueba se utiliza para comparar la proporción de sismos que exceden un umbral crítico entre dos regiones:

**Hipótesis:**

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$H_1 : p_1 \neq p_2$$

**Estadístico de prueba:**

$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim z \quad (4.16)$$

**Proporción agrupada:**

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} \quad (4.17)$$

siendo  $x_1$  y  $x_2$  el número de éxitos en cada muestra. Se rechaza  $H_0$  si  $|z| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96$  para  $\alpha = 0.05$ .

#### 4.2.15. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones sin agrupamiento o diferentes

Cuando no se asumen proporciones iguales bajo la hipótesis nula, se utiliza:

**Hipótesis:**

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$H_1 : p_1 \neq p_2$$

**Estadístico de prueba:**

$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim z \quad (4.18)$$

donde en esta prueba no se asume que las proporciones son iguales bajo  $H_0$ , lo que la hace más conservadora y apropiada cuando las proporciones muestrales son muy diferentes.

**Fase 9 - Validación estadística del modelo probabilístico.** Implementación de pruebas de bondad de ajuste a distintas distribuciones para determinar qué distribución probabilística se ajusta mejor a los datos de magnitudes sísmicas. También, aplicación de Criterio de Información Bayesiano (BIC) para la selección de modelos.

#### 4.2.16. Prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov

La prueba de Kolmogorov-Smirnov evalúa si una muestra proviene de una distribución teórica específica comparando la función de distribución empírica con la teórica:

**Hipótesis:**

$$H_0 = X \sim F(x; \theta)$$

$$H_1 = X \not\sim F(x; \theta)$$

donde  $F(x; \theta)$  es la distribución teórica propuesta con parámetros  $\theta$ .

**Estadístico de prueba:**

$$D = \max_x |F_n(x) - F(x)| \quad (4.19)$$

donde  $F_n(x)$  es la función de distribución empírica,  $F(x)$  es la función de distribución teórica. El estadístico  $D$  mide la máxima discrepancia vertical entre las funciones de distribución. Se rechaza  $H_0$  si el valor  $p < \alpha$ .

#### 4.2.17. Prueba de bondad de ajuste Anderson-Darling

La prueba de Anderson-Darling es más sensible a discrepancias en las colas de la distribución que la prueba de Kolmogorov-Smirnov:

**Hipótesis:**

$$H_0 = X \sim F(x; \theta)$$

$$H_1 = X \not\sim F(x; \theta)$$

**Estadístico de prueba:**

$$A^2 = -n - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(2i-1) (\ln F(x_i) + \ln(1 - F(x_{n+1-i})))] \quad (4.20)$$

donde los datos  $x_1, x_2, \dots, x_n$  están ordenados de menor a mayor. La ponderación  $(2i-1)$  da mayor peso a las observaciones en las colas, haciendo la prueba más sensible a desviaciones en valores extremos, lo cual es muy importante para el análisis de sismos fuertes. Se rechaza  $H_0$  si  $A^2 > A^2_{\text{crítico}}(\alpha)$ , donde el valor crítico depende de la distribución teórica específica.

#### 4.2.18. Prueba de bondad de ajuste Lilliefors

La prueba de bondad de ajuste de Lilliefors es una modificación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para el caso en que los parámetros de la distribución se estiman a partir de los datos:

**Hipótesis:**

$$\begin{aligned} H_0 &= X \sim F(x; \theta) \\ H_1 &= X \not\sim F(x; \theta) \end{aligned}$$

**Estadístico de prueba:**

$$D = \max_x |F_n(x) - F(x; \hat{\mu}, \hat{\sigma})| \quad (4.21)$$

donde  $\hat{\mu}$  y  $\hat{\sigma}$  son estimadores de los parámetros calculados a partir de la muestra. Cuando los parámetros se estiman de los datos, la distribución del estadístico  $D$  difiere de la distribución de Kolmogorov-Smirnov estándar, requiriendo valores críticos específicos de Lilliefors. Esta prueba es útil para probar normalidad cuando la media y desviación estándar se estiman de los datos (Diana Villasana Ocampo 2024).

#### 4.2.19. Criterio de Información Bayesiano

El Criterio de Información Bayesiano (BIC) permite comparar múltiples modelos y seleccionar el que mejor equilibra bondad de ajuste y parsimonia:

$$\text{BIC} = -2 \cdot \ln(\hat{L}) + k \cdot \ln(n) \quad (4.22)$$

donde  $\hat{L}$  es la verosimilitud máxima del modelo,  $k$  es el número de parámetros del modelo,  $n$  es el tamaño de la muestra. Se prefiere el modelo con menor BIC. BIC penaliza más fuertemente la complejidad del modelo, favoreciendo modelos más simples cuando el tamaño de muestra es grande.

**Fase 10 - Cálculo de probabilidades de ocurrencia de sismos.** En esta fase se realiza la inferencia probabilística que constituye el objetivo principal de este proyecto. Utilizando la distribución óptima identificada para cada región en la Fase 9, se calculan los periodos de retorno, niveles de retorno y probabilidades de excedencia que permiten estimar cuándo podría ocurrir un sismo de magnitud significativa, de qué magnitud se espera y con qué probabilidad.

#### 4.2.20. Selección de la distribución óptima por región

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Lilliefors) y el Criterio de Información Bayesiano, se selecciona para cada región la distribución que presente el menor valor de BIC y que no rechace la hipótesis nula en las pruebas aplicadas. Como establece Coles (2001), la selección del modelo debe basarse en criterios estadísticos objetivos que permitan identificar la distribución que mejor representa el comportamiento de los datos.

La Tabla 2 muestra las distribuciones que mejor se ajustan para cada región de estudio para magnitudes máximas. En el capítulo 5 se muestra cómo se eligieron y por qué no se incluye ninguna distribución para sismos totales.

**Tabla 2:** Distribuciones óptimas por región según pruebas de bondad de ajuste.

Región	Distribución óptima
Oaxaca	Gumbel
Guerrero	Weibull
Michoacán	GEV
Chiapas	Weibull
Resto Nacionales	Logística
Nacionales	Normal

#### 4.2.21. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud

Para la distribución seleccionada en cada región, los parámetros se estiman mediante el método de máxima verosimilitud (Fisher 1922). Este método consiste en encontrar los valores de los parámetros que maximizan la función de verosimilitud:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta) \quad (4.23)$$

donde  $\hat{\theta}$  representa el vector de parámetros estimados,  $n$  es el número de observaciones (magnitudes máximas anuales),  $x_i$  es la magnitud máxima del  $i$ -ésimo año y  $f(x_i; \theta)$  es la función de densidad de la distribución seleccionada evaluada en  $x_i$  con parámetros  $\theta$ .

#### 4.2.22. Cálculo del periodo de retorno

El periodo de retorno  $T$  representa el tiempo promedio esperado entre eventos que exceden una magnitud específica  $x$ . De acuerdo con Cornell (1968), el periodo de retorno se calcula como:

$$T(x) = \frac{1}{1 - F(x; \hat{\theta})} \quad (4.24)$$

donde  $F(x; \hat{\theta})$  es la función de distribución acumulada de la magnitud máxima anual evaluada en  $x$  con los parámetros estimados  $\hat{\theta}$ .

Por ejemplo, si para una región determinada se obtiene que  $F(7.0) = 0.98$ , entonces el periodo de retorno para un sismo de magnitud  $7.0^\circ$  sería  $T = 1/(1 - 0.98) = 50$  años. Esto significa que, en promedio, se espera un sismo de magnitud igual o mayor a  $7.0^\circ$  cada 50 años en esa región.

Es importante aclarar que el periodo de retorno es un valor promedio de largo plazo y no implica que después de un evento el siguiente ocurrirá exactamente  $T$  años después. La ocurrencia de sismos sigue siendo un proceso aleatorio.

#### 4.2.23. Cálculo del nivel de retorno

El nivel de retorno  $x_T$  es la magnitud asociada a un periodo de retorno específico  $T$ . Se obtiene invirtiendo la función de distribución acumulada (Coles 2001):

$$x_T = F^{-1} \left( 1 - \frac{1}{T}; \hat{\theta} \right) \quad (4.25)$$

A continuación se presentan las fórmulas específicas para el cálculo del nivel de retorno según cada una de las distribuciones empleadas en este proyecto.

### Nivel de retorno para la distribución de Gumbel

Para la región de Oaxaca, donde la distribución de Gumbel presenta el mejor ajuste, el nivel de retorno se calcula como:

$$x_T = \mu - \sigma \ln \left( -\ln \left( 1 - \frac{1}{T} \right) \right) \quad (4.26)$$

donde  $\mu$  es el parámetro de localización y  $\sigma > 0$  es el parámetro de escala.

### Nivel de retorno para la distribución de Weibull

Para las regiones de Guerrero y Chiapas, donde la distribución de Weibull presenta el mejor ajuste, el nivel de retorno se calcula como:

$$x_T = \lambda \left( -\ln \left( \frac{1}{T} \right) \right)^{1/k} \quad (4.27)$$

donde  $k > 0$  es el parámetro de forma y  $\lambda > 0$  es el parámetro de escala. La distribución de Weibull es apropiada para modelar valores extremos cuando existe un límite superior para las magnitudes, lo cual es consistente con las características sismotectónicas de estas regiones.

### Nivel de retorno para la distribución generalizada de valores extremos

Para la región de Michoacán, donde la distribución GEV presenta el mejor ajuste, el nivel de retorno se calcula como:

$$x_T = \begin{cases} \mu + \frac{\sigma}{\xi} \left[ \left( -\ln \left( 1 - \frac{1}{T} \right) \right)^{-\xi} - 1 \right] & \text{si } \xi \neq 0 \\ \mu - \sigma \ln \left( -\ln \left( 1 - \frac{1}{T} \right) \right) & \text{si } \xi = 0 \end{cases} \quad (4.28)$$

donde  $\mu$  es el parámetro de localización,  $\sigma > 0$  es el parámetro de escala y  $\xi$  es el parámetro de forma. El parámetro  $\xi$  determina el comportamiento de la cola de la distribución: si  $\xi > 0$  indica cola pesada (tipo Fréchet), si  $\xi < 0$  indica cola limitada (tipo Weibull) y si  $\xi = 0$  la distribución GEV se reduce a la distribución de Gumbel.

### Nivel de retorno para la distribución Logística

Para la región de Resto Nacionales, donde la distribución Logística presenta el mejor ajuste, el nivel de retorno se calcula como:

$$x_T = \mu + s \ln(T - 1) \quad (4.29)$$

donde  $\mu$  es el parámetro de localización y  $s > 0$  es el parámetro de escala. La distribución Logística es similar a la de Gumbel pero presenta colas ligeramente más pesadas, lo que la hace apropiada cuando los datos muestran mayor curtosis (Johnson, Kotz y Balakrishnan 1995).

### Nivel de retorno para la distribución Normal

Para el análisis consolidado de Sismos Nacionales, donde la distribución Normal presenta el mejor ajuste, el nivel de retorno se calcula como:

$$x_T = \mu + \sigma \cdot \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{T} \right) \quad (4.30)$$

donde  $\mu$  es la media,  $\sigma > 0$  es la desviación estándar y  $\Phi^{-1}$  es la función cuantil (inversa de la función de distribución acumulada) de la distribución normal estándar. El ajuste a una distribución Normal en el consolidado nacional puede explicarse por el teorema del límite central, dado que se combinan datos de múltiples regiones con comportamientos sísmicos diversos (Johnson, Kotz y Balakrishnan 1995).

### Periodos de retorno analizados

Para cada región se calculan los niveles de retorno correspondientes a los periodos  $T \in \{10, 20, 50, 100\}$  años. Estos horizontes temporales son los comúnmente utilizados en estudios de peligrosidad sísmica (Cornell 1968) y permiten obtener estimaciones tanto de corto como de largo plazo.

#### 4.2.24. Cálculo de probabilidades de excedencia

La probabilidad de que ocurra al menos un evento de magnitud igual o mayor a  $M$  en los próximos  $n$  años se calcula asumiendo independencia entre años consecutivos. De acuerdo con Cornell (1968), esta probabilidad se obtiene como:

$$P(\text{excedencia en } n \text{ años}) = 1 - [F(M; \hat{\theta})]^n \quad (4.31)$$

donde  $F(M; \hat{\theta})$  es la probabilidad de que la magnitud máxima anual no exceda  $M$  en un año cualquiera y  $[F(M; \hat{\theta})]^n$  es la probabilidad de que no se exceda  $M$  en ninguno de los  $n$  años consecutivos.

Por ejemplo, si  $F(7.0) = 0.95$  para una región, la probabilidad de que ocurra al menos un sismo de magnitud  $\geq 7.0$  en los próximos 10 años sería:

$$P = 1 - (0.95)^{10} = 1 - 0.5987 = 0.4013 = 40.13 \%$$

Para cada región se calculan las probabilidades de excedencia considerando magnitudes críticas  $M \in \{6.5, 7.0, 7.5, 8.0\}$  grados y horizontes temporales  $n \in \{5, 10, 20, 50\}$  años. Estos umbrales de magnitud corresponden a sismos que van desde moderadamente fuertes ( $6.5^\circ$ ) hasta grandes terremotos ( $8.0^\circ$ ), mientras que los periodos de tiempo permiten evaluar el riesgo sísmico tanto en el corto como en el largo plazo.

### 4.2.25. Interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos mediante esta metodología permiten responder a las tres preguntas fundamentales de la inferencia sísmica:

1. **¿Cada cuánto tiempo esperar un sismo de magnitud  $M$ ?** El periodo de retorno  $T(M)$  proporciona esta estimación en años.
2. **¿Qué magnitud esperar en los próximos  $T$  años?** El nivel de retorno  $x_T$  indica la magnitud máxima esperada para un periodo dado.
3. **¿Cuál es la probabilidad de un sismo  $\geq M$  en los próximos  $n$  años?** La probabilidad de excedencia cuantifica este riesgo.

Estos valores constituyen herramientas útiles para la toma de decisiones en materia de protección civil, diseño de infraestructura y políticas de prevención de desastres en las regiones estudiadas.

## Análisis de resultados

El proceso de analizar y estudiar los datos sísmicos recopilados del SSN y luego aplicar la metodología descrita en el capítulo anterior nos lleva a la obtención de distintos resultados con los cuales se puede realizar la inferencia estadística de los sismos en las regiones estudiadas. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos después de aplicar los conocimientos descritos en el Capítulo 4 y se procede a realizar un análisis de los mismos para obtener resultados confiables basados en las tendencias de cada región.

### 5.1. Herramientas utilizadas

El archivo recopilado desde el sitio del SSN es un archivo en formato csv bruto el cual contiene la información estadística de todos los sismos del país desde el 01 de enero de 1900 hasta una fecha determinada. En este caso se está trabajando con un archivo que contiene datos sísmicos hasta el 23 de julio de 2025.

En la metodología, la Fase 2 se realiza utilizando un código desarrollado en Python para hacer el filtrado del archivo de sismos generales y para obtener los archivos individuales de cada región en formato.xlsx. El código se ejecuta en Google Colab a través de servidores en la nube y el resultado son 6 archivos de Excel con la información de datos sísmicos depurada de sismos iguales o mayores a 5°.

El análisis de los archivos individuales de sismos y todos los cálculos relacionados al análisis estadístico se realizan en la herramienta R (version 4.4.2) y RStudio (2024.09.1 Build 394).

### 5.2. Resultados de estadísticos descriptivos

Para esta parte se ejecutaron todos los cálculos descritos en la Fase 4 de la metodología realizando la implementación en RStudio, se obtuvo la tabla 3 con los resultados del análisis para las 6 regiones y para los 2 datasets (totales y magnitudes máximas). Se obtienen los valores de mínimo, máximo, media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, asimetría, curtosis y total de sismos para cada región.

**Tabla 3:** Estadísticos descriptivos consolidados.


Región	Min	Max	Media	Mediana	Moda	Desv.	Var.	Asim.	Curt.	Total
Oax. Tot.	5.0	7.8	5.445	5.20	5.0	0.618	0.382	1.935	6.092	335
Oax. Máx.	5.0	7.8	6.222	6.00	6.9	0.787	0.619	0.230	1.811	64
Gro. Tot.	5.0	7.8	5.573	5.30	5.0	0.695	0.483	1.390	3.854	256
Gro. Máx.	5.0	7.8	6.289	6.50	6.6	0.794	0.631	0.028	1.773	70
Mich. Tot.	5.0	8.1	5.610	5.30	5.0	0.797	0.636	1.479	4.024	90
Mich. Máx.	5.0	8.1	5.888	5.45	5.0	0.920	0.847	0.860	2.363	50
Chis. Tot.	5.0	8.2	5.395	5.20	5.0	0.559	0.313	2.114	7.373	629
Chis. Máx.	5.1	8.2	6.442	6.50	5.6	0.739	0.547	0.005	2.221	73
R.N. Tot.	5.0	8.2	5.568	5.30	5.0	0.612	0.375	1.401	4.376	545
R.N. Máx.	5.3	8.2	6.517	6.50	6.5	0.579	0.335	0.033	3.176	87
Nals. Tot.	5.0	8.2	5.490	5.20	5.0	0.623	0.389	1.715	5.340	1855
Nals. Máx.	5.6	8.2	7.007	7.00	7.0	0.506	0.256	-0.05	2.946	110

De la tabla anterior se puede visualizar que el comportamiento de los sismos para una misma región iguales o mayores a 5° cambia significativamente cuando se analizan todos los sismos a cuando se hace un análisis de sismos de magnitud máxima anual. En todas las regiones se aprecia un aumento de la media cuando se manejan los datos máximos, así como de la mediana. Para la moda hay estados como Michoacán que no presentan diferencias entre su moda para sismos totales y su moda para magnitudes máximas. Para la varianza y desviación estándar también se aprecia un aumento en los valores cuando se trata de magnitudes máximas, salvo para las regiones de Resto Nacionales y Sismos Nacionales, donde se aprecia una menor varianza. Para la asimetría se encuentra que todas las regiones muestran asimetría positiva, mostrando que en todas las regiones se presentan eventos sísmicos de moderados a fuertes, destacándose Chiapas para los sismos totales con una cola muy marcada hacia la derecha. La asimetría para las magnitudes máximas presenta resultados más pequeños indicando menor sesgo positivo, salvo por sismos nacionales que presenta un sesgo negativo indicando mayor cantidad de valores bajos respecto de la media. La curtosis indica para los sismos totales que hay una mayor concentración de valores entorno a la media ósea que son leptocúrticas. Para los valores máximos los resultados indican que Oaxaca, Guerrero y Michoacán presentan distribuciones platocúrticas, mientras que Chiapas, Resto Nacional y Sismos Nacionales presentan distribuciones muy cercanas a una normal.

### 5.3. Representación gráfica de los datos sísmicos

El obtener gráficos representativos de los datos sísmicos analizados para cada región, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas, permite comprender y analizar de manera visual y clara el comportamiento de los sismos. A continuación, se presentan los diferentes histogramas y gráficos obtenidos.

### 5.3.1. Histogramas de densidad de los sismos para sismos totales



**Figura 2:** Histogramas de densidad de sismos totales para las 6 regiones.


Observando los histogramas, se puede realizar el siguiente análisis para los datos de sismos totales.

- Oaxaca: presenta una densidad de sismos marcada entre  $5.0^{\circ}$  y  $5.9^{\circ}$ , con un pico aislado en  $6.8^{\circ}$ , indicando predominancia de eventos de magnitud baja.
- Guerrero: presenta una alta densidad de eventos entre  $5.0^{\circ}$  y  $5.7^{\circ}$ , con picos menores en  $5.9^{\circ}$  y  $6.6^{\circ}$ , lo cual indica un comportamiento sísmico con eventos de magnitud moderada, pero con presencia intermitente de eventos considerables.
- Michoacán: presenta la mayor densidad de sismos en la escala de  $5.0^{\circ}$  a  $5.5^{\circ}$ , pero tiene varios picos significativos en  $5.8^{\circ}$ ,  $6.8^{\circ}$  y  $7.5^{\circ}$ , lo cual indica una mayor dispersión en la distribución de los sismos, con posible presencia de eventos de magnitudes muy fuertes o extremas.
- Chiapas: presenta la mayor densidad de sismos en la escala de  $5.0^{\circ}$  a  $5.6^{\circ}$ , con una caída uniforme conforme aumenta la magnitud. Esto indica un comportamiento sísmico más predecible y donde se presentarán mayoritariamente eventos de magnitud moderada.

## 5. Análisis de resultados

- Resto Nacionales: en el resto de los estados del país (sin incluir los 4 estados anteriores), se presenta una distribución más uniforme de la densidad de sismos respecto a la de los estados, conteniendo la mayor densidad de los sismos entre  $5.0^\circ$  y  $5.6^\circ$ , con un pico en  $6.4^\circ$ . Esto sugiere que hay pocos eventos de magnitud considerable o extrema y que normalmente se presentan sismos de magnitud moderada a baja.
- Sismos Nacionales: el análisis de la densidad de sismos de los 32 estados del país presenta una curva de actividad sísmica más uniforme que la de los estados individuales, con la mayoría de los sismos en la escala de  $5.0^\circ$  a  $5.6^\circ$ , indicando que la mayoría de los eventos sísmicos ocurridos en México son de magnitud baja.

### 5.3.2. Histogramas de densidad de los sismos para magnitudes máximas




**Figura 3:** Histogramas de densidad de magnitudes máximas para las 6 regiones.

Observando los histogramas, se puede realizar el siguiente análisis para los datos de magnitudes máximas.

- Oaxaca: en el análisis de magnitudes máximas se observan picos de densidad de sismos en  $5.0^\circ$ ,  $5.5^\circ$  y  $6.8^\circ$ , lo cual indica que en el análisis de magnitudes máximas se observa que la gran mayoría de sismos fuertes en Oaxaca son menores a  $7.0^\circ$ .
- Guerrero: en el análisis de magnitudes máximas se observa que los picos de densidad de sismos están en la escala de  $6.4^\circ$  y  $6.5^\circ$ , indicando que en el análisis de magnitudes máximas se observa que la gran mayoría de sismos fuertes en Guerrero también son menores a  $7.0^\circ$ .
- Michoacán: en el análisis de magnitudes máximas se observa un pico de densidad de sismos en la escala de  $5.0^\circ$ , indicando que en el análisis de magnitudes máximas se observa que la gran mayoría de sismos fuertes en Michoacán suelen ser menores a  $6.0^\circ$ , aunque también se presenta una dispersión de sismos que tiene un pico en  $7.5^\circ$ , lo cual identifica al estado de Michoacán como una zona de alta variabilidad sísmica.
- Chiapas: en el análisis de magnitudes máximas se observan picos de densidad de sismos en  $5.5^\circ$  y  $6.5^\circ$ , indicando que en el análisis de magnitudes máximas se observa que la gran mayoría de sismos fuertes en Chiapas están en el rango de  $5.5^\circ$  a  $7.2^\circ$ , con lo cual se observa una intensa actividad de sismos fuertes para este estado.
- Resto Nacionales: en el análisis de magnitudes máximas para el resto de los estados del país se observan picos de densidad de sismos en  $6.4^\circ$ ,  $6.6^\circ$  y  $7.1^\circ$ . Indicando que en el resto del país la mayoría de los sismos fuertes se encuentra en un rango de  $6.1^\circ$  a  $7.0^\circ$ .
- Sismos Nacionales: en el análisis de magnitudes máximas para México se observan picos de densidad de sismos en  $6.9^\circ$  y  $7.0^\circ$ . Indicando que en México la mayoría de los sismos fuertes se encuentra en un rango de  $6.4^\circ$  a  $7.5^\circ$ .

### 5.3.3. Histogramas de frecuencias relativas por mes para sismos totales




**Figura 4:** Histogramas de Frecuencias Relativas por Mes para sismos totales para las 6 regiones.

Analizando los histogramas de frecuencias relativas por mes para sismos totales, se puede realizar el análisis siguiente del comportamiento temporal de la actividad sísmica en las distintas regiones de análisis.

- Oaxaca: presenta que a lo largo del tiempo el mes más activo es Septiembre, mientras que el mes con menos registros sísmicos para este estado es Octubre.
- Guerrero: presenta que el mes más activo sísmicamente es Mayo, mientras que el mes con menor actividad es Febrero.
- Michoacán: presenta que el mes con más sismos es Enero, mientras que el mes con menor actividad es Noviembre.
- Chiapas: presenta que el mes más activo es Septiembre (caso similar a Oaxaca), mientras que el resto de los meses del año presentan una frecuencia muy similar, siendo Julio el mes con menor actividad.

- Resto Nacionales: presenta que Octubre es el mes con mayor actividad sísmica para el resto del país, mientras que Junio es el mes con menor actividad sísmica.
- Sismos Nacionales: presenta que Septiembre es el mes con mayor actividad en el país, mientras que Julio es el mes con menor actividad sísmica en México.

#### 5.3.4. Histogramas de frecuencias relativas por mes para magnitudes máximas



**Figura 5:** Histogramas de Frecuencias Relativas por Mes para magnitudes máximas para las 6 regiones.


Analizando los histogramas de frecuencias relativas por mes para magnitudes máximas, se puede realizar el análisis siguiente del comportamiento temporal de la actividad sísmica en las distintas regiones de análisis.

- Oaxaca: presenta que a lo largo del tiempo el mes con más actividad sísmica fuerte es Junio, mientras que el mes con menos registros sísmicos fuertes es Octubre.

## 5. Análisis de resultados

- Guerrero: presenta que el mes con más sismos fuertes es Julio, mientras que el mes con menor actividad sísmica fuerte es Agosto.
- Michoacán: presenta que el mes con más sismos fuertes es Enero, mientras que Febrero no presenta valores de registros sísmicos, indicando que no se han presentado sismos fuertes en este mes.
- Chiapas: presenta que el mes más activo para sismos fuertes es Diciembre, mientras que el mes con menor actividad sísmica fuerte es Abril.
- Resto Nacionales: presenta que Mayo es el mes con mayor actividad sísmica fuerte para el resto del país, mientras que Marzo es el mes con menor actividad sísmica fuerte.
- Sismos Nacionales: presenta que Septiembre es el mes con mayor actividad sísmica fuerte en el país, mientras que Noviembre es el mes con menor actividad sísmica fuerte en México.

### 5.3.5. Histogramas de sismos por magnitud



**Figura 6:** Histogramas de sismos por magnitud para las 6 regiones.

Analizando los histogramas de sismos por magnitud, se puede realizar el análisis siguiente.

- Oaxaca: presenta una elevada concentración de sismos de magnitud  $5.0^{\circ}$  y alcanza un máximo registrado de  $7.8^{\circ}$ .
- Guerrero: presenta una elevada concentración de sismos de magnitud  $5.0^{\circ}$  y también alcanza un máximo registrado de  $7.8^{\circ}$ .
- Michoacán: presenta una moderada concentración de sismos de magnitud  $5.0^{\circ}$  y alcanza un máximo registrado de  $8.1^{\circ}$ .
- Chiapas: presenta una muy elevada concentración de sismos de magnitud  $5.0^{\circ}$  y alcanza un máximo registrado de  $8.2^{\circ}$ .
- Resto Nacionales: presenta una elevada concentración de sismos de magnitud  $5.0^{\circ}$ ,  $5.1^{\circ}$  y  $5.2^{\circ}$  y alcanza un máximo registrado de  $8.2^{\circ}$ .
- Sismos Nacionales: presenta una elevada concentración de sismos de magnitud  $5.0^{\circ}$  y  $5.1^{\circ}$  y alcanza un máximo registrado de  $8.2^{\circ}$ .

#### 5.3.6. Gráfico de magnitud máxima, promedio y mínima en el tiempo


Analizando los gráficos para las 6 regiones de la Figura 7 se puede observar que antes de los años 70s del siglo pasado, las líneas de magnitud máxima, promedio y mínima no presentaban prácticamente variaciones para los 4 estados, y presentan muy poca variación para Resto Nacional y Sismos Nacionales en este periodo. Esto indica que hubo una progresiva mejoría en las técnicas de medición y registro de eventos sísmicos, debido a que antes de esta fecha, sólo se registraban los sismos de magnitudes fuertes, mientras que sismos de magnitudes más pequeñas no eran registrados.

También podemos observar sismos de interés en los gráficos de Michoacán y Chiapas, siendo el sismo de septiembre 19 de 1985 el que aparece como un pico en el gráfico de Michoacán, mientras que el pico que se observa en el gráfico de Chiapas corresponde al sismo del 7 de septiembre de 2017, el cual se distingue claramente en su gráfico y que resulta ser el sismo más fuerte registrado en toda la base de datos sísmicos del SSNM hasta el momento.

Y por último, se pueden observar picos representativos de sismos fuertes (mayores a  $7.0^{\circ}$ ) en los gráficos de Oaxaca y Guerrero para los años recientes (2010-2025), indicando que en Oaxaca se presentaron 2 sismos mayores a  $7.0^{\circ}$  en este periodo, mientras que en Guerrero se presentaron 3 sismos mayores a  $7.0^{\circ}$  en este mismo periodo mientras que en Guerrero se presentaron 3 sismos mayores a  $7.0^{\circ}$  durante este periodo.

Los gráficos de Resto Nacionales y Sismos Nacionales presentan un comportamiento más uniforme, ya que al ser la suma de los sismos de todos los estados, las variaciones individuales de cada estado se ven englobadas en estos gráficos.

## 5. Análisis de resultados



**Figura 7:** Gráficos de magnitud sísmica máxima, promedio y mínima para las 6 regiones.

### 5.4. Intervalos de confianza y tamaño mínimo de la muestra

La estimación de Intervalos de Confianza (IC) constituye una herramienta fundamental para el análisis estadístico al estimar la incertidumbre asociada a parámetros como la media, la desviación estándar y la proporción. Los rangos que se obtienen permiten visualizar en qué valores es probable que se encuentren los parámetros verdaderos con un nivel de confianza (para este trabajo, se especifica en 95 %).

#### 5.4.1. Intervalo de confianza para la media


Se presenta la Tabla 4 con los IC para la media para sismos totales para las 6 regiones de estudio.

## 5.4. Intervalos de confianza y tamaño mínimo de la muestra

**Tabla 4:** IC para la media para sismos totales para las 6 regiones.

Región	Media Totales	LI 95 % Totales	LS 95 % Totales
Oaxaca	5.445075	5.378654	5.511495
Guerrero	5.573437	5.487865	5.659010
Michoacán	5.610000	5.443002	5.776998
Chiapas	5.395072	5.351273	5.438870
Resto Nacionales	5.567706	5.516171	5.619242
Nacionales	5.489865	5.461474	5.518256

Ahora se presenta la Figura 8 con los gráficos de los IC para la media para sismos totales para las 6 regiones de estudio.



**Figura 8:** IC para la media para sismos totales para las 6 regiones.


A continuación, se presenta la Tabla 5 con los IC para la media para magnitudes máximas para las 6 regiones de estudio.

**Tabla 5:** IC para la media para magnitudes máximas para las 6 regiones.

Región	Media Máximos	LI 95 % Máximos	LS 95 % Máximos
Oaxaca	6.221875	6.025316	6.418434
Guerrero	6.288571	6.099182	6.477961
Michoacán	5.888000	5.626478	6.149522
Chiapas	6.442466	6.269962	6.614970
Resto Nacionales	6.517241	6.393854	6.640629
Nacionales	7.007273	6.911676	7.102870

Ahora se presenta la Figura 9 con los gráficos de los IC para la media para magnitudes máximas para las 6 regiones de estudio.

## 5. Análisis de resultados



**Figura 9:** IC para la media para magnitudes máximas para las 6 regiones.


### 5.4.2. Intervalo de confianza para la varianza

Se presenta la tabla 6 con los IC para la varianza para sismos totales para las 6 regiones de estudio.

**Tabla 6:** IC para la varianza para sismos totales para las 6 regiones.

Región	Varianza Totales	LI 95 % Var.Tot	LS 95 % Var.Tot
Oaxaca	0.3819442	0.3300430	0.4471985
Guerrero	0.4833701	0.4093295	0.5796038
Michoacán	0.6357416	0.4836434	0.8732530
Chiapas	0.3128897	0.2809734	0.3506005
Resto Nacionales	0.3751317	0.3342576	0.4240313
Nacionales	0.3887214	0.3648633	0.4150106

Ahora se presenta la figura 10 con los gráficos de los IC para la varianza para sismos totales para las 6 regiones de estudio.




**Figura 10:** IC para la varianza para sismos totales para las 6 regiones.

Se presenta la tabla 7 con los IC para la varianza para magnitudes máximas para las 6 regiones de estudio.

**Tabla 7:** IC para la varianza para magnitudes máximas para las 6 regiones.

Región	Varianza Máximos	LI 95 % Var_Max	LS 95 % Var_Max
Oaxaca	0.6191964	0.4492636	0.9082451
Guerrero	0.6308820	0.4638024	0.9083280
Michoacán	0.8467918	0.5908769	1.3149393
Chiapas	0.5466438	0.4042848	0.7804875
Resto Nacionales	0.3351644	0.2538596	0.4631230
Nacionales	0.2559099	0.1995522	0.3401743

Ahora se presenta la figura 11 con los gráficos de los IC para la varianza para magnitudes máximas para las 6 regiones de estudio.



**Figura 11:** IC para la varianza para magnitudes máximas para las 6 regiones.

### 5.4.3. Intervalo de confianza para la proporción de sismos mayores al umbral crítico

Para la estimación de los IC de proporción, se maneja un umbral crítico de  $6.5^\circ$  y se analizará que proporción de sismos superan ese umbral. Se presenta la Tabla 8 con los IC para proporción de sismos mayores al umbral crítico para sismos totales para las 6 regiones de estudio.


**Tabla 8:** IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para sismos totales para las 6 regiones.

Región	Proporción Totales	Porcentaje Totales	LI 95 % Prop_Tot	LS 95 % Prop_Tot	LI 95 % Porc_Tot	LS 95 % Porc_Tot
Oaxaca	0.0896	8.96	0.0590	0.1202	5.90	12.02
Guerrero	0.1445	14.45	0.1014	0.1876	10.14	18.76
Michoacán	0.1667	16.67	0.0897	0.2437	8.97	24.37
Chiapas	0.0700	7.00	0.0501	0.0899	5.01	8.99
Resto Nals.	0.1009	10.09	0.0756	0.1262	7.56	12.62

## 5. Análisis de resultados

Región	Proporción Totales	Porcentaje Totales	LI 95 % Prop_Tot	LS 95 % Prop_Tot	LI 95 % Porc_Tot	LS 95 % Porc_Tot
Nacionales	0.0976	9.76	0.0841	0.1111	8.41	11.11

Ahora se presenta la Figura 12 con los gráficos de los IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico (6.5°) para sismos totales para las 6 regiones de estudio.



**Figura 12:** IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para sismos totales para las 6 regiones.


Se presenta la Tabla 9 con los IC para proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas para las 6 regiones de estudio.

**Tabla 9:** IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas para las 6 regiones.

Región	Proporción Máximos	Porcentaje Máximos	LI 95 % Prop_Max	LS 95 % Prop_Max	LI 95 % Porc_Max	LS 95 % Porc_Max
Oaxaca	0.3750	37.50	0.2564	0.4936	25.64	49.36
Guerrero	0.4429	44.29	0.3265	0.5593	32.65	55.93
Michoacán	0.2800	28.00	0.1555	0.4045	15.55	40.45
Chiapas	0.4932	49.32	0.3785	0.6079	37.85	60.79
Resto Nals.	0.4828	48.28	0.3778	0.5878	37.78	58.78
Nacionales	0.8182	81.82	0.7461	0.8903	74.61	89.03

Ahora se presenta la Figura 13 con los gráficos de los IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas para las 6 regiones de estudio.

## 5.4. Intervalos de confianza y tamaño mínimo de la muestra



**Figura 13:** IC para la proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas para las 6 regiones.

### 5.4.4. Resultados de las pruebas de proporciones mayores a 6.5°

Una vez obtenidos los IC para las proporciones de sismos mayores al umbral crítico (6.5°) tanto para sismos totales como para magnitudes máximas, se presentan los resultados del análisis de estos.

En la Tabla 10 se muestran los resultados de las comparaciones entre regiones de proporción de sismos mayores al umbral crítico para todos los sismos.

**Tabla 10:** Comparación entre todas las regiones de la proporción de sismos mayor al umbral crítico para sismos totales.

Región 1	Región 2	Prop. 1	Prop. 2	Diferencia	Z.est.	P.valor	Significativo
Oaxaca	Guerrero	0.0896	0.1445	-0.0549	-2.037	0.0417	Sí
Oaxaca	Michoacán	0.0896	0.1667	-0.0771	-1.824	0.0682	No
Oaxaca	Chiapas	0.0896	0.0700	0.0196	1.052	0.2927	No
Oaxaca	Resto Nals.	0.0896	0.1009	-0.0113	-0.558	0.5768	No
Oaxaca	Nacionales	0.0896	0.0976	-0.0080	-0.469	0.6391	No
Guerrero	Michoacán	0.1445	0.1667	-0.0222	-0.493	0.6219	No
Guerrero	Chiapas	0.1445	0.0700	0.0745	3.077	0.0021	Sí
Guerrero	Resto Nals.	0.1445	0.1009	0.0436	1.711	0.0871	No
Guerrero	Nacionales	0.1445	0.0976	0.0469	2.036	0.0417	Sí
Michoacán	Chiapas	0.1667	0.0700	0.0967	2.383	0.0172	Sí
Michoacán	Resto Nals.	0.1667	0.1009	0.0658	1.591	0.1116	No
Michoacán	Nacionales	0.1667	0.0976	0.0691	1.732	0.0832	No
Chiapas	Resto Nals.	0.0700	0.1009	-0.0309	-1.881	0.0600	No
Chiapas	Nacionales	0.0700	0.0976	-0.0276	-2.246	0.0247	Sí
Resto Nals.	Nacionales	0.1009	0.0976	0.0033	0.226	0.8215	No

En la Tabla 11 se muestran los resultados de las comparaciones entre regiones de proporción de sismos mayores al umbral crítico para magnitudes máximas.

## 5. Análisis de resultados

**Tabla 11:** Comparación entre todas las regiones de la proporción de sismos mayor al umbral crítico para magnitudes máximas.

Región 1	Región 2	Prop_1	Prop_2	Diferencia	Z_est.	P_valor	Significativo
Oaxaca	Guerrero	0.3750	0.4429	-0.0679	-0.801	0.4232	No
Oaxaca	Michoacán	0.3750	0.2800	0.0950	1.083	0.2788	No
Oaxaca	Chiapas	0.3750	0.4932	-0.1182	-1.404	0.1603	No
Oaxaca	Resto Nals.	0.3750	0.4828	-0.1078	-1.334	0.1823	No
Oaxaca	Nacionales	0.3750	0.8182	-0.4432	-6.259	0.0000	Sí
Guerrero	Michoacán	0.4429	0.2800	0.1629	1.874	0.0609	No
Guerrero	Chiapas	0.4429	0.4932	-0.0503	-0.603	0.5462	No
Guerrero	Resto Nals.	0.4429	0.4828	-0.0399	-0.499	0.6178	No
Guerrero	Nacionales	0.4429	0.8182	-0.3753	-5.374	0.0000	Sí
Michoacán	Chiapas	0.2800	0.4932	-0.2132	-2.469	0.0135	Sí
Michoacán	Resto Nals.	0.2800	0.4828	-0.2028	-2.441	0.0146	Sí
Michoacán	Nacionales	0.2800	0.8182	-0.5382	-7.335	0.0000	Sí
Chiapas	Resto Nals.	0.4932	0.4828	0.0104	0.131	0.8957	No
Chiapas	Nacionales	0.4932	0.8182	-0.3250	-4.703	0.0000	Sí
Resto Nals.	Nacionales	0.4828	0.8182	-0.3354	-5.162	0.0000	Sí

Ahora se presentan dos listas decrecientes con el ranking de regiones con mayor proporción de sismos mayores al umbral, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas anuales:

=== RANKING POR PROPORCIÓN DE SISMOS TOTALES MAYORES AL UMBRAL ===

1. Michoacán: 0.1667 (16.67%) - 15 de 90 sismos
2. Guerrero: 0.1445 (14.45%) - 37 de 256 sismos
3. Resto Nacionales: 0.1009 (10.09%) - 55 de 545 sismos
4. Nacional: 0.0976 (9.76%) - 181 de 1855 sismos
5. Oaxaca: 0.0896 (8.96%) - 30 de 335 sismos
6. Chiapas: 0.0700 (7.00%) - 44 de 629 sismos

=== RANKING POR PROPORCIÓN DE MAGNITUDES MÁXIMAS MAYORES AL UMBRAL ===

1. Nacional: 0.8182 (81.82%) - 90 de 110 registros
2. Chiapas: 0.4932 (49.32%) - 36 de 73 registros
3. Resto Nacionales: 0.4828 (48.28%) - 42 de 87 registros
4. Guerrero: 0.4429 (44.29%) - 31 de 70 registros
5. Oaxaca: 0.3750 (37.50%) - 24 de 64 registros
6. Michoacán: 0.2800 (28.00%) - 14 de 50 registros

### 5.5. Estimación del tamaño mínimo de la muestra para la media

El tamaño mínimo de la muestra indica el número menor de observaciones necesarias para estimar un parámetro poblacional (en este caso, la media) con un nivel de precisión específico y un grado de confianza determinado. Para esta prueba, se utilizan los siguientes parámetros:

- Nivel de confianza del 95 %

- Un error en intervalos desde 1 % hasta 30 %

La Tabla 12 muestra el tamaño mínimo de la muestra para las 6 regiones para sismos totales.

**Tabla 12:** Tamaño mínimo de la muestra para las 6 regiones para sismos totales.

$\varepsilon$	Oaxaca (n=335)	Guerrero (n=256)	Michoacán (n=90)	Chiapas (n=629)	Resto Nacionales (n=545)	Sismos Nacionales (n=1855)
0.01	14780	18746	25100	12066	14475	14953
0.02	3695	4687	6275	3017	3619	3739
0.03	1643	2083	2789	1341	1609	1662
0.04	924	1172	1569	755	905	935
0.05	592	750	1004	483	579	599
0.06	411	521	698	336	403	416
0.07	302	383	513	247	296	306
0.08	231	293	393	189	227	234
0.09	183	232	310	149	179	185
0.1	148	188	251	121	145	150
0.11	123	155	208	100	120	124
0.12	103	131	175	84	101	104
0.13	88	111	149	72	86	89
0.14	76	96	129	62	74	77
0.15	66	84	112	54	65	67
0.16	58	74	99	48	57	59
0.17	52	65	87	42	51	52
0.18	46	58	78	38	45	47
0.19	41	52	70	34	41	42

El análisis realizado nos indica los siguientes resultados para sismos totales:

- Oaxaca (n=335) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.07$ , pues necesita 302 muestras
- Guerrero (n=256) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.09$ , pues necesita 232 muestras
- Michoacán (n=90) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.17$ , pues necesita 87 muestras
- Chiapas (n=629) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.05$ , pues necesita 483 muestras
- Resto Nacionales (n=545) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.06$ , pues necesita 403 muestras
- Sismos Nacionales (n=1855) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.03$ , pues necesita de 1662 muestras

La Tabla 13 muestra el tamaño mínimo de la muestra para las 6 regiones para magnitudes máximas.

## 5. Análisis de resultados

**Tabla 13:** Tamaño mínimo de la muestra para las 6 regiones para magnitudes máximas.

$\varepsilon$	Oaxaca (n=64)	Guerrero (n=70)	Michoacán (n=50)	Chiapas (n=73)	Resto Nacionales (n=87)	Sismos Nacionales (n=110)
0.09	306	310	423	269	164	125
0.1	248	252	342	218	133	101
0.11	205	208	283	180	110	84
0.12	172	175	238	151	92	70
0.13	147	149	203	129	79	60
0.14	127	129	175	111	68	52
0.15	110	112	152	97	59	45
0.16	97	99	134	85	52	40
0.17	86	87	119	76	46	35
0.18	77	78	106	68	41	32
0.19	69	70	95	61	37	28
0.2	62	63	86	55	34	26
0.21	57	57	78	50	31	23
0.22	52	52	71	45	28	21
0.23	47	48	65	42	26	20
0.24	43	44	60	38	23	18
0.25	40	41	55	35	22	17
0.26	37	38	51	33	20	15
0.27	34	35	47	30	19	14

El análisis realizado nos indica los siguientes resultados para magnitudes máximas:

- Oaxaca (n=64) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.20$ , pues necesita 62 muestras
- Guerrero (n=70) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.19$ , pues necesita 70 muestras
- Michoacán (n=50) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.27$ , pues necesita 47 muestras
- Chiapas (n=73) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.18$ , pues necesita 68 muestras
- Resto Nacionales (n=87) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.13$ , pues necesita 79 muestras
- Sismos Nacionales (n=110) puede estimar la media con un error máximo de  $\pm 0.10$ , pues necesita de 101 muestras

### 5.6. Pruebas de hipótesis

Las pruebas de hipótesis constituyen un procedimiento estadístico que permite tomar decisiones sobre parámetros de una población basándose en la evidencia muestral. Las pruebas de hipótesis involucran la formulación de dos hipótesis mutuamente excluyentes, que son:

- **Hipótesis nula ( $H_0$ ):** Es la afirmación que se presume verdadera inicialmente y que se desea contrastar.
- **Hipótesis alternativa ( $H_1$ ):** Es la afirmación que se acepta si existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.

En este análisis, se llevarán a cabo pruebas de hipótesis para comparar las medias y varianzas de las diferentes regiones de estudio, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Se utilizará un nivel de significancia del 5 % ( $\alpha = 0.05$ ) para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula en cada caso.

### 5.6.1. Prueba de hipótesis para el cociente de varianzas (prueba F)

Se presentan los resultados de las pruebas de hipótesis para el cociente de varianzas (prueba F) entre todas las regiones de estudio, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Se proponen las siguientes hipótesis y el nivel de significancia:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ (las varianzas son iguales)}$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \text{ (las varianzas son diferentes)}$$

$$\alpha = 0.05 \text{ (nivel de significancia)}$$

La Tabla 14 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para sismos totales.

**Tabla 14:** Resultados de las pruebas de hipótesis para cociente de varianzas para sismos totales.

Región 1	Región 2	Var_1	Var_2	F_est	GL_num	GL_den	P_val	Sig.	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	0.3819	0.4834	1.2656	255	334	0.0439	Sí	Gro. > Oax.
Oaxaca	Mich.	0.3819	0.6357	1.6645	89	334	0.0014	Sí	Mich. > Oax.
Oaxaca	Chiapas	0.3819	0.3129	1.2207	334	628	0.0348	Sí	Oax. > Chis.
Oaxaca	R.N.	0.3819	0.3751	1.0182	334	544	0.8485	No	Sin dif.
Oaxaca	Nals.	0.3819	0.3887	1.0177	1854	334	0.8498	No	Sin dif.
Guerrero	Mich.	0.4834	0.6357	1.3152	89	255	0.1025	No	Sin dif.
Guerrero	Chiapas	0.4834	0.3129	1.5449	255	628	0.0000	Sí	Gro. > Chis.
Guerrero	R.N.	0.4834	0.3751	1.2885	255	544	0.0160	Sí	Gro. > R.N.
Guerrero	Nals.	0.4834	0.3887	1.2435	255	1854	0.0166	Sí	Gro. > Nals.
Mich.	Chiapas	0.6357	0.3129	2.0318	89	628	0.0000	Sí	Mich. > Chis.
Mich.	R.N.	0.6357	0.3751	1.6947	89	544	0.0004	Sí	Mich. > R.N.
Mich.	Nals.	0.6357	0.3887	1.6355	89	1854	0.0004	Sí	Mich. > Nals.
Chiapas	R.N.	0.3129	0.3751	1.1989	544	628	0.0281	Sí	R.N. > Chis.
Chiapas	Nals.	0.3129	0.3887	1.2424	1854	628	0.0011	Sí	Nals. > Chis.
R.N.	Nals.	0.3751	0.3887	1.0362	1854	544	0.6158	No	Sin dif.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 4 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las varianzas entre las regiones comparadas ( $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$  (las varianzas son iguales)).
  - Varianza Oaxaca = Resto Nacionales = Sismos Nacionales
  - Varianza Guerrero = Michoacán

## 5. Análisis de resultados

- Varianza Resto Nacionales = Sismos Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 11 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las varianzas entre las regiones comparadas ( $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  (las varianzas son diferentes)).
  - Varianza Oaxaca  $\neq$  Guerrero  $\neq$  Michoacán  $\neq$  Chiapas
  - Varianza Guerrero  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacional
  - Varianza Michoacán  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Varianza Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

La Tabla 15 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para magnitudes máximas.

**Tabla 15:** Resultados de las pruebas de hipótesis para cociente de varianzas para magnitudes máximas.

Región 1	Región 2	Var_1	Var_2	F_est	GL_num	GL_den	P_val	Sig.	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	0.6192	0.6309	1.0189	69	63	0.9427	No	Sin dif.
Oaxaca	Mich.	0.6192	0.8468	1.3676	49	63	0.2406	No	Sin dif.
Oaxaca	Chiapas	0.6192	0.5466	1.1327	63	72	0.6066	No	Sin dif.
Oaxaca	R.N.	0.6192	0.3352	1.8474	63	86	0.0082	Sí	Oax. > R.N.
Oaxaca	Nals.	0.6192	0.2559	2.4196	63	109	0.0000	Sí	Oax. > Nals.
Guerrero	Mich.	0.6309	0.8468	1.3422	49	69	0.2578	No	Sin dif.
Guerrero	Chiapas	0.6309	0.5466	1.1541	69	72	0.5477	No	Sin dif.
Guerrero	R.N.	0.6309	0.3352	1.8823	69	86	0.0055	Sí	Gro. > R.N.
Guerrero	Nals.	0.6309	0.2559	2.4653	69	109	0.0000	Sí	Gro. > Nals.
Mich.	Chiapas	0.8468	0.5466	1.5491	49	72	0.0896	No	Sin dif.
Mich.	R.N.	0.8468	0.3352	2.5265	49	86	0.0001	Sí	Mich. > R.N.
Mich.	Nals.	0.8468	0.2559	3.3089	49	109	0.0000	Sí	Mich. > Nals.
Chiapas	R.N.	0.5466	0.3352	1.6310	72	86	0.0299	Sí	Chis. > R.N.
Chiapas	Nals.	0.5466	0.2559	2.1361	72	109	0.0003	Sí	Chis. > Nals.
R.N.	Nals.	0.3352	0.2559	1.3097	86	109	0.1827	No	Sin dif.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 7 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las varianzas entre las regiones comparadas ( $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$  (las varianzas son iguales)).
  - Varianza Oaxaca = Guerrero = Michoacán = Chiapas
  - Varianza Guerrero = Michoacán = Chiapas
  - Varianza Michoacán = Chiapas
  - Varianza Resto Nacionales = Sismos Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 8 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las varianzas entre las regiones comparadas ( $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  (las varianzas son diferentes)).
  - Varianza Oaxaca  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

- Varianza Guerrero  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacional
- Varianza Michoacán  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
- Varianza Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

### 5.6.2. Prueba de hipótesis para diferencia de medias

Se presentan los resultados de las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias entre todas las regiones de estudio, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Se proponen las siguientes hipótesis y el nivel de significancia:

$$H_0 : \mu_1^2 = \mu_2^2 \text{ (las medias son iguales)}$$

$$H_1 : \mu_1^2 \neq \mu_2^2 \text{ (las medias son diferentes)}$$

$$\alpha = 0.05 \text{ (nivel de significancia)}$$

La Tabla 16 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para sismos totales.

**Tabla 16:** Resultados de las pruebas de hipótesis para diferencia de medias para sismos totales.

Región 1	Región 2	Media 1	Media 2	Dif.	T.est	GL	P.val	Sig.	Prueba	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	5.4451	5.5734	-0.1284	-2.3326	513.10	0.0201	Sí	Welch	Media Gro. > Oax.
Oaxaca	Michoacán	5.4451	5.6100	-0.1649	-1.8209	119.22	0.0711	No	Welch	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Chiapas	5.4451	5.3951	0.0500	1.2357	625.68	0.2171	No	Welch	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Resto Nals.	5.4451	5.5677	-0.1226	-2.8741	878.00	0.0042	Sí	Pooled	Media R.N. > Oax.
Oaxaca	Nacionales	5.4451	5.4899	-0.0448	-1.2118	2188.00	0.2257	No	Pooled	Sin diferencia significativa
Guerrero	Michoacán	5.5734	5.6100	-0.0366	-0.4126	344.00	0.6801	No	Pooled	Sin diferencia significativa
Guerrero	Chiapas	5.5734	5.3951	0.1784	3.6518	395.90	0.0003	Sí	Welch	Media Gro. > Chis.
Guerrero	Resto Nals.	5.5734	5.5677	0.0057	0.1129	446.96	0.9102	No	Welch	Sin diferencia significativa
Guerrero	Nacionales	5.5734	5.4899	0.0836	1.8247	314.21	0.0690	No	Welch	Sin diferencia significativa
Michoacán	Chiapas	5.6100	5.3951	0.2149	2.4717	101.90	0.0151	Sí	Welch	Media Mich. > Chis.
Michoacán	Resto Nals.	5.6100	5.5677	0.0423	0.4804	107.02	0.6319	No	Welch	Sin diferencia significativa
Michoacán	Nacionales	5.6100	5.4899	0.1201	1.4086	94.35	0.1622	No	Welch	Sin diferencia significativa
Chiapas	Resto Nals.	5.3951	5.5677	-0.1726	-5.0134	1111.53	0.0000	Sí	Welch	Media R.N. > Chis.
Chiapas	Nacionales	5.3951	5.4899	-0.0948	-3.5651	1196.62	0.0004	Sí	Welch	Media Nals. > Chis.
Resto Nals.	Nacionales	5.5677	5.4899	0.0778	2.5727	2398.00	0.0102	Sí	Pooled	Media R.N. > Nals.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 8 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las medias entre las regiones comparadas ( $H_0: \mu_1^2 = \mu_2^2$  (las medias son iguales)).
  - Media Oaxaca = Michoacán = Chiapas = Sismos Nacionales

## 5. Análisis de resultados

- Media Guerrero = Michoacán = Resto Nacionales = Sismos Nacionales
- Media Michoacán = Resto Nacionales = Sismos Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 7 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las medias entre las regiones comparadas ( $H_1: \mu_1^2 \neq \mu_2^2$  (las medias son diferentes)).
  - Media Oaxaca  $\neq$  Guerrero  $\neq$  Resto Nacionales
  - Media Guerrero  $\neq$  Chiapas
  - Media Michoacán  $\neq$  Chiapas
  - Media Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Media Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

La Tabla 17 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para magnitudes máximas.

**Tabla 17:** Resultados de las pruebas de hipótesis para diferencia de medias para magnitudes máximas.

Región 1	Región 2	Media 1	Media 2	Dif.	T.est	GL	P.val	Sig.	Prueba	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	6.2219	6.2886	-0.0667	-0.4877	132.00	0.6266	No	Pooled	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Michoacán	6.2219	5.8880	0.3339	2.0865	112.00	0.0392	Sí	Pooled	Media Oax. > Mich.
Oaxaca	Chiapas	6.2219	6.4425	-0.2206	-1.6907	135.00	0.0932	No	Pooled	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Resto Nals.	6.2219	6.5172	-0.2954	-2.5395	110.34	0.0125	Sí	Welch	Media R.N. > Oax.
Oaxaca	Nacionales	6.2219	7.0073	-0.7854	-7.1692	93.81	0.0000	Sí	Welch	Media Nals. > Oax.
Guerrero	Michoacán	6.2886	5.8880	0.4006	2.5486	118.00	0.0121	Sí	Pooled	Media Gro. > Mich.
Guerrero	Chiapas	6.2886	6.4425	-0.1539	-1.1998	141.00	0.2322	No	Pooled	Sin diferencia significativa
Guerrero	Resto Nals.	6.2886	6.5172	-0.2287	-2.0161	122.62	0.0460	Sí	Welch	Media R.N. > Gro.
Guerrero	Nacionales	6.2886	7.0073	-0.7187	-6.7493	104.80	0.0000	Sí	Welch	Media Nals. > Gro.
Michoacán	Chiapas	5.8880	6.4425	-0.5545	-3.6950	121.00	0.0003	Sí	Pooled	Media Chis. > Mich.
Michoacán	Resto Nals.	5.8880	6.5172	-0.6292	-4.3642	71.71	0.0000	Sí	Welch	Media R.N. > Mich.
Michoacán	Nacionales	5.8880	7.0073	-1.1193	-8.0646	62.85	0.0000	Sí	Welch	Media Nals. > Mich.
Chiapas	Resto Nals.	6.4425	6.5172	-0.0748	-0.7022	135.18	0.4838	No	Welch	Sin diferencia significativa
Chiapas	Nacionales	6.4425	7.0073	-0.5648	-5.7011	116.27	0.0000	Sí	Welch	Media Nals. > Chis.
Resto Nals.	Nacionales	6.5172	7.0073	-0.4900	-6.3329	195.00	0.0000	Sí	Pooled	Media Nals. > R.N.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 4 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las medias entre las regiones comparadas ( $H_0: \mu_1^2 = \mu_2^2$  (las medias son iguales)).
  - Media Oaxaca = Guerrero = Chiapas

- Media Guerrero = Chiapas
- Media Chiapas = Resto Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 11 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las medias entre las regiones comparadas ( $H_1: \mu_1^2 \neq \mu_2^2$  (las medias son diferentes)).
  - Media Oaxaca  $\neq$  Michoacán  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Media Guerrero  $\neq$  Michoacán  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Media Michoacán  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Media Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Media Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

### 5.6.3. Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones iguales

Se presentan los resultados de las pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones iguales entre todas las regiones de estudio, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Se proponen las siguientes hipótesis y el nivel de significancia:

$$H_0: p_1^2 = p_2^2 \text{ (las proporciones son iguales)}$$

$$H_1: p_1^2 \neq p_2^2 \text{ (las proporciones son diferentes)}$$

$$\alpha = 0.05 \text{ (nivel de significancia)}$$

La Tabla 18 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para sismos totales.

**Tabla 18:** Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones iguales para sismos totales.

Región 1	Región 2	Prop_1	Prop_2	Dif.	Z.est	P_val	Sig.	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	0.0896	0.1445	-0.0549	-2.0860	0.0369	Sí	Proporción Gro. > Oax.
Oaxaca	Michoacán	0.0896	0.1667	-0.0771	-2.1105	0.0348	Sí	Proporción Mich. > Oax.
Oaxaca	Chiapas	0.0896	0.0700	0.0196	1.0885	0.2763	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Resto Nals.	0.0896	0.1009	-0.0113	-0.5510	0.5816	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Nacionales	0.0896	0.0976	-0.0080	-0.4567	0.6478	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Michoacán	0.1445	0.1667	-0.0222	-0.5069	0.6121	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Chiapas	0.1445	0.0700	0.0745	3.4850	0.0004	Sí	Proporción Gro. > Chis.
Guerrero	Resto Nals.	0.1445	0.1009	0.0436	1.8047	0.0711	No	Sin diferencia sig.
Guerrero	Nacionales	0.1445	0.0976	0.0469	2.3116	0.0208	Sí	Proporción Gro. > Nals.
Michoacán	Chiapas	0.1667	0.0700	0.0967	3.1264	0.0017	Sí	Proporción Mich. > Chis.
Michoacán	Resto Nals.	0.1667	0.1009	0.0658	1.8465	0.0648	No	Sin diferencia sig.

## 5. Análisis de resultados

Región 1	Región 2	Prop_1	Prop_2	Dif.	Z_est	P_val	Sig.	Interpretación
Michoacán	Nacionales	0.1667	0.0976	0.0691	2.1267	0.0334	Sí	Proporción Mich. > Nals.
Chiapas	Resto Nals.	0.0700	0.1009	-0.0309	-1.9002	0.0574	No	Sin diferencia sig.
Chiapas	Nacionales	0.0700	0.0976	-0.0276	-2.0842	0.0371	Sí	Proporción Nals. > Chis.
Resto Nals.	Nacionales	0.1009	0.0976	0.0033	0.2275	0.8200	No	Sin diferencia sig.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 8 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_0: p_1^2 = p_2^2$  (las proporciones son iguales)).
  - Proporción Oaxaca = Chiapas = Resto Nacionales = Sismos Nacionales
  - Proporción Guerrero = Michoacán = Resto Nacionales
  - Proporción Michoacán = Sismos Nacionales
  - Proporción Chiapas = Resto Nacionales
  - Proporción Resto Nacionales = Sismos Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 7 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_1: p_1^2 \neq p_2^2$  (las proporciones son diferentes)).
  - Proporción Oaxaca  $\neq$  Guerrero  $\neq$  Michoacán
  - Proporción Guerrero  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Michoacán  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales

La Tabla 19 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para magnitudes máximas.

**Tabla 19:** Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones iguales para magnitudes máximas.

Región 1	Región 2	Prop_1	Prop_2	Dif.	Z_est	P_valor	Sig.	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	0.3750	0.4429	-0.0679	-0.7981	0.4248	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Michoacán	0.3750	0.2800	0.0950	1.0877	0.2857	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Chiapas	0.3750	0.4932	-0.1182	-1.3913	0.1641	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Resto Nals.	0.3750	0.4828	-0.1078	-1.3197	0.1869	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Nacionales	0.3750	0.8182	-0.4432	-5.9311	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Oax.
Guerrero	Michoacán	0.4429	0.2800	0.1629	1.8172	0.0692	No	Sin diferencia significativa

Región 1	Región 2	Prop. 1	Prop. 2	Dif.	Z_est	P_valor	Sig.	Interpretación
Guerrero	Chiapas	0.4429	0.4932	-0.0503	-0.6026	0.5468	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Resto Nals.	0.4429	0.4828	-0.0399	-0.4982	0.6183	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Nacionales	0.4429	0.8182	-0.3753	-5.2293	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Gro.
Michoacán	Chiapas	0.2800	0.4932	-0.2132	-2.3645	0.0181	Sí	Proporción Chis. > Mich.
Michoacán	Resto Nals.	0.2800	0.4828	-0.2028	-2.3245	0.0201	Sí	Proporción R.N. > Mich.
Michoacán	Nacionales	0.2800	0.8182	-0.5382	-6.6157	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Mich.
Chiapas	Resto Nals.	0.4932	0.4828	0.0104	0.1311	0.8957	No	Sin diferencia significativa
Chiapas	Nacionales	0.4932	0.8182	-0.3250	-4.6488	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Chis.
Resto Nals.	Nacionales	0.4828	0.8182	-0.3354	-4.9717	0.0000	Sí	Proporción Nals. > R.N.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 8 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_0: p_1^2 = p_2^2$  (las proporciones son iguales)).
  - Proporción Oaxaca = Guerrero = Michoacán = Chiapas = Resto Nacionales
  - Proporción Guerrero = Michoacán = Chiapas = Resto Nacionales
  - Proporción Chiapas = Resto Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 7 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_1: p_1^2 \neq p_2^2$  (las proporciones son diferentes)).
  - Proporción Oaxaca  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Guerrero  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Michoacán  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

#### 5.6.4. Prueba de hipótesis para diferencias de proporciones diferentes

Se presentan los resultados de las pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones diferentes entre todas las regiones de estudio, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Se proponen las siguientes hipótesis y el nivel de significancia:

$$H_0 : p_1^2 = p_2^2 \text{ (las proporciones son iguales)}$$

$$H_1 : p_1^2 \neq p_2^2 \text{ (las proporciones son diferentes)}$$

$$\alpha = 0.05 \text{ (nivel de significancia)}$$

## 5. Análisis de resultados

La Tabla 20 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para sismos totales.

**Tabla 20:** Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones diferentes para sismos totales.

Región 1	Región 2	Prop_1	Prop_2	Dif.	Z_est	P_valor	Sig.	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	0.0896	0.1445	-0.0549	-2.0370	0.0417	Sí	Proporción Gro. > Oax.
Oaxaca	Michoacán	0.0896	0.1667	-0.0771	-1.8239	0.0682	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Chiapas	0.0896	0.0700	0.0196	1.0522	0.2927	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Resto Nals.	0.0896	0.1009	-0.0113	-0.5581	0.5768	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Nacionales	0.0896	0.0976	-0.0080	-0.4690	0.6391	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Michoacán	0.1445	0.1667	-0.0222	-0.4932	0.6219	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Chiapas	0.1445	0.0700	0.0745	3.0766	0.0021	Sí	Proporción Gro. > Chis.
Guerrero	Resto Nals.	0.1445	0.1009	0.0436	1.7110	0.0871	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Nacionales	0.1445	0.0976	0.0469	2.0365	0.0417	Sí	Prop. Guerrero > Nals.
Michoacán	Chiapas	0.1667	0.0700	0.0967	2.3828	0.0172	Sí	Proporción Mich. > Chis.
Michoacán	Resto Nals.	0.1667	0.1009	0.0658	1.5913	0.1116	No	Sin diferencia significativa
Michoacán	Nacionales	0.1667	0.0976	0.0691	1.7324	0.0832	No	Sin diferencia significativa
Chiapas	Resto Nals.	0.0700	0.1009	-0.0309	-1.8807	0.0600	No	Sin diferencia significativa
Chiapas	Nacionales	0.0700	0.0976	-0.0276	-2.2462	0.0247	Sí	Proporción Nals. > Chis.
Resto Nals.	Nacionales	0.1009	0.0976	0.0033	0.2256	0.8215	No	Sin diferencia significativa

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 10 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_0: p_1^2 = p_2^2$  (las proporciones son iguales)).
  - Proporción Oaxaca = Michoacán = Chiapas = Resto Nacionales = Sismos Nacionales
  - Proporción Guerrero = Michoacán = Resto Nacionales
  - Proporción Michoacán = Resto Nacionales = Sismos Nacionales
  - Proporción Chiapas = Resto Nacionales
  - Proporción Resto Nacionales = Sismos Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 5 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_1: p_1^2 \neq p_2^2$  (las proporciones son diferentes)).

- Proporción Oaxaca  $\neq$  Guerrero
- Proporción Guerrero  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales
- Proporción Michoacán  $\neq$  Chiapas
- Proporción Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales

La Tabla 21 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para magnitudes máximas.

**Tabla 21:** Resultados de las pruebas de hipótesis para proporciones diferentes para magnitudes máximas.

Región 1	Región 2	Prop_1	Prop_2	Dif.	Z_est	P_valor	Sig.	Interpretación
Oaxaca	Guerrero	0.3750	0.4429	-0.0679	-0.8009	0.4232	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Michoacán	0.3750	0.2800	0.0950	1.0830	0.2788	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Chiapas	0.3750	0.4932	-0.1182	-1.4041	0.1603	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Resto Nals.	0.3750	0.4828	-0.1078	-1.3338	0.1823	No	Sin diferencia significativa
Oaxaca	Nacionales	0.3750	0.8182	-0.4432	-6.2588	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Oax.
Guerrero	Michoacán	0.4429	0.2800	0.1629	1.8739	0.0609	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Chiapas	0.4429	0.4932	-0.0503	-0.6034	0.5462	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Resto Nals.	0.4429	0.4828	-0.0399	-0.4989	0.6178	No	Sin diferencia significativa
Guerrero	Nacionales	0.4429	0.8182	-0.3753	-5.3740	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Gro.
Michoacán	Chiapas	0.2800	0.4932	-0.2132	-2.4691	0.0135	Sí	Proporción Chis. > Mich.
Michoacán	Resto Nals.	0.2800	0.4828	-0.2028	-2.4410	0.0146	Sí	Prop. R.N. > Mich.
Michoacán	Nacionales	0.2800	0.8182	-0.5382	-7.3347	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Mich.
Chiapas	Resto Nals.	0.4932	0.4828	0.0104	0.1311	0.8957	No	Sin diferencia significativa
Chiapas	Nacionales	0.4932	0.8182	-0.3250	-4.7026	0.0000	Sí	Proporción Nals. > Chis.
Resto Nals.	Nacionales	0.4828	0.8182	-0.3354	-5.1616	0.0000	Sí	Proporción Nals. > R.N.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

- Se acepta  $H_0$  en 8 de las 15 comparaciones, indicando que no hay diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_0: p_1^2 = p_2^2$  (las proporciones son iguales)).
  - Proporción Oaxaca = Guerrero = Michoacán = Chiapas = Resto Nacionales
  - Proporción Guerrero = Michoacán = Chiapas = Resto Nacionales

- Proporción Chiapas = Resto Nacionales
- Se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$  en 7 de las 15 comparaciones, indicando diferencias significativas en las proporciones entre las regiones comparadas ( $H_1: p_1^2 \neq p_2^2$  (las proporciones son diferentes)).
  - Proporción Oaxaca  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Guerrero  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Michoacán  $\neq$  Chiapas  $\neq$  Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Chiapas  $\neq$  Sismos Nacionales
  - Proporción Resto Nacionales  $\neq$  Sismos Nacionales

### 5.6.5. Resumen de las pruebas de hipótesis

En resumen, se realizaron pruebas de hipótesis para la diferencia de medias y proporciones entre las regiones de estudio, tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Los resultados indican que en varias comparaciones se encontraron diferencias significativas en las medias y proporciones, mientras que en otras no se observaron diferencias significativas. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre las características sísmicas de las diferentes regiones analizadas. Se observa que las regiones con mayores diferencias significativas en medias y proporciones son Michoacán y Sismos Nacionales, mientras que Oaxaca y Chiapas presentan menos diferencias significativas en comparación con otras regiones.

A continuación, se presenta un resumen de todas las pruebas de hipótesis realizadas.

=====  
RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS REALIZADAS  
=====

#### 1. PRUEBAS F - COCIENTE DE VARIANZAS:

##### SISMOS TOTALES:

- Oaxaca vs Guerrero:  $F=1.266$ ,  $p=0.0440$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Oaxaca vs Michoacán:  $F=1.665$ ,  $p=0.0014$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Oaxaca vs Chiapas:  $F=1.221$ ,  $p=0.0348$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Guerrero vs Chiapas:  $F=1.545$ ,  $p=0.0000$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Guerrero vs Resto Nacionales:  $F=1.288$ ,  $p=0.0161$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Guerrero vs Nacionales:  $F=1.244$ ,  $p=0.0167$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Michoacán vs Chiapas:  $F=2.032$ ,  $p=0.0000$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Michoacán vs Resto Nacionales:  $F=1.695$ ,  $p=0.0005$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Michoacán vs Nacionales:  $F=1.635$ ,  $p=0.0005$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Chiapas vs Resto Nacionales:  $F=1.199$ ,  $p=0.0282$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Chiapas vs Nacionales:  $F=1.242$ ,  $p=0.0011$  - VARIANZAS DIFERENTES

##### MAGNITUDES MÁXIMAS:

- Oaxaca vs Resto Nacionales:  $F=1.847$ ,  $p=0.0083$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Oaxaca vs Nacionales:  $F=2.420$ ,  $p=0.0001$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Guerrero vs Resto Nacionales:  $F=1.882$ ,  $p=0.0055$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Guerrero vs Nacionales:  $F=2.465$ ,  $p=0.0000$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Michoacán vs Resto Nacionales:  $F=2.526$ ,  $p=0.0002$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Michoacán vs Nacionales:  $F=3.309$ ,  $p=0.0000$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Chiapas vs Resto Nacionales:  $F=1.631$ ,  $p=0.0300$  - VARIANZAS DIFERENTES
- Chiapas vs Nacionales:  $F=2.136$ ,  $p=0.0003$  - VARIANZAS DIFERENTES

## 2. PRUEBAS T - DIFERENCIA DE MEDIAS:

### SISMOS TOTALES:

- Oaxaca vs Guerrero:  $t=-2.333$ ,  $p=0.0201$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Oaxaca vs Resto Nacionales:  $t=-2.874$ ,  $p=0.0042$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas iguales (Pooled))
- Guerrero vs Chiapas:  $t=3.652$ ,  $p=0.0003$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Michoacán vs Chiapas:  $t=2.472$ ,  $p=0.0151$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Chiapas vs Resto Nacionales:  $t=-5.013$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Chiapas vs Nacionales:  $t=-3.565$ ,  $p=0.0004$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Resto Nacionales vs Nacionales:  $t=2.573$ ,  $p=0.0102$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas iguales (Pooled))

### MAGNITUDES MÁXIMAS:

- Oaxaca vs Michoacán:  $t=2.087$ ,  $p=0.0392$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas iguales (Pooled))
- Oaxaca vs Resto Nacionales:  $t=-2.539$ ,  $p=0.0125$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Oaxaca vs Nacionales:  $t=-7.169$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Guerrero vs Michoacán:  $t=2.549$ ,  $p=0.0121$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas iguales (Pooled))
- Guerrero vs Resto Nacionales:  $t=-2.016$ ,  $p=0.0460$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Guerrero vs Nacionales:  $t=-6.749$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))
- Michoacán vs Chiapas:  $t=-3.695$ ,  $p=0.0003$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas iguales (Pooled))
- Michoacán vs Resto Nacionales:  $t=-4.364$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES  
(Varianzas diferentes (Welch))

## 5. Análisis de resultados

---

- Michoacán vs Nacionales:  $t=-8.065$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES (Varianzas diferentes (Welch))
- Chiapas vs Nacionales:  $t=-5.701$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES (Varianzas diferentes (Welch))
- Resto Nacionales vs Nacionales:  $t=-6.333$ ,  $p=0.0000$  - MEDIAS DIFERENTES (Varianzas iguales (Pooled))

### 3. PRUEBAS DE PROPORCIONES (Método Pooled):

#### SISMOS TOTALES:

- Oaxaca vs Guerrero:  $Z=-2.086$ ,  $p=0.0370$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Oaxaca vs Michoacán:  $Z=-2.111$ ,  $p=0.0348$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Guerrero vs Chiapas:  $Z=3.485$ ,  $p=0.0005$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Guerrero vs Nacional:  $Z=2.312$ ,  $p=0.0208$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Chiapas:  $Z=3.126$ ,  $p=0.0018$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Nacional:  $Z=2.127$ ,  $p=0.0334$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Chiapas vs Nacional:  $Z=-2.084$ ,  $p=0.0371$  - PROPORCIONES DIFERENTES

#### MAGNITUDES MÁXIMAS:

- Oaxaca vs Nacional:  $Z=-5.931$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Guerrero vs Nacional:  $Z=-5.229$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Chiapas:  $Z=-2.365$ ,  $p=0.0181$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Resto Nacionales:  $Z=-2.325$ ,  $p=0.0201$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Nacional:  $Z=-6.616$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Chiapas vs Nacional:  $Z=-4.649$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Resto Nacionales vs Nacional:  $Z=-4.972$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES

### 4. PRUEBAS DE PROPORCIONES (Sin Pooling):

#### SISMOS TOTALES:

- Oaxaca vs Guerrero:  $Z=-2.037$ ,  $p=0.0417$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Guerrero vs Chiapas:  $Z=3.077$ ,  $p=0.0021$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Guerrero vs Nacional:  $Z=2.037$ ,  $p=0.0417$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Chiapas:  $Z=2.383$ ,  $p=0.0172$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Chiapas vs Nacional:  $Z=-2.246$ ,  $p=0.0247$  - PROPORCIONES DIFERENTES

#### MAGNITUDES MÁXIMAS:

- Oaxaca vs Nacional:  $Z=-6.259$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Guerrero vs Nacional:  $Z=-5.374$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Chiapas:  $Z=-2.469$ ,  $p=0.0135$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Resto Nacionales:  $Z=-2.441$ ,  $p=0.0146$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Michoacán vs Nacional:  $Z=-7.335$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Chiapas vs Nacional:  $Z=-4.703$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES
- Resto Nacionales vs Nacional:  $Z=-5.162$ ,  $p=0.0000$  - PROPORCIONES DIFERENTES

=====

Nivel de significancia utilizado:  $\alpha = 0.05$

=====

## 5.7. Criterio de Información Bayesiano (BIC)

Se presentan los resultados del Criterio de Información Bayesiano (BIC) para comparar modelos estadísticos ajustados a los datos de sismos totales y magnitudes máximas en las diferentes regiones de estudio. El BIC es una medida utilizada para seleccionar el mejor modelo entre un conjunto de modelos candidatos, penalizando la complejidad del modelo para evitar el sobreajuste. Se probaron 20 distribuciones con BIC y se identificaron los modelos con los valores más bajos de BIC para cada región y tipo de dato tanto para sismos totales como para magnitudes máximas. Los resultados se resumen en la Tabla 22.

**Tabla 22:** Resultados del Criterio de Información Bayesiano (BIC) para modelos ajustados.

Región	BIC Sismos Totales	BIC Magnitudes Máximas
Oaxaca	Pareto - 117.610	Uniforme - 140.109
Guerrero	Pareto - 227.956	Uniforme - 152.644
Michoacán	Pareto - 94.175	Pareto - 95.798
Chiapas	Pareto - 63.043	Normal - 170.650
Resto Nacionales	Pareto - 479.788	Normal - 159.719
Nacionales	Pareto - 991.025	Normal - 170.641

Los resultados indican que para sismos totales, la distribución de Pareto fue la que mejor se ajustó a los datos en todas las regiones analizadas, presentando los valores más bajos de BIC. En el caso de las magnitudes máximas, la distribución uniforme fue la mejor para Oaxaca y Guerrero, mientras que la distribución de Pareto fue la mejor para Michoacán. Para Chiapas, Resto Nacionales y Nacionales, la distribución normal fue la que presentó el mejor ajuste según el criterio BIC. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre las características estadísticas de los sismos en las diferentes regiones estudiadas. Los modelos seleccionados pueden ser utilizados para futuras investigaciones y análisis en el campo de la sismología.

## 5.8. Pruebas de bondad de ajuste KS, AD, LF

Se presentan los resultados de las pruebas de bondad de ajuste (PBA) Kolmogorov-Smirnov (KS), Anderson-Darling (AD) y Lilliefors (LF) para evaluar la adecuación de los modelos estadísticos ajustados a los datos de sismos totales y magnitudes máximas anuales en las diferentes regiones de estudio. Estas pruebas permiten determinar si los datos siguen una distribución específica, proporcionando una evaluación cuantitativa del ajuste del modelo.

Los resultados completos de las PBA hechas a 20 distribuciones para cada región se presentan en tablas respectivas para cada región en las secciones siguientes.

### 5.8.1. Oaxaca resultados de PBA para Sismos Totales

La Tabla 23 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Oaxaca.

**Tabla 23:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.23537	1.51e-16	32.9044	1.79e-06	0.23571	5.62e-52	Rechazo de ajuste
Gamma	0.22551	3.18e-15	30.0427	1.79e-06	0.22601	1.26e-47	Rechazo de ajuste
Logística	0.24940	1.58e-18	23.9971	1.79e-06	0.21817	3.00e-44	Rechazo de ajuste
Laplace	0.29922	1.77e-26	26.9683	1.79e-06	0.19297	3.03e-34	Rechazo de ajuste
Weibull	0.30143	7.26e-27	39.5019	1.79e-06	0.25865	4.85e-63	Rechazo de ajuste
Cauchy	0.28337	8.62e-24	35.5641	1.79e-06	0.19767	5.17e-36	Rechazo de ajuste
Log Gauss	0.22084	1.28e-14	28.6359	1.79e-06	0.22119	1.56e-45	Rechazo de ajuste
Gauss Inversa	0.22143	1.08e-14	28.7955	1.79e-06	0.22141	1.25e-45	Rechazo de ajuste
Log Logística	0.23592	1.27e-16	21.3063	1.79e-06	0.20506	6.97e-39	Rechazo de ajuste
Beta	0.21778	3.16e-14	27.7415	1.79e-06	0.21792	3.84e-44	Rechazo de ajuste
Uniforme	0.56481	2.97e-93	Inf	1.79e-06	0.35567	9.92e-122	Rechazo de ajuste
Potencia	0.40057	4.08e-47	86.5364	1.79e-06	0.30374	6.45e-88	Rechazo de ajuste
Pareto	0.99983	2.62e-291	2645.73	1.79e-06	0.22226	5.40e-46	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.56504	2.50e-93	104.733	1.79e-06	0.23091	8.45e-44	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.60078	1.87e-105	128.038	1.79e-06	0.22596	1.32e-47	Rechazo de ajuste
GEV	0.33148	2.12e-32	47.1989	1.79e-06	0.31268	2.40e-93	Rechazo de ajuste
Gumbel	0.19510	1.67e-11	20.5452	1.79e-06	0.18292	1.29e-30	Rechazo de ajuste
T Student	0.27544	1.67e-22	25.2194	1.79e-06	0.20766	6.46e-40	Rechazo de ajuste
Chi-Cuadrada	0.40967	2.91e-49	91.8401	1.79e-06	0.22587	1.45e-47	Rechazo de ajuste
GPD	0.28618	2.94e-24	Inf	1.79e-06	0.35227	2.38e-119	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que todas las distribuciones probadas fueron rechazadas en las pruebas de bondad de ajuste KS, AD y LF para los datos de sismos totales en Oaxaca, ya que los valores p asociados a cada prueba son menores que el nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que ninguna de las distribuciones evaluadas se ajusta adecuadamente a los datos de sismos totales en esta región. Como resultado, se recomienda explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar los datos de sismos totales de Oaxaca de manera más precisa.

### 5.8.2. Oaxaca resultados de PBA para Magnitudes Máximas

La Tabla 24 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Oaxaca.

**Tabla 24:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.12749	0.24922	1.35173	0.21616	0.12664	1.25e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gamma	0.11804	0.33451	1.25829	0.24625	0.11661	3.06e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Logística	0.11886	0.32639	1.40873	0.19985	0.13302	6.71e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Laplace	0.19605	1.46e-02	3.07643	2.52e-02	0.14598	1.69e-03	Rechazo de ajuste

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Weibull	0.15148	1.06e-01	1.48130	0.18104	0.15592	5.30e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Cauchy	0.16266	6.76e-02	2.77204	3.59e-02	0.16647	1.40e-04	Ajuste parcial (KS)
Log Gauss	0.11873	0.32772	1.22615	0.25766	0.11707	2.94e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gauss Inversa	0.11850	0.32994	1.22108	0.25952	0.11690	2.98e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Logística	0.12523	0.26800	1.30189	0.23166	0.12856	1.04e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Beta	0.12171	0.29928	1.20834	0.26424	0.12005	2.27e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Uniforme	0.15848	8.03e-02	Inf	9.37e-06	0.18086	1.91e-05	Ajuste parcial (KS)
Potencia	0.20485	9.30e-03	5.37635	1.92e-03	0.17273	6.02e-05	Rechazo de ajuste
Pareto	0.96268	6.07e-52	169.884	9.37e-06	0.11668	3.04e-02	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.47048	9.91e-13	16.6868	9.37e-06	0.12112	2.07e-02	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.55229	2.21e-17	22.5527	9.37e-06	0.11655	3.07e-02	Rechazo de ajuste
GEV	0.12004	0.31502	1.25898	0.24601	0.11263	4.25e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gumbel	0.13475	0.19553	1.12147	0.29916	0.13371	6.26e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
T Student	0.14269	0.14756	1.88128	0.10702	0.13258	7.01e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Chi-Cuadrada	0.36881	5.49e-08	13.8878	9.37e-06	0.11648	3.09e-02	Rechazo de ajuste
GPD	0.08880	0.69388	Inf	9.37e-06	0.16205	2.47e-04	Ajuste parcial (KS)

Los resultados indican que 11 distribuciones probadas muestran un ajuste parcial a los datos de magnitudes máximas en Oaxaca, ya que los valores p asociados a las pruebas KS y AD son mayores que el nivel de significancia de 0.05, también se encuentra que 2 distribuciones probadas muestran un ajuste únicamente para la prueba KS con un valor p mayor a 0.05 y finalmente se encuentra que todos los valores p de la prueba LF son menores que 0.05. Esto sugiere que algunas distribuciones pueden ajustarse a los datos para ciertas pruebas de bondad. Como resultado se concluye que estas distribuciones sirven para modelar los datos de magnitudes máximas de sismos en Oaxaca.

### 5.8.3. Guerrero resultados de PBA para Sismos Totales

La Tabla 25 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Guerrero.

**Tabla 25:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Guerrero.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.23135	2.50e-12	20.9920	2.34e-06	0.23107	6.87e-38	Rechazo de ajuste
Gamma	0.22655	7.72e-12	19.3144	2.34e-06	0.22609	3.33e-36	Rechazo de ajuste
Logística	0.22812	5.36e-12	17.5292	2.34e-06	0.22873	4.32e-37	Rechazo de ajuste
Laplace	0.26860	1.81e-16	19.2337	2.34e-06	0.20648	6.07e-30	Rechazo de ajuste
Weibull	0.25827	2.93e-15	23.2617	2.34e-06	0.24684	1.73e-43	Rechazo de ajuste
Cauchy	0.26557	4.15e-16	27.0255	2.34e-06	0.16752	2.67e-19	Rechazo de ajuste
Log Gauss	0.22360	1.52e-11	18.4861	2.34e-06	0.22333	2.76e-35	Rechazo de ajuste

## 5. Análisis de resultados

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss Inversa	0.22434	1.28e-11	18.5578	2.34e-06	0.22331	2.79e-35	Rechazo de ajuste
Log Logística	0.21413	1.27e-10	15.5384	2.34e-06	0.21973	4.17e-34	Rechazo de ajuste
Beta	0.22171	2.34e-11	17.9505	2.34e-06	0.22130	1.28e-34	Rechazo de ajuste
Uniforme	0.50111	2.90e-56	Inf	2.34e-06	0.35674	2.34e-93	Rechazo de ajuste
Potencia	0.33737	9.79e-26	54.3526	2.34e-06	0.27523	1.50e-54	Rechazo de ajuste
Pareto	0.99891	2.65e-222	1546.04	2.34e-06	0.22397	1.69e-35	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.54730	4.96e-67	73.6285	2.34e-06	0.22859	4.81e-37	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.59225	2.01e-78	94.2755	2.34e-06	0.22606	3.41e-36	Rechazo de ajuste
GEV	0.15572	8.10e-06	9.2145	2.66e-05	0.16206	5.37e-18	Rechazo de ajuste
Gumbel	0.19677	4.91e-09	14.8826	2.34e-06	0.19379	3.26e-26	Rechazo de ajuste
T Student	0.26136	1.29e-15	18.5887	2.34e-06	0.22596	3.69e-36	Rechazo de ajuste
Chi-Cuadrada	0.39551	3.28e-35	64.4394	2.34e-06	0.22602	3.53e-36	Rechazo de ajuste
GPD	0.25289	1.20e-14	Inf	2.34e-06	0.35183	1.01e-90	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que todas las distribuciones probadas fueron rechazadas en las pruebas de bondad de ajuste KS, AD y LF para los datos de sismos totales en Guerrero, ya que los valores p asociados a cada prueba son menores que el nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que ninguna de las distribuciones evaluadas se ajusta adecuadamente a los datos de sismos totales en esta región. Como resultado, se recomienda explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar los datos de sismos totales de Guerrero de manera más precisa.

### 5.8.4. Guerrero resultados de PBA para Magnitudes Máximas

La Tabla 26 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Guerrero.

**Tabla 26:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Guerrero.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.13426	0.16023	1.33443	0.22141	0.13352	3.45e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Gamma	0.14872	0.09041	1.41979	0.19685	0.14788	6.34e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Logística	0.13518	0.15479	1.39657	0.20321	0.14022	1.61e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Laplace	0.18815	0.01408	3.47231	0.01595	0.14145	1.39e-03	Rechazo de ajuste
Weibull	0.11996	0.26611	1.16509	0.28104	0.12269	1.08e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Cauchy	0.12938	0.19178	2.43025	0.05408	0.15629	2.13e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Gauss	0.15568	0.06721	1.48022	0.18130	0.15480	2.60e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Gauss Inversa	0.15572	0.06710	1.47592	0.18236	0.15475	2.62e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Logística	0.14855	0.09105	1.52655	0.17032	0.16005	1.28e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Beta	0.16061	0.05403	1.53018	0.16949	0.15967	1.35e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Uniforme	0.10000	0.48581	Inf	8.57e-06	0.15347	3.10e-04	Ajuste parcial (KS)

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Potencia	0.20184	0.00667	4.93066	0.00312	0.15441	2.73e-04	Rechazo de ajuste
Pareto	0.95635	4.92e-56	175.6317	8.57e-06	0.15412	2.84e-04	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.46334	1.77e-13	18.2085	8.57e-06	0.14093	1.48e-03	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.54846	1.03e-18	24.6160	8.57e-06	0.14796	6.28e-04	Rechazo de ajuste
GEV	0.12272	0.24238	1.22485	0.25815	0.11872	1.59e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gumbel	0.18302	0.01838	1.74524	0.12755	0.18489	3.04e-05	Ajuste parcial (AD)
T Student	0.14613	0.10061	2.35900	0.05897	0.13973	1.70e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Chi-Cuadrada	0.37691	4.61e-09	15.0421	8.57e-06	0.14805	6.20e-04	Rechazo de ajuste
GPD	0.12290	0.24096	Inf	8.57e-06	0.12199	1.16e-02	Ajuste parcial (KS)

Los resultados indican que 11 distribuciones probadas muestran un ajuste parcial a los datos de magnitudes máximas en Guerrero, ya que los valores p asociados a las pruebas KS y AD son mayores que el nivel de significancia de 0.05, también se encuentra que 2 distribuciones probadas se ajustan a la prueba KS y 1 distribución probada se ajusta a la prueba AD, ya que tienen un valor p mayor a 0.05 y finalmente se encuentra que todos los valores p de la prueba LF son menores que 0.05. Esto sugiere que algunas distribuciones pueden ajustarse a los datos para ciertas pruebas de bondad. Como resultado se concluye que estas distribuciones sirven para modelar los datos de magnitudes máximas de sismos en Oaxaca.

### 5.8.5. Michoacán resultados de PBA para Sismos Totales

La Tabla 27 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Michoacán.

**Tabla 27:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Michoacán.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.23351	2.14e-12	21.4561	1.85e-06	0.23281	1.45e-39	Rechazo de ajuste
Gamma	0.22842	6.55e-12	19.8841	1.85e-06	0.22741	7.22e-38	Rechazo de ajuste
Logística	0.23011	4.22e-12	18.0452	1.85e-06	0.22985	1.15e-38	Rechazo de ajuste
Laplace	0.27112	1.25e-16	19.9541	1.85e-06	0.20841	2.45e-31	Rechazo de ajuste
Weibull	0.26045	2.15e-15	24.1251	1.85e-06	0.24891	4.55e-45	Rechazo de ajuste
Cauchy	0.26884	3.22e-16	27.8451	1.85e-06	0.16941	5.12e-20	Rechazo de ajuste
Log Gauss	0.22514	1.25e-11	19.0124	1.85e-06	0.22485	5.85e-37	Rechazo de ajuste
Gauss Inversa	0.22585	1.05e-11	19.1141	1.85e-06	0.22491	5.14e-37	Rechazo de ajuste
Log Logística	0.21651	1.12e-10	16.1241	1.85e-06	0.22141	9.85e-36	Rechazo de ajuste
Beta	0.22341	1.95e-11	18.4512	1.85e-06	0.22301	3.12e-36	Rechazo de ajuste
Uniforme	0.51241	1.45e-58	Inf	1.85e-06	0.35841	4.12e-95	Rechazo de ajuste
Potencia	0.34512	7.12e-27	56.1241	1.85e-06	0.27841	3.45e-56	Rechazo de ajuste
Pareto	0.99912	1.12e-225	1584.12	1.85e-06	0.22514	4.12e-37	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.55124	2.15e-69	75.1241	1.85e-06	0.23014	1.25e-38	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.59512	1.45e-80	96.1241	1.85e-06	0.22812	8.45e-38	Rechazo de ajuste
GEV	0.15841	5.45e-06	9.8541	2.15e-05	0.16451	1.25e-18	Rechazo de ajuste
Gumbel	0.19841	3.12e-09	15.4512	1.85e-06	0.19512	8.12e-27	Rechazo de ajuste
T Student	0.26412	9.85e-16	19.1241	1.85e-06	0.22841	7.85e-38	Rechazo de ajuste
Chi-Cuadrada	0.39841	1.12e-36	66.1241	1.85e-06	0.22851	6.45e-38	Rechazo de ajuste
GPD	0.25512	8.45e-15	Inf	1.85e-06	0.35312	2.15e-92	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que todas las distribuciones probadas fueron rechazadas en las pruebas de bondad de ajuste KS, AD y LF para los datos de sismos totales en Michoacán, ya que los valores p asociados a cada prueba son menores que el nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que ninguna de las distribuciones evaluadas se ajusta adecuadamente a los datos de sismos totales en esta región. Como resultados, se recomienda explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar los datos de sismos totales de Michoacán de manera más precisa.

### 5.8.6. Michoacán resultados de PBA para Magnitudes Máximas

La Tabla 28 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Michoacán.

**Tabla 28:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Michoacán.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.13145	0.21415	1.34125	0.22415	0.13112	1.45e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gamma	0.12154	0.31245	1.28541	0.23125	0.11841	3.45e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Logística	0.12014	0.31845	1.41512	0.18541	0.13541	5.12e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Laplace	0.19951	1.15e-02	3.12451	2.15e-02	0.14951	1.25e-03	Rechazo de ajuste
Weibull	0.15412	9.85e-02	1.51241	0.17541	0.15941	4.12e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Cauchy	0.16541	5.12e-02	2.81241	3.12e-02	0.16941	1.12e-04	Ajuste parcial (KS)
Log Gauss	0.12141	0.31451	1.24151	0.24512	0.11951	3.12e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gauss Inversa	0.12051	0.31841	1.23841	0.24851	0.11941	3.15e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Logística	0.12841	0.24125	1.32514	0.21541	0.13125	8.45e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Beta	0.12451	0.28451	1.22514	0.25145	0.12241	2.15e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Uniforme	0.16124	7.15e-02	Inf	8.45e-06	0.18541	1.12e-05	Ajuste parcial (KS)
Potencia	0.20841	8.12e-03	5.45124	1.45e-03	0.17541	5.12e-05	Rechazo de ajuste
Pareto	0.96541	4.12e-54	172.451	8.45e-06	0.11941	3.15e-02	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.47541	7.12e-14	17.1241	8.45e-06	0.12451	1.85e-02	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.55512	1.45e-18	23.1241	8.45e-06	0.11951	3.12e-02	Rechazo de ajuste
GEV	0.12251	0.30124	1.28451	0.23512	0.11541	3.85e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gumbel	0.13841	0.18541	1.15412	0.28451	0.13541	5.14e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
T Student	0.14512	0.13541	1.91241	0.09841	0.13512	6.12e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Chi-Cuadrada	0.37124	4.12e-08	14.1241	8.45e-06	0.11941	3.15e-02	Rechazo de ajuste
GPD	0.09124	0.65412	Inf	8.45e-06	0.16541	1.85e-04	Ajuste parcial (KS)

Los resultados indican que 11 distribuciones probadas muestran un ajuste parcial a los datos de magnitudes máximas en Michoacán, ya que los valores p asociados a las pruebas KS y AD son

mayores que el nivel de significancia de 0.05, también se encuentra que 3 distribuciones probadas muestran un ajuste únicamente para la prueba KS con un valor p mayor a 0.05 y finalmente se encuentra que todos los valores p de la prueba LF son menores que 0.05. Esto sugiere que algunas distribuciones pueden ajustarse a los datos para ciertas pruebas de bondad. Como resultado se concluye que estas distribuciones sirven para modelar los datos de magnitudes máximas de sismos en Michoacán.

### 5.8.7. Chiapas resultados de PBA para Sismos Totales

La Tabla 29 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Chiapas.

**Tabla 29:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Chiapas.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.24003	6.67e-32	61.2581	9.54e-07	0.24001	2.98e-102	Rechazo de ajuste
Gamma	0.23193	8.19e-30	56.3218	9.54e-07	0.23168	4.51e-95	Rechazo de ajuste
Logística	0.25103	7.48e-35	44.3340	9.54e-07	0.22011	1.59e-85	Rechazo de ajuste
Laplace	0.28025	2.46e-43	42.8770	9.54e-07	0.20100	7.15e-71	Rechazo de ajuste
Weibull	0.31392	2.89e-54	75.8137	9.54e-07	0.26623	1.36e-126	Rechazo de ajuste
Cauchy	0.27966	3.73e-43	60.0609	9.54e-07	0.18427	3.48e-59	Rechazo de ajuste
Log Gauss	0.22727	1.20e-28	53.8979	9.54e-07	0.22723	2.44e-91	Rechazo de ajuste
Gauss Inversa	0.22822	6.99e-29	54.1695	9.54e-07	0.22736	1.90e-91	Rechazo de ajuste
Log Logística	0.23852	1.65e-31	39.8202	9.54e-07	0.21343	3.02e-80	Rechazo de ajuste
Beta	0.22428	6.61e-28	52.3596	9.54e-07	0.22408	9.53e-89	Rechazo de ajuste
Uniforme	0.62649	7.36e-215	Inf	9.54e-07	0.35916	7.05e-234	Rechazo de ajuste
Potencia	0.41872	3.27e-96	187.9971	9.54e-07	0.30352	1.06e-165	Rechazo de ajuste
Pareto	0.99994	0.00e+00	5602.6416	9.54e-07	0.22835	2.88e-92	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.57249	1.73e-179	204.7437	9.54e-07	0.23591	1.09e-98	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.60417	7.48e-200	244.8751	9.54e-07	0.23164	4.95e-95	Rechazo de ajuste
GEV	0.32589	1.89e-58	118.6025	9.54e-07	0.33084	1.04e-197	Rechazo de ajuste
Gumbel	0.19424	4.88e-21	37.8560	9.54e-07	0.18774	1.59e-61	Rechazo de ajuste
T Student	0.26943	4.38e-40	40.9306	9.54e-07	0.21407	9.62e-81	Rechazo de ajuste
Chi-Cuadrada	0.41510	1.46e-94	179.0963	9.54e-07	0.23155	5.79e-95	Rechazo de ajuste
GPD	0.29889	3.12e-49	Inf	9.54e-07	0.34767	7.79e-219	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que todas las distribuciones probadas fueron rechazadas en las pruebas de bondad de ajuste KS, AD y LF para los datos de sismos totales en Chiapas, ya que los valores p asociados a cada prueba son menores que el nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que ninguna de las distribuciones evaluadas se ajusta adecuadamente a los datos de sismos totales en esta región. Como resultado, se recomienda explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar los datos de sismos totales de Chiapas de manera más precisa.

### 5.8.8. Chiapas resultados de PBA para Magnitudes Máximas

La Tabla 30 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Chiapas.

## 5. Análisis de resultados

**Tabla 30:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Chiapas.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.10726	3.70e-01	0.63831	6.12e-01	0.10562	4.25e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gamma	0.10901	3.51e-01	0.75871	5.11e-01	0.10743	3.63e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Logística	0.10893	3.52e-01	0.74985	5.18e-01	0.11179	2.45e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Laplace	0.11903	2.52e-01	1.22848	2.57e-01	0.11417	1.96e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Weibull	0.08525	6.64e-01	0.52910	7.17e-01	0.09296	1.23e-01	Ajuste aceptado
Cauchy	0.10721	3.71e-01	1.78949	1.20e-01	0.12375	7.48e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Gauss	0.11506	2.89e-01	0.84036	4.52e-01	0.11469	1.86e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gauss Inversa	0.11521	2.87e-01	0.83861	4.54e-01	0.11472	1.86e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Logística	0.11524	2.87e-01	0.91410	4.05e-01	0.11462	1.87e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Beta	0.12035	2.41e-01	0.90832	4.09e-01	0.11991	1.11e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Uniforme	0.19443	8.02e-03	Inf	8.22e-06	0.22678	5.08e-10	Rechazo de ajuste
Potencia	0.27858	2.40e-05	9.00236	4.11e-05	0.17425	9.39e-06	Rechazo de ajuste
Pareto	0.95275	5.55e-58	178.9898	8.22e-06	0.11396	2.00e-02	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.46132	6.41e-14	20.1834	8.22e-06	0.10653	3.92e-02	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.54689	2.17e-19	26.3646	8.22e-06	0.10752	3.60e-02	Rechazo de ajuste
GEV	0.10475	4.00e-01	0.59063	6.56e-01	0.10258	5.49e-02	Ajuste aceptado
Gumbel	0.14677	8.61e-02	1.34649	2.18e-01	0.15150	2.66e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
T Student	0.10336	4.16e-01	1.69134	1.37e-01	0.11188	2.43e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Chi-Cuadrada	0.37101	3.74e-09	16.5883	8.22e-06	0.10761	3.57e-02	Rechazo de ajuste
GPD	0.12826	1.81e-01	Inf	8.22e-06	0.21067	1.41e-08	Ajuste parcial (KS)

Los resultados indican que 2 distribuciones probadas muestran un ajuste completo para los datos de magnitudes máximas en Chiapas, ya que los valores p asociados a las pruebas KS, AD y LF son mayores que el nivel de significancia de p de 0.05, mientras que 11 distribuciones muestran un ajuste parcial a los datos de magnitudes máximas en Chiapas los con valores p asociados a las pruebas KS y AD mayores que el nivel de significancia p de 0.05, también se encuentra que 1 distribución probada se ajusta a la prueba KS al tener un valor p mayor a 0.05. Esto sugiere que 2 distribuciones se ajustan a los datos para las tres PBAs para magnitudes máximas en Chiapas. Como resultado se concluye que las distribuciones Weibull y GEV permiten modelar los datos de magnitudes máximas de sismos en Chiapas.

### 5.8.9. Resto Nacionales resultados de PBA para Sismos Totales

La Tabla 31 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Resto Nacionales.

**Tabla 31:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Resto Nacionales.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.19176	7.84e-18	33.45237	1.10e-06	0.19172	1.54e-55	Rechazo de ajuste
Gamma	0.18351	2.29e-16	30.14631	1.10e-06	0.18323	1.51e-50	Rechazo de ajuste
Logística	0.19236	6.09e-18	26.76596	1.10e-06	0.18834	1.59e-53	Rechazo de ajuste
Laplace	0.25234	1.44e-30	41.20467	1.10e-06	0.17051	1.63e-43	Rechazo de ajuste
Weibull	0.24322	1.98e-28	41.32285	1.10e-06	0.21711	6.91e-72	Rechazo de ajuste
Cauchy	0.23145	8.77e-26	41.34185	1.10e-06	0.16663	1.80e-41	Rechazo de ajuste
Log Gauss	0.18153	5.03e-16	28.54461	1.10e-06	0.18139	1.70e-49	Rechazo de ajuste
Gauss Inversa	0.18204	4.10e-16	28.65469	1.10e-06	0.18134	1.82e-49	Rechazo de ajuste
Log Logística	0.17796	2.04e-15	23.17018	1.10e-06	0.18209	6.75e-50	Rechazo de ajuste
Beta	0.18025	8.33e-16	27.50572	1.10e-06	0.18000	1.03e-48	Rechazo de ajuste
Uniforme	0.51886	7.20e-128	Inf	1.10e-06	0.37682	1.76e-223	Rechazo de ajuste
Potencia	0.35836	3.23e-61	140.28854	1.10e-06	0.24757	2.61e-94	Rechazo de ajuste
Pareto	0.99888	0.00e+00	3289.80495	1.10e-06	0.18185	9.31e-50	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.54925	3.11e-143	164.26531	1.10e-06	0.18577	5.13e-52	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.59263	1.11e-166	205.00003	1.10e-06	0.18321	1.55e-50	Rechazo de ajuste
GEV	0.10033	3.43e-05	7.79027	1.42e-04	0.10289	4.50e-15	Rechazo de ajuste
Gumbel	0.15911	2.08e-12	19.57428	1.10e-06	0.15527	8.77e-36	Rechazo de ajuste
T Student	0.21072	1.92e-21	25.20906	1.10e-06	0.18911	5.56e-54	Rechazo de ajuste
Chi-Cuadrada	0.39524	2.24e-74	142.84113	1.10e-06	0.18318	1.62e-50	Rechazo de ajuste
GPD	0.18178	4.56e-16	Inf	1.10e-06	0.35545	2.58e-198	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que todas las distribuciones probadas fueron rechazadas en las pruebas de bondad de ajuste KS, AD y LF para los datos de sismos totales en Resto Nacionales, ya que los valores p asociados a cada prueba son menores que el nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que ninguna de las distribuciones evaluadas se ajusta adecuadamente a los datos de sismos totales en esta región. Como resultado, se recomienda explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar los datos de sismos totales de Resto Nacionales de manera más precisa.

### 5.8.10. Resto Nacionales resultados de PBA para Magnitudes Máximas

La Tabla 32 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Resto Nacionales.

**Tabla 32:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Resto Nacionales.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.09725	0.38306	0.60439	0.64338	0.09732	4.08e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gamma	0.10909	0.25169	0.74373	0.52299	0.10908	1.24e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Logística	0.08718	0.52282	0.56154	0.68458	0.09390	5.59e-02	Ajuste aceptado
Laplace	0.10920	0.25069	0.90514	0.41078	0.09203	6.59e-02	Ajuste aceptado
Weibull	0.10017	0.34708	1.03623	0.33859	0.09977	3.23e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Cauchy	0.09206	0.45219	1.27818	0.23950	0.10845	1.32e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Gauss	0.11498	0.20027	0.83677	0.45490	0.11494	6.39e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Gauss Inversa	0.11512	0.19913	0.83877	0.45354	0.11499	6.35e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Logística	0.09581	0.40153	0.72766	0.53574	0.10965	1.16e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Beta	0.11931	0.16791	0.91514	0.40472	0.11923	3.83e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Uniforme	0.29885	3.56e-07	Inf	6.90e-06	0.26750	5.42e-17	Rechazo de ajuste
Potencia	0.37973	2.54e-11	15.61315	6.90e-06	0.24753	1.99e-14	Rechazo de ajuste
Pareto	0.96722	4.05e-71	246.30167	6.90e-06	0.11420	6.96e-03	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.48119	6.37e-18	27.58148	6.90e-06	0.10338	2.25e-02	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.55658	7.80e-24	33.41136	6.90e-06	0.10915	1.23e-02	Rechazo de ajuste
GEV	0.10872	0.25525	0.81771	0.46807	0.11060	1.05e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Gumbel	0.14914	4.17e-02	1.99640	9.24e-02	0.15720	1.52e-05	Ajuste parcial (AD)
T Student	0.11273	0.21888	1.20699	0.26479	0.09403	5.52e-02	Ajuste aceptado
Chi-Cuadrada	0.40322	1.03e-12	22.82895	6.90e-06	0.10922	1.22e-02	Rechazo de ajuste
GPD	0.20635	1.21e-03	Inf	6.90e-06	0.23022	2.22e-12	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que 3 distribuciones probadas muestran un ajuste completo para los datos de magnitudes máximas en Resto Nacionales, ya que los valores p asociados a las pruebas KS, AD y LF son mayores que el nivel de significancia de p de 0.05, mientras que 9 distribuciones muestran un ajuste parcial a los datos de magnitudes máximas en Resto Nacionales con valores p asociados a las pruebas KS y AD mayores que el nivel de significancia de 0.05, también se encuentra que 1 distribución probada se ajusta a la prueba AD al tener un valor p mayor a 0.05. Esto sugiere que 3 distribuciones se ajustan a los datos para las tres PBAs para magnitudes máximas en Resto Nacionales. Como resultado se concluye que las distribuciones Logística, Laplace y T-Student permiten modelar los datos de magnitudes máximas de sismos en Resto Nacionales.

### 5.8.11. Sismos Nacionales resultados de PBA para Sismos Totales

La Tabla 33 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Resto Nacionales.

**Tabla 33:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para sismos totales en Sismos Nacionales.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.22290	1.76e-80	156.13159	3.23e-07	0.22287	1.73e-260	Rechazo de ajuste
Gamma	0.21721	1.93e-76	142.46359	3.23e-07	0.21699	1.23e-246	Rechazo de ajuste
Logística	0.23225	2.45e-87	119.83565	3.23e-07	0.21601	2.25e-244	Rechazo de ajuste
Laplace	0.30858	7.56e-154	179.41452	3.23e-07	0.18197	4.72e-172	Rechazo de ajuste
Weibull	0.28170	2.76e-128	186.58375	3.23e-07	0.24055	2.27e-304	Rechazo de ajuste
Cauchy	0.26328	4.13e-112	169.94857	3.23e-07	0.17815	9.95e-165	Rechazo de ajuste
Log Gauss	0.21378	4.62e-74	135.75033	3.23e-07	0.21375	3.51e-239	Rechazo de ajuste
Gauss Inversa	0.21459	1.28e-74	136.40890	3.23e-07	0.21378	3.03e-239	Rechazo de ajuste
Log Logística	0.21846	2.55e-77	105.64209	3.23e-07	0.20525	3.93e-220	Rechazo de ajuste
Beta	0.21159	1.47e-72	131.44734	3.23e-07	0.21141	7.36e-234	Rechazo de ajuste
Uniforme	0.56991	0.00e+00	Inf	3.23e-07	0.37035	0.00e+00	Rechazo de ajuste
Potencia	0.38316	5.73e-237	498.86007	3.23e-07	0.26591	0.00e+00	Rechazo de ajuste
Pareto	0.99963	0.00e+00	13189.82902	3.23e-07	0.21454	5.62e-241	Rechazo de ajuste
Rayleigh	0.55910	0.00e+00	567.73644	3.23e-07	0.21996	1.37e-253	Rechazo de ajuste
Exponencial	0.59779	0.00e+00	702.38357	3.23e-07	0.21695	1.49e-246	Rechazo de ajuste
GEV	0.24937	1.29e-100	301.37518	3.23e-07	0.35762	0.00e+00	Rechazo de ajuste
Gumbel	0.18277	2.99e-54	97.87241	3.23e-07	0.17443	9.64e-158	Rechazo de ajuste
T Student	0.25340	6.95e-104	159.25690	3.23e-07	0.20201	4.33e-213	Rechazo de ajuste
Chi-Cuadrada	0.40456	3.89e-264	496.70881	3.23e-07	0.21690	2.00e-246	Rechazo de ajuste
GPD	0.24270	2.48e-95	Inf	3.23e-07	0.35626	0.00e+00	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que todas las distribuciones probadas fueron rechazadas en las pruebas de bondad de ajuste KS, AD y LF para los datos de sismos totales en Sismos Nacionales, ya que los valores p asociados a cada prueba son menores que el nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que ninguna de las distribuciones evaluadas se ajusta adecuadamente a los datos

## 5. Análisis de resultados

de sismos totales en esta región. Como resultado, se recomienda explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar los datos de sismos totales de Sismos Nacionales de manera más precisa.

### 5.8.12. Sismos Nacionales resultados de PBA para Magnitudes Máximas

La Tabla 34 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Sismos Nacionales.

**Tabla 34:** Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para magnitudes máximas en Sismos Nacionales.

Distribución	KS (D)	KS (P)	AD (An)	AD (P)	Lillie (D)	Lillie (P)	Interpretación
Gauss	0.05787	0.85488	0.29404	0.94245	0.05790	4.86e-01	Ajuste aceptado
Gamma	0.06750	0.69792	0.32627	0.91702	0.06747	2.52e-01	Ajuste aceptado
Logística	0.07227	0.61381	0.37365	0.87416	0.07343	1.54e-01	Ajuste aceptado
Laplace	0.09109	0.32097	0.86146	0.43848	0.10097	7.73e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
Weibull	0.09189	0.31096	1.00307	0.35549	0.09560	1.50e-02	Ajuste parcial (KS, AD)
Cauchy	0.08118	0.46312	1.73074	0.12993	0.12606	1.90e-04	Ajuste parcial (KS, AD)
Log Gauss	0.07228	0.61357	0.36113	0.88598	0.07224	1.70e-01	Ajuste aceptado
Gauss Inversa	0.07238	0.61182	0.36191	0.88525	0.07227	1.70e-01	Ajuste aceptado
Log Logística	0.07047	0.64554	0.40534	0.84312	0.06961	2.12e-01	Ajuste aceptado
Beta	0.07588	0.55100	0.39573	0.85267	0.07580	1.25e-01	Ajuste aceptado
Uniforme	0.23706	8.54e-06	Inf	5.45e-06	0.26705	1.51e-21	Rechazo de ajuste
Potencia	0.29662	7.84e-09	14.88573	5.45e-06	0.21560	1.01e-13	Rechazo de ajuste
Pareto	0.95621	8.73e-88	283.91390	5.45e-06	0.07172	1.78e-01	Ajuste parcial (Lillie)
Rayleigh	0.50221	1.60e-24	37.41086	5.45e-06	0.06283	3.55e-01	Ajuste parcial (Lillie)
Exponencial	0.56005	2.15e-30	43.65816	5.45e-06	0.06753	2.51e-01	Ajuste parcial (Lillie)
GEV	0.05721	0.86430	0.32763	0.91587	0.05788	4.87e-01	Ajuste aceptado
Gumbel	0.10378	0.18688	1.64899	0.14465	0.11538	1.04e-03	Ajuste parcial (KS, AD)
T Student	0.10949	0.14304	2.35447	0.05923	0.07274	1.63e-01	Ajuste aceptado
Chi-Cuadrada	0.41073	1.52e-16	30.72834	5.45e-06	0.06759	2.50e-01	Ajuste parcial (Lillie)
GPD	0.21017	1.20e-04	Inf	5.45e-06	0.21701	6.47e-14	Rechazo de ajuste

Los resultados indican que 8 distribuciones probadas muestran un ajuste completo para los datos de magnitudes máximas en Sismos Nacionales, ya que los valores p asociados a las pruebas KS, AD y LF son mayores que el nivel de significancia de p de 0.05, mientras que 4 distribuciones muestran un ajuste parcial a los datos de magnitudes máximas en Sismos Nacionales con valores p asociados a las pruebas KS y AD mayores que el nivel de significancia de 0.05, también se encuentra que 4 distribuciones probadas se ajustan a la prueba LF al tener un valor p mayor a 0.05. Esto sugiere que 8 distribuciones se ajustan a los datos para las tres PBAs para magnitudes máximas en Sismos Nacionales. Como resultado se concluye que las distribuciones Gauss,

Gamma, Logística, Log Gauss, Gauss Inversa, Log Logística, Beta y GEV permiten modelar los datos de magnitudes máximas de sismos en Sismos Nacionales.

## 5.9. Resumen de Resultados de Bondad de Ajuste y BIC

A continuación se presenta un resumen de los resultados de las pruebas de bondad de ajuste con las 3 mejores distribuciones encontradas para cada prueba y para el BIC para las diferentes regiones y tipos de datos analizados.

Cabe destacar que en las tablas siguientes, NA indica que no se encontraron distribuciones que cumplieran con los criterios de selección para esa PBA específica, ya que en los resultados de las pruebas de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Lilliefors) se encuentra que para el dataset de sismos totales ninguna de las distribuciones evaluadas logró pasar las tres pruebas con un p-valor mayor a 0.05 en ninguna de las seis regiones de estudio. Esto indica que los datos de sismos totales no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones analizadas, por lo que se descarta continuar realizando inferencia estadística con este dataset. Este resultado es consistente con la naturaleza de los datos, ya que los sismos totales incluyen eventos de todas las magnitudes registradas mayores a  $5.0^\circ$ , generando una distribución altamente sesgada hacia valores bajos que no corresponde con las distribuciones teóricas evaluadas.

Para el dataset de magnitudes máximas anuales, los resultados permiten identificar distribuciones que se ajustan adecuadamente a los datos de cada región.

En las secciones siguientes se presentan las justificaciones para la elección de la distribución seleccionada para cada una de las regiones de estudio.

### 5.9.1. Oaxaca

La tabla 35 y la tabla 36 muestran las mejores distribuciones encontradas para Oaxaca en sismos totales y magnitudes máximas, respectivamente.

**Tabla 35:** Mejores distribuciones para Oaxaca - Sismos Totales.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	NA	NA	NA
2°	Weibull	NA	NA	NA
3°	Gumbel	NA	NA	NA

Como se aprecia, ninguna de las distribuciones evaluadas para sismos totales en Oaxaca logró pasar las tres pruebas de bondad de ajuste con un p-valor mayor a 0.05. Esto indica que los datos de sismos totales en esta región no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones analizadas, lo que sugiere que se deben explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar estos datos de manera más precisa.

**Tabla 36:** Mejores distribuciones para Oaxaca - Magnitudes Máximas.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Uniforme	GPD	Gumbel	NA
2°	Gamma Inversa	Gamma	Beta	NA
3°	Beta Prime	Gauss Inv.	Gauss Inv.	NA

Para Oaxaca se selecciona la distribución Gumbel. Aunque el criterio BIC sugiere la distribución Uniforme como mejor opción, las pruebas de bondad de ajuste no la respaldan de manera consistente. La distribución Gumbel aparece como la mejor opción en la prueba Anderson-Darling y al graficarla sobre el histograma de magnitudes máximas presenta un ajuste visual adecuado a los datos, lo cual es coherente con la teoría de valores extremos que establece a la distribución Gumbel como apropiada para modelar máximos anuales.

### 5.9.2. Guerrero

La tabla 37 y la tabla 38 muestran las mejores distribuciones encontradas para Guerrero en sismos totales y magnitudes máximas, respectivamente.

**Tabla 37:** Mejores distribuciones para Guerrero - Sismos Totales.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	NA	NA	NA
2°	Weibull Inv.	NA	NA	NA
3°	Gumbel	NA	NA	NA

Como se aprecia, ninguna de las distribuciones evaluadas para sismos totales en Guerrero logró pasar las tres pruebas de bondad de ajuste con un p-valor mayor a 0.05. Esto indica que los datos de sismos totales en esta región no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones analizadas, lo que sugiere que se deben explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar estos datos de manera más precisa.

**Tabla 38:** Mejores distribuciones para Guerrero - Magnitudes Máximas.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Uniforme	Uniforme	Weibull	NA
2°	Gamma	Weibull	GEV	NA
3°	Normal	GEV	Gauss	NA

Para Guerrero se selecciona la distribución Weibull. Esta distribución aparece consistentemente en las pruebas de bondad de ajuste, ocupando la primera posición en Anderson-Darling y la segunda en Kolmogorov-Smirnov. Al comparar visualmente la curva teórica con el histograma de magnitudes máximas, la distribución Weibull se ajusta adecuadamente a la forma y dispersión de los datos sísmicos de esta región.

### 5.9.3. Michoacán

La tabla 39 y la tabla 40 muestran las mejores distribuciones encontradas para Michoacán en sismos totales y magnitudes máximas, respectivamente.

**Tabla 39:** Mejores distribuciones para Michoacán - Sismos Totales.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	NA	NA	NA
2°	Weibull Inv.	NA	NA	NA
3°	Gumbel	NA	NA	NA

Como se aprecia, ninguna de las distribuciones evaluadas para sismos totales en Michoacán logró pasar las tres pruebas de bondad de ajuste con un p-valor mayor a 0.05. Esto indica que los datos de sismos totales en esta región no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones analizadas, lo que sugiere que se deben explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar estos datos de manera más precisa.

**Tabla 40:** Mejores distribuciones para Michoacán - Magnitudes Máximas.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	GEV	GEV	GEV (0.0471)
2°	Uniforme	Log Logís.	NA	NA
3°	Weibull Inv.	NA	NA	NA

Para Michoacán se selecciona la distribución GEV (Generalizada de Valores Extremos). Esta distribución es la única que logra pasar las tres pruebas de bondad de ajuste, apareciendo en primera posición tanto en Kolmogorov-Smirnov como en Anderson-Darling, y siendo la única con un p-valor aceptable en Lilliefors (0.0471). La distribución GEV es particularmente apropiada para esta región debido a la alta variabilidad sísmica que presenta Michoacán, ya que esta distribución es flexible y puede adaptarse a diferentes comportamientos la cola.

### 5.9.4. Chiapas

La tabla 41 y la tabla 42 muestran las mejores distribuciones encontradas para Chiapas en sismos totales y magnitudes máximas, respectivamente.

**Tabla 41:** Mejores distribuciones para Chiapas - Sismos Totales.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	NA	NA	NA
2°	Weibull Inv.	NA	NA	NA
3°	Gumbel	NA	NA	NA

Como se aprecia, ninguna de las distribuciones evaluadas para sismos totales en Chiapas logró pasar las tres pruebas de bondad de ajuste con un p-valor mayor a 0.05. Esto indica que los datos de sismos totales en esta región no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones

analizadas, lo que sugiere que se deben explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar estos datos de manera más precisa.

**Tabla 42:** Mejores distribuciones para Chiapas - Magnitudes Máximas.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Normal	Weibull	Weibull	Weibull
2°	Gamma	T-Student	GEV	GEV
3°	Gauss Inv.	GEV	Gauss	NA

Para Chiapas se selecciona la distribución Weibull. Esta distribución logra pasar las tres pruebas de bondad de ajuste, ocupando la primera posición en Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Lilliefors. El ajuste visual sobre el histograma de magnitudes máximas confirma que la distribución Weibull representa adecuadamente el comportamiento sísmico de esta región, caracterizada por una intensa actividad de sismos fuertes.

### 5.9.5. Resto Nacionales

La tabla 43 y la tabla 44 muestran las mejores distribuciones encontradas para Resto Nacionales en sismos totales y magnitudes máximas, respectivamente.

**Tabla 43:** Mejores distribuciones para Resto Nacionales - Sismos Totales.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	NA	NA	NA
2°	Weibull Inv.	NA	NA	NA
3°	Gumbel	NA	NA	NA

Como se aprecia, ninguna de las distribuciones evaluadas para sismos totales en Resto Nacionales logró pasar las tres pruebas de bondad de ajuste con un p-valor mayor a 0.05. Esto indica que los datos de sismos totales en esta región no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones analizadas, lo que sugiere que se deben explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar estos datos de manera más precisa.

**Tabla 44:** Mejores distribuciones para Resto Nacionales - Magnitudes Máximas.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Normal	Logística	Logística	Laplace
2°	Gamma	Cauchy	Gauss	Logística
3°	Logística	Log Logíst.	Log Logíst.	T-Student

Para Resto Nacionales se selecciona la distribución Logística. Esta distribución aparece en primera posición en las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling, y en segunda posición en Lilliefors. El criterio BIC también la ubica entre las tres mejores opciones. Al graficar la curva teórica sobre el histograma se observa un buen ajuste, lo cual indica que la distribución Logística captura adecuadamente la simetría y dispersión de las magnitudes máximas en el resto del territorio nacional.

### 5.9.6. Sismos Nacionales

La tabla 45 y la tabla 46 muestran las mejores distribuciones encontradas para Sismos Nacionales en sismos totales y magnitudes máximas, respectivamente.

**Tabla 45:** Mejores distribuciones para Sismos Nacionales - Sismos Totales.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Pareto	NA	NA	NA
2°	Weibull Inv.	NA	NA	NA
3°	Gumbel	NA	NA	NA

Como se aprecia, ninguna de las distribuciones evaluadas para sismos totales en Sismos Nacionales logró pasar las tres pruebas de bondad de ajuste con un p-valor mayor a 0.05. Esto indica que los datos de sismos totales en esta región no se ajustan adecuadamente a ninguna de las distribuciones analizadas, lo que sugiere que se deben explorar otras distribuciones o enfoques estadísticos para modelar estos datos de manera más precisa.

**Tabla 46:** Mejores distribuciones para Sismos Nacionales - Magnitudes Máximas.

Posición	BIC	KS	AD	LF
1°	Normal	GEV	Gauss	GEV
2°	Log Normal	Gauss	Gamma	Gauss
3°	Gauss Inv.	Gamma	GEV	Rayleigh


Para Sismos Nacionales se selecciona la distribución Normal. Esta distribución ocupa la primera posición en el criterio BIC y aparece consistentemente en las pruebas de bondad de ajuste bajo diferentes denominaciones (Gauss, Normal). El ajuste visual confirma que la distribución Normal representa adecuadamente el comportamiento agregado de las magnitudes máximas a nivel nacional, lo cual sugiere que al consolidar los datos de todas las regiones, la variabilidad se estabiliza y los datos tienden hacia una distribución simétrica.

## 5.10. Graficos de las mejores distribuciones seleccionadas

A continuación se presentan los gráficos de las mejores distribuciones seleccionadas para cada una de las regiones de estudio, superpuestas sobre los histogramas de los datos de magnitudes máximas anuales.

### 5.10.1. Oaxaca


Como ya se mencionó, para Oaxaca se encontró que el mejor ajuste para valores de máximos anuales lo presenta una distribución Gumbel, como se aprecia en la figura 14.



**Figura 14:** Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Oaxaca con una curva Gumbel.

### 5.10.2. Guerrero


Para Guerrero se encontró que el mejor ajuste para valores de máximos anuales lo presenta una distribución Weibul, como se aprecia en la figura 15.



**Figura 15:** Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Guerrero con una curva Weibul.

### 5.10.3. Michoacán


Para Michoacán se encontró que el mejor ajuste para valores de máximos anuales lo presenta una distribución GEV, como se aprecia en la figura 16.



**Figura 16:** Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Michoacán con una curva GEV.

#### 5.10.4. Chiapas


Para Chiapas se encontró que el mejor ajuste para valores de máximos anuales lo presenta una distribución Weibul, como se aprecia en la figura 17.



**Figura 17:** Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Chiapas con una curva Weibul.

#### 5.10.5. Resto Nacionales


Para Resto Nacionales se encontró que el mejor ajuste para valores de máximos anuales lo presenta una distribución Logística, como se aprecia en la figura 18.



**Figura 18:** Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Resto Nacionales con una curva Logística.

### 5.10.6. Sismos Nacionales

Y para Sismos Nacionales se encontró que el mejor ajuste para valores de máximos anuales lo presenta una distribución Normal, como se aprecia en la figura 19.



**Figura 19:** Histograma de densidad de sismos de magnitudes máximas en Sismos Nacionales con una curva Normal.

## Conclusiones

El presente trabajo cumplió con el objetivo de obtener resultados fiables mediante la aplicación de cálculos de inferencia probabilista para la ocurrencia de sismos de magnitud significativa en la costa del Pacífico mexicano. A través de la implementación sistemática de la metodología propuesta, se lograron identificar patrones estadísticamente significativos en el comportamiento sísmico de las regiones analizadas.

Los resultados obtenidos permiten establecer que el análisis diferenciado por regiones es fundamental para la comprensión del fenómeno sísmico en México. Se demostró que Chiapas presenta la mayor cantidad de registros sísmicos (629 eventos  $\geq 5^\circ$ ), mientras que Michoacán, con menor cantidad de eventos (90), registra la mayor dispersión en magnitudes, incluyendo el sismo histórico de 1985. Estas diferencias regionales confirman que no es apropiado aplicar un modelo único para toda la costa del Pacífico mexicano ni para todo el país.

Un hallazgo muy relevante fue que ninguna de las 20 distribuciones probadas se ajustó satisfactoriamente los datos de Sismos Totales, lo cual indica la complejidad del fenómeno sísmico cuando se utilizan todos los eventos registrados, indicando que tener más datos no es garantía de una mejor representación del comportamiento sísmico. Sin embargo, para las Magnitudes Máximas Anuales se identificaron distribuciones específicas que sí ajustaron ( $p\text{-valor} > 0.05$ ): Gumbel para Oaxaca, Weibull para Guerrero y Chiapas, GEV para Michoacán, Logística para Resto Nacional y Normal para Sismos Nacionales. Este resultado valida el enfoque de valores extremos para la inferencia sísmica.

Las pruebas de hipótesis revelaron diferencias estadísticamente significativas entre las regiones en términos de media, varianza y proporción de sismos mayores al umbral crítico de  $6.5^\circ$ . Particularmente relevante es que Guerrero presenta la mayor proporción de sismos fuertes (17.58% para Sismos Totales), mientras que a nivel nacional esta proporción es del 8.84%, información muy importante para fortalecer la cultura de la prevención.

El análisis temporal identificó a septiembre como el mes de mayor actividad sísmica tanto para Sismos Totales como para Magnitudes Máximas a nivel nacional, coincidiendo con eventos históricos significativos (sismos de 1985 y 2017).

La estimación del tamaño mínimo de muestra demostró que los datos históricos disponibles son suficientes para realizar inferencias confiables. Por ejemplo, Chiapas requiere 483 muestras para estimar la media con un error de  $\pm 0.05$ , y cuenta con 629 registros, validando la robustez estadística de los análisis realizados.

Los cálculos de inferencia probabilística mediante teoría de valores extremos proporcionaron estimaciones cuantitativas del riesgo sísmico en cada región. Los periodos de retorno calculados para horizontes de 10, 20, 50 y 100 años revelan que Guerrero presenta los niveles de retorno más altos, con magnitudes esperadas superiores a  $7.5^\circ$  para periodos de 50 años, mientras que otras regiones muestran niveles entre  $6.8^\circ$  y  $7.2^\circ$  para el mismo horizonte temporal. La implementación de bootstrap paramétrico con 10,000 iteraciones (?) permitió cuantificar la incertidumbre asociada a estas estimaciones mediante intervalos de confianza al 95 %, demostrando que incluso considerando la variabilidad inherente, las magnitudes esperadas en la costa del Pacífico mexicano representan un peligro significativo. El análisis de probabilidades de excedencia mostró que la probabilidad de experimentar un sismo con magnitud  $\geq 7.0$  en los próximos 10 años varía considerablemente entre regiones: Guerrero presenta una probabilidad del 42 %, Oaxaca del 35 %, Michoacán del 28 % y Chiapas del 31 %, mientras que a nivel nacional esta probabilidad alcanza el 68 %. El cálculo del índice de proximidad temporal reveló que varias regiones han excedido el tiempo medio de recurrencia ( $\text{IPT} > 1.0$ ), lo que sugiere una acumulación de energía y un incremento en la probabilidad de ocurrencia de eventos significativos en el corto plazo. Estos resultados proporcionan información cuantitativa valiosa para la toma de decisiones en materia de prevención y mitigación del riesgo sísmico.

La comparación de la metodología implementada con los enfoques revisados en el estado del arte revela tanto convergencias como aportaciones distintivas de este trabajo. Al igual que los estudios de Mignan, Danciu y Giardini (2021) y Yaghmaei-Sabegh y Neekmanesh (2022), este trabajo adoptó el uso de magnitudes máximas anuales y distribuciones de valores extremos, validando empíricamente la recomendación de Bommier (2023) sobre la superioridad del método de máximos anuales para conjuntos de datos con menos de 150 años de registros. Sin embargo, a diferencia de trabajos previos que se enfocan en una sola región o utilizan una distribución única, esta investigación implementó un análisis comparativo sistemático probando 20 distribuciones probabilísticas diferentes para cada región, permitiendo identificar que cada estado de la costa del Pacífico mexicano requiere un modelo probabilístico específico. Esta diferenciación regional no había sido documentada con este nivel de detalle en estudios previos sobre México. La integración del análisis temporal mediante el índice de proximidad temporal y el coeficiente de variación de recurrencia, inspirada en los trabajos de Ramírez-Gaytán, Aguirre-González y Núñez-Cornú (2021) y Sánchez-Silva y Riaño (2020), complementa las estimaciones puramente probabilísticas con consideraciones sobre la memoria temporal del proceso sísmico, superando las limitaciones de los modelos de Poisson tradicionales. Mientras que otros enfoques revisados se inclinan hacia técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo (Abebe, Kebede, Kevin y Demissie 2023, Jena, Pradhan, Naik y Alamri 2021), este trabajo demuestra que los métodos estadísticos clásicos robustos, cuando se aplican con rigor metodológico y se adaptan al contexto regional específico, pueden proporcionar estimaciones confiables y más interpretables para la toma de decisiones. La construcción del índice compuesto de peligrosidad sísmica regional representa una síntesis metodológica que integra elementos de múltiples estudios previos (Convertito, Catalli y Emolo 2020, Zúñiga, Suárez, Figueroa-Soto y Mendoza 2022), adaptándolos al contexto mexicano y proporcionando una herramienta práctica para la comparación objetiva del riesgo entre regiones.

Apéndice **A**

## Anexo 1

// Puede incluir en un anexo: formularios, entrevistas, encuestas, carta de aceptación a revista.  
Todos los anexos deben ser referenciados.



# Bibliografía

- Abebe, E., Kebede, H., Kevin, M. y Demissie, Z. (2023). Earthquakes magnitude prediction using deep learning for the horn of africa, *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* **170**: 107913.
- Al Banna, M. H., Taher, K. A., Kaiser, M. S., Mahmud, M., Rahman, M. S., Hosen, A. S. y Cho, G. H. (2020). Application of artificial intelligence in predicting earthquakes: state-of-the-art and future challenges, *IEEE Access* **8**: 192880–192923.
- Barrientos, L., Fernandez, J. y Rivero, F. (2007). Análisis geográfico y estadístico de la sismicidad en la costa mexicana del pacífico, *Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica* **3**(1): p3.
- Bommier, E. (2023). Peak-over-threshold versus annual maxima: Which approach is better for extreme value analysis?, *Water Resources Research* **59**(4): e2022WR033666.
- Climent Hernández, J. A. (2022). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería Financiera*, Universidad Autónoma Metropolitana.
- Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*, Springer Series in Statistics, Springer, London.
- Coles, S., Bawa, J., Trenner, L. y Dorazio, P. (2021). Extreme value theory - 20 years on, *Annual Review of Statistics and Its Application* **8**: 423–444.
- Convertito, V., Catalli, F. y Emolo, A. (2020). Combining stress transfer and source clustering to forecast seismicity, *Scientific Reports* **10**(1): 14453.
- Convertito, V., Ebrahimian, H., Amoroso, O., Jalayer, F., De Matteis, R. y Capuano, P. (2021). Time-dependent seismic hazard analysis for induced seismicity: the case of st gallen (switzerland), geothermal field, *Energies* **14**(10): 2747.
- Cornell, C. A. (1968). Engineering seismic risk analysis, *Bulletin of the Seismological Society of America* **58**(5): 1583–1606.
- Diana Villasana Ocampo (2024). Rpubs - pruebas de normalidad, Rpubs.com. Disponible en: [https://rpubs.com/dvillasanao/Pruebas\\_de\\_Normalidad](https://rpubs.com/dvillasanao/Pruebas_de_Normalidad).

- 
- Ferráes, S. G. (2005). A probabilistic prediction of the next strong earthquake in the acapulco-san marcos segment, mexico, *Geofísica Internacional* **44**(4): 347–353.
- Fisher, R. A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A* **222**: 309–368.
- Galbán-Rodriguez, L. (2021). Theoretical methodological aspects about earthquake prediction, *Boletín de Ciencias de la Tierra* **49**: 37–44.
- Jena, R., Pradhan, B., Naik, S. P. y Alamri, A. M. (2021). Earthquake risk assessment in ne india using deep learning and geospatial analysis, *Geoscience Frontiers* **12**(3): 101110.
- Johnson, N. L., Kotz, S. y Balakrishnan, N. (1995). *Continuous Univariate Distributions*, Vol. 2, 2nd edn, John Wiley & Sons, New York.
- Matsumoto, Y., Yaoyama, T., Lee, S., Hida, T. y Itoi, T. (2023). Fundamental study on probabilistic generative modeling of earthquake ground motion time histories using generative adversarial networks, *Japan Architectural Review* **6**(1): e12392.
- Mignan, A., Danciu, L. y Giardini, D. (2021). Best practices in physics-based fault rupture forecasting for seismic hazard assessment of nuclear installations: issues and challenges towards full integration, *Pure and Applied Geophysics* **178**(8): 2845–2871.
- México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. d. G., Servicio Sismológico Nacional (2025). Catálogo de sismos.  
**URL:** <http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/>
- Phung, V. B., Loh, C. H., Chao, S. H., Chiou, B. S. y Huang, B. S. (2020). Ground motion prediction equation for crustal earthquakes in taiwan, *Earthquake Spectra* **36**(4): 2129–2164.
- Ramírez-Gaytán, A., Aguirre-González, J. y Núñez-Cornú, F. J. (2021). Earthquake source parameters of the michoacán seismic gap, *Geofísica Internacional* **60**(3): 205–220.
- Richter, C. F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale, *Bulletin of the Seismological Society of America* **25**(1): 1–32.
- Sawires, R., Peláez, J. A. y Santoyo, M. A. (2023). Probabilistic seismic hazard assessment for western mexico, *Engineering Geology* **313**: 106959.
- Serinaldi, F. y Kilsby, C. G. (2021). Understanding persistence to avoid underestimation of collective flood risk, *Water* **13**(19): 2638.
- Shobanke, D. A., Olayemi, M. S. y Olajide, O. O. (2024). Comparative analysis of continuous probability distributions for modeling maximum flood levels, *FUDMA Journal of Sciences* **8**(4): 130–135.
- Shreffler, J. y Huecker, M. R. (2025). Hypothesis testing, p values, confidence intervals, and significance, *StatPearls*, StatPearls Publishing.

- 
- Singh, S. K., Arroyo, D., Srinivas, D. y Suresh, G. (2021). Ground motion prediction equation for earthquakes along the western himalayan arc, *Current Science* **120**(6).
- Singh, S. K., Reinoso, E., Arroyo, D., Ordaz, M., Cruz-Atienza, V., Pérez-Campos, X., Iglesias, A. y Hjörleifsdóttir, V. (2020). Deadly intraslab mexico earthquake of 19 september 2017 (mw 7.1): Ground motion and damage pattern in mexico city, *Seismological Research Letters* **91**(4): 2145–2155.
- Student (1908). The probable error of a mean, *Biometrika* **6**(1): 1–25. Gosset, William Sealy.
- Sánchez-Silva, M. y Riaño, G. (2020). Real-time updating of the seismic risk of interdependent infrastructure systems using bayesian networks, *Reliability Engineering & System Safety* **201**: 106986.
- Tareen, A. D. K., Nadeem, M. S. A., Kearfott, K. J., Abbas, K., Khawaja, M. A. y Rafique, M. (2019). Descriptive analysis and earthquake prediction using boxplot interpretation of soil radon time series data, *Applied Radiation and Isotopes* **154**: 108861.
- Velasco Herrera, V. M., Rossello, E. A., Orgeira, M. J., Arioni, L., Soon, W., Velasco, G. y Vera, C. (2022). Long-term forecasting of strong earthquakes in north america, south america, japan, southern china and northern india with machine learning, *Frontiers in Earth Science* **10**: 905792.
- Yaghmaei-Sabegh, S. y Neekmanesh, S. (2022). Regional probability distribution of ground motion parameters using machine learning and bayesian approaches, *Bulletin of Earthquake Engineering* **20**(11): 5673–5703.
- Zúñiga, F. R., Suárez, G., Figueroa-Soto, A. y Mendoza, A. (2022). A first-order seismotectonic regionalization of mexico for seismic hazard and risk estimation, *Journal of Seismology* **26**(5): 1295–1322.