

**INDICI DE RECOLTARE PRIN LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE-RĂRIRE
(ÎN PROCENTE FAȚĂ DE VOLUMUL ANTERIOR INTERVENȚIILOR)
PENTRU ARBORELE PARCURSE SISTEMATIC CU ASEMENEA LUCRĂRI ȘI AVÂND
INDICI DE DENSITATE DE 0.9-1.0***

Formații și grupe de formații forestiere	Țelul de prod.	Vârsta arborilor, ani									
		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	peste 100
Molidișuri	a		18	13	11	10	8	7	6	6	5
Brădet	a		17	13	10	9	8	7	7	6	5
Amestecuri de fag cu rășinoase	a		16	12	10	9	8	7	7	6	5
Făgete	a		15	15	13	10	9	9	8	7	5
	b		16	17	15	13	12	11	10	8	6
Goruneto-făgete și șleauri de deal cu gorun	a		14	12	9	9	8	7	6	5	
	b		16	14	10	10	9	8	6	5	4
Gorunete și stejărete (inclusiv de stejar brumăriu și stejar pufos)	a		14	12	10	8	7	6	5	4	
	b		15	13	11	9	7	6	5	4	4
Șleauri de câmpie, șleauri de luncă, șleauri de deal cu stejar	a		14	12	10	8	7	6	5	4	
	b		15	13	11	9	7	6	5	4	4
Teișuri	a, b		17	13	1	10	7	6			
Cerete, gârnițete și amestecuri de cer și gârniță	a		13	12	9	7	6	5	4	3	
Salcâmete	a	15	10								
Aninișuri	a	12	12	10							
Arborete de salcie	a	16	12								
Arborete de plop alb și plop negru	a	16	7								
Culturi de plop euramericani (selecționați)	a, b	25-50									
Pinete și laricete	a	18	15	12	10						
Arborete de douglas verde	a		16	12							

*Pentru arborile cu indici de densitate de peste 1.0, indicii de recoltare se majorează cu 5-15%.

Pentru arborile cu indici de densitate medii de 0.8 se programează rărituri dacă, pentru următorul deceniu, se întrevede majorarea acestuia la cel puțin 0.9; în acest caz indicii de recoltare se diminuează cu 20-40%. Împlinirea consistenței este puțin probabilă la arborile înaintate în vârstă, precum și la cele afectate de vânt, zăpadă și fenomene de uscare anormală.

*Țel de producție: a-lemn pentru cherestea; b-lemn pentru furnire și derulaj.