

TASCA 2 VIBE CODING – LLIURA NIVELL BÀSIC

MAR LLORET I ESQUERDO

Per a completar aquesta tasca, he tractat de fer el recurs un poc més **visual i interactiu**. Encara hi ha moltes parts a millorar però aquest seria el meu intent. A les **captures de davall del tot** es veu l'intent de correcte/incorrecte.

Ho he plantejat com a **resposta** adaptativa a l'hora de buscar una conducta alternativa a un comportament que pot ser de risc per a una persona adolescent.

The screenshot displays the 'MindMap Youth' web application. The browser address bar shows 'marorientadora.github.io/PROJECTE-1-VIBE-C/'. The application has a navigation bar with 'Inici', 'Conductes', 'Recursos', and 'Ajuda'. The main content area features a section titled 'Prevenió i suport' with the heading 'Mapa de recursos i conductes alternatives per a adolescents'. Below this, a paragraph explains the map's purpose based on WHO's perspective on mental health and suicide prevention. To the right, a vertical flowchart lists four steps: 1. Pausa (Stop and move away from the risk), 2. Calma (Calm down, breathe slowly and drink water), 3. Contacte (Talk to someone you trust), and 4. Alternativa (Do an activity that relaxes you). Below the flowchart, an 'Important' note advises calling 112 or emergency services if there is an immediate risk of self-harm or suicide, and mentions contacting the 024 line or a mental health service in Spain. The bottom section, 'Conductes alternatives més útils', lists four categories: 'Talls superficials' (with an 'Ocultar' button), 'Cremats petits' (with a 'Mostrar' button), 'Arrencar-se el pèl' (with a 'Mostrar' button), and 'Pensaments repetitius o sobrecàrrega emocional' (with a 'Mostrar' button). Each category has a list of alternative behaviors or reminders.

marorientadora.github.io/PROJECTE-1-VIBE-C/

MindMap Youth

Inici Conductes Recursos Ajuda

Prevenió i suport

Mapa de recursos i conductes alternatives per a adolescents

Segons la perspectiva de l'OMS sobre salut mental i prevenció del suïcidi, aquest mapa proposa passos senzills, segurs i útils quan apareix un impuls o un estat de dolor emocional intens.

- 1. Pausa**
Atura't i allunya't del risc.
- 2. Calma**
Respira lentament i beu aigua.
- 3. Contacte**
Parla amb algú de confiança.
- 4. Alternativa**
Fes una activitat que et relaxi.

Important: si hi ha risc immediat de fer-se mal o de suïcidi, truqueu al 112 o aneu a urgències. Si esteu a Espanya, també podeu contactar amb la línia 024 o amb un servei de salut mental de referència.

Conductes alternatives més útils

A continuació es mostren algunes conductes autolesives que poden aparèixer amb més freqüència entre adolescents, juntament amb alternatives adaptatives i segures que poden ajudar a reduir la intensitat del dolor o de l'impuls.

Talls superficials

Ocultar

- Alternativa: pressionar una pilota o una manta amb força.
- Alternativa: fer estiraments o caminar ràpidament durant 10 minuts.
- Alternativa: escriure el que es sent en un full o en una aplicació de notes.
- Recordatori: si hi ha risc immediat, demanar ajuda professional.

Cremats petits

Mostrar

Arrencar-se el pèl

Mostrar

Pensaments repetitius o sobrecàrrega emocional

Mostrar

Tasca de reflexió: conductes de risc i alternatives de resposta

Objectiu: reconèixer conductes de risc i proposar alternatives segures, adaptatives i útils.

Instruccions:

1. Llegeix cada situació i identifica quina conducta de risc pot aparèixer.
2. Proposa almenys dues alternatives de resposta segures.
3. Indica qui podria donar suport en aquell moment.

Conductes funcionals: tria la resposta correcta

Fes clic sobre cada conducta i després tria l'alternativa funcional correcta.

 Talls superficials

 Cremats petits

 Arrencar-se el pèl

 Pensaments repetitius

 Ràbia o frustració

 Sentiment de soledat

 Alcohol o drogues

 Conductes alimentàries extremes

 Situacions de risc

Talls superficials

Quina alternativa funcional seria millor en aquest cas?

Pressionar una pilota o una manta amb força

Fer servir un objecte tallant

Ignorar el que sents

INTENT DE TASCA INTERACTIVA:

Ací pot observar-se la diferència entre el que seria la resposta correcta i la incorrecta.

Conductes funcionals: tria la resposta correcta

Fes clic sobre cada conducta i després tria l'alternativa funcional correcta.

 Talls superficials

 Cremats petits

 Arrencar-se el pèl

 Pensaments repetitius

 Ràbia o frustració

 Sentiment de soledat

 Alcohol o drogues

 Conductes alimentàries extremes

 Situacions de risc

Pensaments repetitius

Quina alternativa ajuda a reduir la sobrecàrrega emocional?

Fer respiracions 4-4-6 i escriure un missatge a algú de confiança

Repetir el pensament una i altra vegada

Evitar parlar amb ningú

Correcte! Aquesta és una conducta funcional i segura.

Conductes funcionals: tria la resposta correcta

Fes clic sobre cada conducta i després tria l'alternativa funcional correcta.

- Talls superficials
- Cremats petits
- Arrencar-se el pèl
- Pensaments repetitius
- Ràbia o frustració
- Sentiment de soledat
- Alcohol o drogues
- Conductes alimentàries extremes
- Situacions de risc

Pensaments repetitius

Quina alternativa ajuda a reduir la sobrecàrrega emocional?

Fer respiracions 4-4-6 i escriure un missatge a algú de confiança

Repetir el pensament una i altra vegada

Evitar parlar amb ningú

No és l'opció correcta. Prova amb una resposta més funcional i segura.