

TASCA 1 VIBE CODING – LLIURA NIVELL BÀSIC


MAR LLORET I ESQUERDO

TEXT DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE

“Crea un mapa visual de recursos i conductes alternatives als comportaments autolesius més habituals entre adolescents amb un enfocament preventiu i sensible.”

Posteriorment, he anat provant amb el Visual Code i he especificat alguns dels comportaments més habituals per tractar d’elaborar un recurs més senzill i concret.

Aquest ha sigut el resultat fins ara:



⚠ Important: si hi ha risc immediat de fer-se mal o de suïcidi, truqueu al 112 o aneu a urgències. Si esteu a Espanya, també podeu contactar amb la línia 024 o amb un servei de salut mental de referència.

Conductes alternatives més útils

A continuació es mostren algunes conductes autolesives que poden aparèixer amb més freqüència entre adolescents, juntament amb alternatives adaptatives i segures que poden ajudar a reduir la intensitat del dolor o de l'impuls.

Talls superficials

- Alternativa: pressionar una pilota o una manta amb força.
- Alternativa: fer estiraments o caminar ràpidament durant 10 minuts.
- Alternativa: escriure el que es sent en un full o en una aplicació de notes.
- Recordatori: si hi ha risc immediat, demanar ajuda professional.

Cremats petits

- Alternativa: col·locar una compressa tèbia o una roba suau sobre la zona de tensió.
- Alternativa: posar-se una peça de roba o una manta calenta com a sensació de confort.
- Alternativa: fer respiracions lentes i comptar fins a 100 per allunyar-se de l'impuls.
- Recordatori: si el dolor o la urgència persisteixen, contactar amb algú de confiança.

Arrencar-se el pèl

- Alternativa: subjectar una goma elàstica o un objecte de textura suau amb la mà.
- Alternativa: fer servir una eina de relaxació com ara un anell de stress o una pilota antiestrès.
- Alternativa: canviar de lloc i anar a un espai amb gent o amb llum natural.
- Recordatori: la sensació de control pot venir de la pausa i la connexió social.

Pensaments repetitius o sobrecàrrega emocional

- Alternativa: fer respiracions 4-4-6 durant 2 minuts.
- Alternativa: parlar amb una persona de confiança o enviar un missatge curt.
- Alternativa: fer una activitat creativa com dibuixar, escoltar música o escriure.
- Recordatori: si el pensament és persistent, demanar suport professional és una decisió valent.

Autoemplenable de suport ràpid

Indica quin impuls o conducta de risc vols canviar i la pàgina et suggerirà una alternativa segura i adaptativa.

Quina conducta de risc vols substituir?

Talls superficials

Com et sents ara?

Ex. enfadat/a, aclaparat/a, molt tens

Suggerir alternativa

Tria una conducta i prem el botó per veure una proposta segura.

Recursos de suport

Família i amistats

Persones que escolten, no jutgen i poden acompanyar en moments de crisi.

Professorat o tutor/a

És important parlar amb algú del centre educatiu si hi ha senyals de desbordament.

Psicòleg o psiquiatre

Un professional pot ajudar a identificar causes, estratègies i suport continu.

Serveis d'emergència

112, urgències o la línia 024 si es viu a Espanya i hi ha risc immediat.

Ministerio de Sanidad
Informació sobre salut mental i prevenció

Fundación Salud Mental España
Recursos i orientació per a joves i famílies

Línia 024
Atenció psicològica i orientació emocional

Si és una situació urgent:

- Truca al 112 si hi ha risc immediat.
- Acudeix a urgències o demana ajuda a una persona adulta de confiança.
- Si estàs a Espanya, també pots contactar amb la línia 024.

No cal afrontar-ho tot sol/a. Demanar ajuda és una manera de cuidar-se i de reprendre el control.