

# Formale Sprachen und Automaten

## Abgabe 1

Marcel Ebert, Pascal Dettmers, Claude (???)  
TU Berlin

November 15, 2019

### Aufgabe 1. Mengengrundlagen

- a. Gib die mit gelb gekennzeichnete Menge mit nur zwei Mengenoperationen an:

$$M = (A \setminus B) \triangle C$$

■

- b. Berechne:  $((\{1, 3\} \times \{1\})) \cup \{1, 3, 1\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\}$

$$\begin{aligned} M &= ((\{1, 3\} \times \{1\})) \cup \{1, 3, 1\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\} \\ &\stackrel{\text{Def.} \times}{=} (\{(1, 1), (3, 1)\} \cup \{1, 3, 1\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\}) \\ &\stackrel{\text{Def.} \cup}{=} (\{(1, 1), (3, 1), 1, 3\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\}) \\ &\stackrel{\text{Def.} \setminus}{=} \{(1, 1), (3, 1), 3\} \end{aligned}$$

■

- c. Berechne:  $(\{\emptyset, 2\} \cup \{\{\emptyset\}\}) \cap \mathcal{P}(\{\{\emptyset\}, 2\})$

$$\begin{aligned}
M &= (\{\emptyset, 2\} \cup \{\{\emptyset\}\}) \cap \mathcal{P}(\{\{\emptyset\}, 2\}) \\
&\stackrel{\text{Def.}\cup}{=} \{\emptyset, \{\emptyset\}, 2\} \cap \mathcal{P}(\{\{\emptyset\}, 2\}) \\
&\stackrel{\text{Def.}\mathcal{P}}{=} \{\emptyset, \{\emptyset\}, 2\} \cap \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}, \{2\}, \{\{\emptyset\}, 2\}\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\cap}{=} \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

■

## Aufgabe 2. Mengenbeweise

**a.** Beweise oder widerlege: Für alle Mengen A und B gilt:  $(A \cap B) \cap A = B \cap A$

Wir beweisen die Aussage. Seien A, B beliebige Mengen.

$$\begin{aligned}
& (A \cap B) \cap A = B \cap A \\
& \stackrel{\text{Def.}\cap}{=} \{x \mid x \in \{y \mid y \in A \wedge y \in B\} \wedge x \in A\} \\
& \stackrel{\text{Def.}\text{Komm.}}{=} \{x \mid x \in \{y \mid y \in B \wedge y \in A\} \wedge x \in A\} \\
& \stackrel{\text{Def.}\in}{=} \{x \mid (x \in B \wedge x \in A) \wedge x \in A\} \\
& \stackrel{\text{Def.}\text{Assoz}}{=} \{x \mid x \in B \wedge (x \in A \wedge x \in A)\} \\
& \stackrel{\text{Def.}\text{Idem.und}}{=} \{x \mid x \in B \wedge x \in A\} \\
& \stackrel{\text{Def.}\cap}{=} B \cap A
\end{aligned}$$

Somit gilt die Aussage.

■

**b.** Beweise oder widerlege: Für alle Mengen A und B gilt:  $A \cup (A \setminus B) = A$

Wir beweisen die Aussage. Seien A, B beliebige Mengen.

$$\begin{aligned}
 & A \cup (A \setminus B) = A \\
 \stackrel{\text{Def. } \cup}{=} & \{x \mid x \in A \vee x \in (A \setminus B)\} \\
 \stackrel{\text{Def. } \setminus}{=} & \{x \mid x \in A \vee x \in \{y \mid y \in A \wedge y \notin B\}\} \\
 \stackrel{\text{Def. } \in}{=} & \{x \mid x \in A \vee (x \in A \wedge x \notin B)\} \\
 \stackrel{\text{Def. Distri.}}{=} & \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \wedge x \in A)\} \\
 \stackrel{\text{Def. Idem. oder}}{=} & \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge x \in A\} \\
 \stackrel{\text{Def. Absorp.}}{=} & \{x \mid x \in A\} \\
 \stackrel{\text{Def. } \in}{=} & A
 \end{aligned}$$

Somit gilt die Aussage.

■

**c.** Beweise oder widerlege: Für alle Mengen A und B gilt:  $(B \cup A) \cap B = A \cap B$

Wir widerlegen die Aussage durch Angabe eines geeigneten Gegenbeispiels.

Wir wählen  $A \triangleq \{1, 2\}$ ,  $B \triangleq \{2, 3\}$ .

$$\begin{aligned}
& (B \cup A) \cap B \\
= & (\{2, 3\} \cup \{1, 2\}) \cap \{2, 3\} \\
\stackrel{\text{Def. } \cup}{=} & \{1, 2, 3\} \cap \{2, 3\} \\
= & \{2, 3\} \\
\neq & \{2\} \\
\stackrel{\text{Def. } \cap}{=} & \{1, 2\} \cap \{2, 3\} \\
= & A \cap B
\end{aligned}$$

Somit gilt die Aussage nicht.

■

### Aufgabe 3. Wahrheitstabellen

**a.** Beweise oder widerlege nur mit Hilfe einer Wahrheitstabelle oder eines (Gegen-) Beispiels, dass  $\neg q \wedge ((r \leftrightarrow (r \rightarrow \perp)) \vee q)$  kontradiktorisch ist.

q	r	$\neg$	q	$\bigwedge$	$((r \leftrightarrow (r \rightarrow \perp)) \vee q)$
F	F	W	F	F	F
F	W	W	F	F	F
W	F	F	W	F	W
W	W	F	W	F	W

Der Hauptjunktorkomplex wird immer zu F ausgewertet. Also ist die Formel kontradiktorisch.

■

**b.** Beweise oder widerlege nur mit Hilfe einer Wahrheitstabelle oder eines (Gegen-) Beispiels, dass  $((s \wedge \neg q) \rightarrow r) \vee r \equiv r \vee (s \rightarrow q)$  kontradiktorisch ist.

■

#### Aufgabe 4. Logische Äquivalenz

- a. Gib an: eine Formel, die logisch äquivalent zu  $\perp$  ist und nur  $\neg$  und  $\vee$  als Operatoren enthält.

$$\neg(q \vee \neg q) \equiv \perp$$

■

- b. Beweise nur mit Hilfe von Äquivalenzumformungen, dass  $q \wedge (r \rightarrow s)$  und  $\neg(r \vee \neg q) \vee (s \wedge q)$  logisch äquivalent sind.

$$q \wedge (r \rightarrow s)$$

$$\stackrel{\text{Def. Impl.}}{=} q \wedge (\neg r \vee s)$$

$$\stackrel{\text{Def. Distr. von } \wedge \text{ ueber } \vee}{=} (\neg r \wedge q) \vee (s \wedge q)$$

$$\stackrel{\text{Def. DeMorgan II}}{=} \neg(r \vee \neg q) \vee (s \wedge q)$$

■

#### Aufgabe 5. Variablenbelegungen

- a. Beweise ausschließlich mit Hilfe von Argumenten über eine oder mehrere Variablenbelegungen, dass  $q \rightarrow \neg(r \wedge s) \equiv \neg q \vee (r \rightarrow \neg s)$ .

$$\llbracket q \rightarrow \neg(r \wedge s) \rrbracket^\beta = W$$

$$\stackrel{\text{Def. Impl.}}{=} \llbracket q \rrbracket^\beta = F \text{ oder } \llbracket \neg(r \wedge s) \rrbracket^\beta = W$$

$$\stackrel{\text{Def. DeMorgan I}}{=} \llbracket q \rrbracket^\beta = F \text{ oder } \llbracket \neg r \vee \neg s \rrbracket^\beta = W$$

$$\stackrel{\text{Def. Impl.}}{=} \llbracket q \rrbracket^\beta = F \text{ oder } \llbracket r \rightarrow \neg s \rrbracket^\beta = W$$

$$\stackrel{\text{Def. } \neg}{=} \llbracket \neg q \rrbracket^\beta = W \text{ oder } \llbracket r \rightarrow \neg s \rrbracket^\beta = W$$

$$\stackrel{\text{Def. } \vee}{=} \llbracket \neg q \vee r \rightarrow \neg s \rrbracket^\beta = W$$

Damit wird  $q \rightarrow \neg(r \wedge s)$  genau dann zu W ausgewertet, wenn  $\neg q \vee (r \rightarrow \neg s)$  zu W ausgewertet wird. Also sind die beiden Formeln äquivalent.

■

**b.** Beweise oder widerlege ausschließlich mit Hilfe von Argumenten über eine oder mehrere Variablenbelegungen, dass  $\neg(\neg q \vee (s \wedge r)) \vee (q \leftrightarrow (s \wedge r))$  allgemeingültig ist.

Betrachte die Belegung  $\beta$  mit  $\beta(q) = F$  und  $\beta(r) = \beta(s) = W$ . Dann ist

$$\llbracket \neg(\neg q \vee (s \wedge r)) \vee (q \leftrightarrow (s \wedge r)) \rrbracket = F$$

Damit ist die Formel nicht allgemeingültig (da es eine Belegung gibt, unter der die Formel zu F ausgewertet wird).

■

#### Aufgabe 6. Prädikatenlogik

**L.** Beweise:  $((\exists y.P_1(y) \rightarrow P_2(y)) \wedge (\forall x.P_1(x))) \rightarrow \exists z.P_2(z) \wedge P_1(z)$

Annahme (A1):  $((\exists y.P_1(y) \rightarrow P_2(y)) \wedge (\forall x.P_1(x)))$

Zu Zeigen (Z1):  $\exists z.P_2(z) \wedge P_1(z)$

Annahme (A2):  $\exists y.P_1(y) \rightarrow P_2(y)$

Annahme (A3):  $\forall x.P_1(x)$

Wähle  $x \triangleq y$  in A3

Annahme (A4):  $P_1(y)$

Sei x (beliebig aber fest) in A2

Annahme (A5):  $P_1(y) \rightarrow P_2(y)$

Aus A4 und A5 folgt A6

Annahme (A6):  $P_2(y)$

Wähle  $z \triangleq y$  in Z1

Zu Zeigen (Z3):  $P_2(y) \wedge P_1(y)$

Teil 1: Zu Zeigen (Z1.1):  $P_2(y)$

Aus A6 folgt Z1.1

Teil 2: Zu Zeigen (Z2.1):  $P_1(y)$

Aus A4 folgt Z2.1

■