

Formale Sprachen und Automaten

Hausaufgabe 1

Marcel Ebert, Pascal Dettmers, Claude (???)
TU Berlin

November 3, 2019

Aufgabe 1. Mengengrundlagen

- a. Gib die mit gelb gekennzeichnete Menge mit nur zwei Mengenoperationen an:

$$M = (A \cup C) \setminus (((A \cap B) \setminus C) \setminus ((A \cap C) \setminus B))$$

■

- b. Berechne: $((\{1, 3\} \times \{1\})) \cup \{1, 3, 1\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\}$

$$\begin{aligned} M &= ((\{1, 3\} \times \{1\})) \cup \{1, 3, 1\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\} \\ &\stackrel{\text{Def.} \times}{=} (\{(1, 1), (3, 1)\} \cup \{1, 3, 1\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\}) \\ &\stackrel{\text{Def.} \cup}{=} (\{(1, 1), (3, 1), 1, 3\} \setminus \{(1, 3), 1, 2\}) \\ &\stackrel{\text{Def.} \setminus}{=} \{(1, 1), (3, 1), 3\} \end{aligned}$$

■

- c. Berechne: $(\{\emptyset, 2\} \cup \{\{\emptyset\}\}) \cap \mathcal{P}(\{\{\emptyset\}, 2\})$

$$\begin{aligned}
M &= (\{\emptyset, 2\} \cup \{\{\emptyset\}\}) \cap \mathcal{P}(\{\{\emptyset\}, 2\}) \\
&\stackrel{\text{Def.}\cup}{=} \{\emptyset, \{\emptyset\}, 2\} \cap \mathcal{P}(\{\{\emptyset\}, 2\}) \\
&\stackrel{\text{Def.}\mathcal{P}}{=} \{\emptyset, \{\emptyset\}, 2\} \cap \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}, \{2\}, \{\{\emptyset\}, 2\}\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\cap}{=} \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

■

Aufgabe 2. Mengenbeweise

- a. Beweise oder widerlege: Für alle Mengen A und B gilt: $(A \cap B) \cap A = B \cap A$

$$\begin{aligned}
&(A \cap B) \cap A = B \cap A \\
&\stackrel{\text{Def.}\cap}{=} \{x \mid x \in \{y \mid y \in A \wedge y \in B\} \wedge x \in A\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\text{Komm.}}{=} \{x \mid x \in \{y \mid y \in B \wedge y \in A\} \wedge x \in A\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\in}{=} \{x \mid (x \in B \wedge x \in A) \wedge x \in A\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\text{Assoz}}{=} \{x \mid x \in B \wedge (x \in A \wedge x \in A)\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\text{Idem.und}}{=} \{x \mid x \in B \wedge x \in A\} \\
&\stackrel{\text{Def.}\cap}{=} B \cap A
\end{aligned}$$

■