
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE *Urophycis mystacea* NA PLATAFORMA EXTERNA E TALUDE SUPERIOR DA REGIÃO SUDESTE-SUL DO BRASIL

MC Nascimento[1], ACZ Amaral[2] -[1]Pós graduação-Instituto de Biociências/Unesp/Rio Claro; [2]Instituto de Biologia/Unicamp

INTRODUÇÃO:

A escolha e o uso de um recurso alimentar pode refletir desde a estratégia de obtenção de energia à adaptação ao meio e aos recursos disponíveis, demonstrando também a direção e a origem do fluxo energético na cadeia trófica. O presente trabalho faz parte do projeto Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva, REVIZEE - Score Sul.




Urophycis mystacea
Miranda-Ribeiro, 1903

OBJETIVOS:

Este trabalho tem como propósito estudar a alimentação de *Urophycis mystacea* Miranda-Ribeiro, 1903 (Phycidae Gadiphormes), peixe ósseo de hábitos demersais encontrado em grandes profundidades, na região sudeste-sul do Brasil e investigar diferenças no seu espectro alimentar.



Localização da área e estações de coleta.




MATERIAL E MÉTODOS:

A área de coleta, compreende a plataforma externa e o talude continental da região sudeste-sul do Brasil, situada entre Cabo Frio (RJ) e Ilha de Santa Catarina (SC). Essa região foi amostrada em 8 radiais perpendiculares à linha de costa, sendo as coletas realizadas entre 100 e 600 m de profundidade com redes de arrasto de fundo, no período de inverno/primavera de 2001, inverno de 2002; e verão/outono de 2002. A avaliação foi feita por meio da análise do conteúdo estomacal de 35 indivíduos.

APOIO:
MMA; CNPQ; Bolsa FMB


RESULTADOS:




Com dados sobre o grau de digestão das presas pode-se inferir que o possível período de alimentação da espécie é

matutino.


Principais ítens por estação		
	Inverno	Verão
Cephalopoda (Lula)	33,00%	23,80%
Crustacea	42,00%	33,30%
Teleostei	25%	42,90%



Os principais itens encontrados foram Crustacea, Cephalopoda e Teleostei.



Relação entre o tamanho dos indivíduos e o tipo de presa.



Padrão de distribuição espacial em relação à captura de alimento.

A contribuição de Cephalopoda bem como de Crustacea é maior no inverno do que no verão, já a de Teleotei é maior no verão que no inverno. Entretanto, manteve-se tanto no inverno quanto no verão, um padrão de distribuição espacial em relação à captura de alimento. Em *U. mystacea* coletados de 400-600 m predominaram Cephalopoda, em 150-350 m Teleostei, e em cerca de 100 m Crustacea. Quanto ao tamanho, animais maiores alimentaram-se principalmente de Cephalopoda.

CONCLUSÕES:

Urophycis. mystacea alimenta-se de Crustacea, Cephalopda e Teleostei, sua preferência pode estar relacionada a fase de vida (tamanho) e profundidade, além de apresentar um comportamento alimentar matutino.