
DIETA ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES DEMERSAIS DA REGIÃO SUDESTE-SUL DO BRASIL


Nascimento, M.C.*; Amaral, A.C.Z.**
*Pós-graduação em Zoologia Unesp Rio Claro (macoleoptera@aol.com);** Depto de Zoologia-IB/Unicamp.



Antigonia capros
Lowe, 1843
Galo-de-fundo

INTRODUÇÃO

A escolha e o uso de um recurso alimentar por um organismo pode refletir desde a estratégia de obtenção de energia à adaptação ao meio e aos recursos disponíveis, demonstrando também a direção e a origem do fluxo energético na cadeia trófica. O presente trabalho faz parte do projeto Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva, REVIZEE - Score Sul.




Urophycis mystacea
Miranda-Ribeiro, 1903
Abrótea de fundo

OBJETIVOS

Este trabalho tem como propósito estudar a dieta alimentar de duas espécies de peixes: *Urophycis mystacea* (Phycidae Gadiforme) e *Antigonia capros* (Caproidae Zeiforme), peixes de hábitos demersais e batidemersais, *U.mystacea* em profundidades de 100 a 600m e *A.capros* de 100 a 300.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de coleta compreende a plataforma externa e o talude continental da região sudeste-sul do Brasil, situada entre Cabo Frio (RJ) e Ilha de Santa Catarina (SC). Essa região foi amostrada em oito radiais perpendiculares à linha de costa, sendo as coletas realizadas entre 100 e 600 m de profundidade com redes de arrasto de fundo, no período de inverno/primavera de 2001, inverno de 2002; e verão/outono de 2002. A avaliação foi feita por meio da análise do conteúdo estomacal de 34 indivíduos de cada espécie.



Localização da área e estações de coleta.

RESULTADOS


Na dieta de ambas espécies os crustáceos são predominantes. Em *A. capros* são representados principalmente por pequenos camarões e isópodas, e em *U. mystacea* por siris e pequenos camarões.

U. mystacea	Inverno/Primavera	Verão/Outono
Cephalopodas	33,00%	23,80%
Crustáceos	42,00%	33,30%
Peixes ósseos	25,00%	42,90%

Lulas tiveram importante participação na dieta de ambas, estando no verão/outono presente em 65% dos estômagos de *A. capros* (mas não como item exclusivo) e em 33% de *U. mystacea,* no inverno/primavera.


A. capros	Inverno/Primavera	Verão/Outono
Cephalopodas	23,00%	65,00%
Crustáceos	91,00%	92,00%
Peixes ósseos	8,30%	3,60%
Poliquetas	1,50%	34,20%
Gastrópodas	6,40%	5,40%

Em *Urophycis mystacea,* foi observada a predominancia, além de crustáceos e lulas, também de peixes ósseos. A proporção e importância destes itens, estão intimamente ligadas à estação do ano, profundidade e a idade do peixe.




Padrão de distribuição espacial em relação à captura de alimento em *U.mystacea*.

Urophycis mystacea manteve tanto no inverno quanto no verão um padrão de distribuição espacial em relação à captura de alimentos. Em 400 a 600m predominaram lulas, de 150 a 300m principalmente peixes ósseos e em 100m basicamente crustáceos. Quanto ao porte, animais que se alimentam de peixes e crustáceos apresentaram e animais maiores de lulas.




Relação entre o tamanho dos indivíduos e o tipo de presa em *U. mystacea*.

Para *Antigonia capros* não foi possível estabelecer relações entre tamanho do peixe, sexo ou profundidade com os itens alimentares por esta espécie mostrar ser generalista em todas as fases da vida.



Padrão de distribuição espacial em relação à captura de alimento em *A. capros*.



Relação entre o tamanho dos indivíduos e o tipo de presa em *A. capros.*

De acordo com o grau de digestão, pode-se observar que o período de alimentação ocorre nas primeiras horas da manhã em *U. mystacea*, mas em *A. capros*, não foi possível determinar.

Apoio: MMA, CNPQ, Fundação MB/Unicamp.