
ATIVIDADE ALIMENTAR DIÁRIA DO PEIXE GALO-DE-FUNDO (*Antigonia capros*) NA REGIÃO SUDESTE-SUL DO BRASIL

Nascimento[1], M. C.; Amaral[2], A. C. Z.

[1] Pós-graduação em Ecologia, depto. Zoologia – Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). nascimento_mc@yahoo.com.br.
[2] Depto. Zoologia - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). ceamaral@unicamp.br



Antigonia capros Lowe, 1843
Galo-de-fundo

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS


Estudos sobre ciclos sazonal e diário da atividade alimentar são essenciais para o melhor entendimento sobre a dinâmica trófica dos peixes e para a determinação da estrutura e funcionamento do ecossistema.

Este trabalho teve como propósito investigar a atividade alimentar diária de *Antigonia capros* (Caproidae, Zeiformes). Espécie popularmente conhecida como peixe galo-de-fundo, comum na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo compreende a plataforma continental externa e o talude superior da região Sudeste-Sul do Brasil, situada entre Cabo Frio (RJ) e Ilha de Santa Catarina (SC). A região foi amostrada em 8 radiais perpendiculares à linha de costa, entre 100 e 500 m, com redes de arrasto de fundo, nos períodos de inverno/primavera e verão/outono de 2001 e 2002, entre 05h00 e 20h00.

O horário de coleta foi dividido em amanhecer (05h00 – 08h00), manhã (08h00 – 11h00), tarde (11h00 – 14h00), entardecer (14h00 – 17h00) e anoitecer (17h00 – 20h00). Os diferentes graus de digestão dos alimentos (**GD**) e de repleção estomacal (**GR**) foram relacionados ao período do dia em que os peixes foram coletados.



Mapa ilustrando as posições das estações de coleta. Linha vermelha = localização aproximada da quebra da plataforma.

GD refere-se ao quão digerido encontrava-se o alimento no interior do estômago no horário da coleta, considerando:
GD 1 = fresco;
GD 2 = parcialmente digerido;
GD 3 = muito digerido ou fragmentado.

GR foi estabelecido visualmente baseado no volume ocupado pelo conteúdo em relação ao espaço total da cavidade estomacal, sendo:
GR 0 = vazio;
GR 1 = pouco repleto: com alimento ocupando até 30% de sua capacidade;
GR 2 = quase repleto: com alimento ocupando de 30 a 65% de sua capacidade;
GR 3 = repleto: com alimento ocupando mais de 65% de sua capacidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram examinados 383 estômagos de Antigonia capros. A partir dos resultados de **GD** e **GR**, observou-se maior atividade alimentar ao anoitecer. No entardecer e anoitecer ocorreram as menores proporções de estômagos vazios e as maiores de alimentos parcialmente digeridos.

Estômagos quase repletos e com alimento muito digerido foram freqüentes em todos os períodos, demonstrando que a espécie deve se alimentar durante todo o dia.


Freqüência de ocorrência relativa dos graus de repleção e dos graus de digestão dos alimentos identificados nos diferentes intervalos de horário. n = número de estômagos analisados por horário.

	GR 0	GR 1	GR 2	GR 3	GD 1	GD 2	GD 3	n
	%	%	%	%	%	%	%	
Amanhecer	8	10	73	9	8	25	67	77
Manhã	13	48	36	3	1	11	88	69
Tarde	18	45	31	5	6	16	78	99
Entardecer	3	12	81	3	4	50	46	59
Anoitecer	5	10	66	19	4	37	59	79
TOTAL								383

Antigonia capros consumiu abundantemente crustáceos, principalmente os bentônicos, durante todo o dia, em maior freqüência pela manhã e anoitecer. Isso pode indicar que *A. capros* esteja abrigada nesses períodos, e se alimente de organismos disponíveis próximo ao substrato. Nos indivíduos coletados à tarde e ao entardecer, organismos pelágicos como: peixes, larvas de gastrópodes e poliquetas planctônicos foram freqüentes, indicando que a espécie, apresenta atividade alimentar intensificada na região pelágica.


Freqüência de ocorrência relativa dos alimentos encontrados no conteúdo estomacal nos diferentes períodos do dia. n = número de estômagos analisados por horário.

	Polychaeta	Gastropoda	Cephalopoda	Crustacea	Teleostei	n
	%	%	%	%	%	
Amanhecer	1	8	44	96	1	59
Manhã	2	5	19	100	5	52
Tarde	6	4	53	74	5	67
Entardecer	54	11	33	89	23	47
Anoitecer	20	7	40	100	1	63
TOTAL						288

























Antigonia capros é uma espécie bentônica. Sua atividade alimentar ocorre na região bentônica e com maior freqüência pelágica, onde se alimenta durante todo o dia, com maior intensidade nos períodos de menor luminosidade.

APOIO:
Programa REVIZEE Score-Sul; MMA; Bolsa FMB