Dieta alimentar de *Synagrops bellus* (Perciformes: Acropomatidae)_

Nascimento, M.C.[1,2*] & Amaral A.C.Z.[2]

•Departamento de Zoologia, Programa de Pós Graduação em Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

•Departamento de Zoologia, Laboratório de Macrofauna Bêntica, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Caixa Postal 6109, CEP 13083-970, Campinas - SP.

*E-mail: nascimento_mc@yahoo.com.br



Synagrops bellus (Goode & Bean, 1895)
Blackmouth bass

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O estudo da dieta de um organismo além de fornecer informações sobre a biologia da espécie, constitui a base para a compreensão das relações especificas entre outros organismos e o ambiente. Dentro desse contexto, estudou-se a dieta alimentar de *Synagrops bellus*, peixe de hábito demersal, frequente na região Sudeste-Sul do Brasil.


MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo compreende a plataforma continental externa e o talude superior da região Sudeste-Sul do Brasil, situada entre Cabo Frio (RJ) e Ilha de Santa Catarina (SC), parte do Projeto REVIZEE. A região foi amostrada em 8 radiais perpendiculares à linha de costa, entre 100 e 600 m, com redes de arrasto de fundo, nos períodos de inverno/primavera e verão/outono de 2001 e 2002 e horários entre 05h00 e 20h00.

Os peixes foram fixados em formalina 10% e tiveram seus conteúdos estomacais analisados. Dos 763 exemplares examinados, 297 continham alimento.

Os itens alimentares foram quantificados em frequência de ocorrência. As principais presas foram identificadas e as possíveis interações entre a frequência de consumo e as áreas de coleta (da Ilha de Santa Catarina, SC a Paranaguá, PR e do sul de São Paulo, SP até Cabo Frio, RJ), foram analisadas.







Mapa **ilustrando as posições das estações de coleta. Linha vermelha = localização aproximada da quebra da plataforma. À direita um esquema de rede Ballom trawl, exemplificando como foi a coleta.**

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maioria dos indivíduos consumiu apenas um tipo de presa e 17% apresentaram mais de um item no conteúdo estomacal, conforme figura ao lado.




A proporção dos indivíduos que consumiram apenas um tipo de alimento foi maior no verão/outono do que no inverno/primavera, conforme figura abaixo.




A dieta foi composta por crustáceos (principalmente carídeos), cefalópodes (lulas) e peixes.








A intensidade com que esses itens foram consumidos variou entre as áreas estudadas. Na região de São Paulo e Rio de Janeiro predominou crustáceos (54%), seguido por lulas (42%), e peixes (21%), na região de Santa Catarina e Paraná o alimento mais frequente foi peixes, consumido por 60% dos indivíduos, seguido por lulas (39%) e crustáceos (19%).





Synagrops bellus é uma espécie com dieta heterogênea e demonstra plasticidade alimentar. Embora seja evidente a preferência por lulas, peixes e crustáceos, o consumo de cada um desses grupos depende de sua disponibilidade no ambiente. Isso é evidenciado pela inversão na presa dominante nos conteúdos estomacais, em função da área em que os indivíduos foram coletados.

Apoio:
Programa REVIZEE Score-Sul; MMA e CNPq