
PADRÃO CIRCADIANO DE ATIVIDADE ALIMENTAR DA ABRÓTEA-DE-PROFUNDIDADE

M.C. Nascimento[1*], A.C.Z. Amaral[2]
1- Centro de Ciências da Vida Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP.
marcela.nascimento@puc-campinas.edu.br.
2- Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas

INTRODUÇÃO

Urophycis mystacea (Gadidae, Gadiformes), popularmente conhecida como abrótea-de-profundidade é um dos peixes mais abundantes no talude superior da região sudeste do Brasil. Trata-se de uma das espécies que vem sendo mais explorada comercialmente nos últimos 15 anos, entretanto, aspectos de sua biologia e ecologia, como alimentação e relações tróficas ainda são pouco conhecidos. Uma vez que as relações ecológicas se dão principalmente por meio de interações tróficas, o hábito e a atividade alimentar diária e sazonal de populações de peixes são variáveis importantes para a compreensão do papel das espécies em um ecossistema aquático.

Dentro desse contexto, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar e comparar a atividade alimentar da abrótea-de-profundidade, nas diferentes estações do ano, visando avaliar se ocorreram variações no ciclo diário, inclusive na intensidade em que os recursos foram consumidos.



Mapa **ilustrando as posições das estações de coleta. Linha vermelha = localização aproximada da quebra da plataforma. À direita um esquema de rede Ballom trawl, exemplificando como foi a coleta.**

Abrótea-de-profundidade



Bernardes et al. 2005

MATERIAL E MÉTODOS

O material foi coletado entre a Ilha de Santa Catarina (SC) e Cabo Frio (RJ), no âmbito do programa REVIZEE Score-Sul, em profundidades entre 100 e 600 m com o auxílio de redes de arrasto-de-fundo, no período de inverno/primavera de 2001 e 2002, e verão/outono de 2002.

Os estômagos foram classificados quanto ao seu grau de repleção, e seu conteúdo quanto ao grau de digestão. Os resultados foram relacionados com o horário em que cada indivíduo foi capturado. Além disso, os itens alimentares foram identificados e também associados ao horário de captura dos indivíduos.





Fotos ilustrando as etapas do trabalho, pesca com rede de arrasto de fundo, triagem dos organismos pescados, remoção do estômago dos peixes, com avaliação do grau de repleção dos estômagos e identificação dos itens alimentares e classificação quanto ao seu grau de digestão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 38 exemplares com alimento do estômago. Embora o número de indivíduos com conteúdo alimentar tenha sido baixo, ficou evidente uma intensificação na atividade alimentar próximo ao amanhecer, quando cerca de 40% dos indivíduos com no estômago repleto e 80% do alimento consumido fresco.


Além disso, nota-se uma diferenciação entre o que é consumido nos diferentes períodos, crustáceos e lulas foram mais consumidos pela manhã e peixes no final do dia e anoitecer.





Os períodos nos quais a atividade alimentar é intensificada, provavelmente estão relacionados aos que apresentam maior disponibilidade de alimento e à menor atividade dos principais predadores. No presente estudo há indícios de que esta combinação de fatores ocorra entre a madrugada e início da manhã, sobretudo pela presença dos alimentos mais íntegros nesse período.

É possível indicar que, embora crustáceos tenham sido mais frequentes no conteúdo estomacal da abrótea-de-profundidade no amanhecer, essa espécie deve consumir principalmente lulas a noite, quando provavelmente apresenta maior atividade alimentar.



O grande consumo de crustáceos bentônicos e peixes demersais, demonstra que a espécie apresenta uma intensa atividade alimentar próximo ao substrato. Esta espécie consome também lulas (*Illex argentinus*), que permanece em regiões próximas ao fundo durante o dia, migrando para a região pelágica apenas a noite. A importância de lulas para a espécie, principalmente pela manhã, pode ser decorrente da alimentação noturna, ou ainda pelo consumo no amanhecer, quando estão mais próximas do fundo.

CONCLUSÃO

Apesar do baixo número amostral e da ausência de coletas noturnas, há indícios que se trata de uma espécie com atividade alimentar mais intensa no período noturno, quando consome preferencialmente lulas.

AGRADECIMENTOS

Bolsa Fundação Mary Brown; Ministério do Meio Ambiente; Programa Revizee