

Sprawozdanie z Laboratorium obliczeń naukowych

Lista nr [3]

Marcel Musiałek

Indeks: 279704

23 listopada 2025

Spis treści

1	Zadania 1–3: Implementacja i weryfikacja metod	2
1.1	Opis zadań	2
1.2	Opis rozwiązania	2
1.3	Wyniki	2
1.4	Wnioski	2
2	Zadanie 4	2
2.1	Opis zadania	2
2.2	Opis rozwiązania	2
2.3	Wyniki	2
2.4	Obserwacje	3
2.5	Wnioski	3
3	Zadanie 5	3
3.1	Opis zadania	3
3.2	Opis rozwiązania	3
3.3	Wyniki	4
3.4	Obserwacje	4
3.5	Wnioski	4
4	Zadanie 6	4
4.1	Opis zadania	4
4.2	Opis rozwiązania	4
4.3	Wyniki	5
4.4	Obserwacje	5

1 Zadania 1–3: Implementacja i weryfikacja metod

1.1 Opis zadań

Celem zadań było zaimplementowanie metod: bisekcji, Newtona oraz siecznych, zgodnie z pseudokodem przedstawionym na wykładzie. Następnie należało sprawdzić poprawność implementacji przy użyciu prostych funkcji testowych.

1.2 Opis rozwiązania

W ramach rozwiązania stworzono funkcje realizujące poszczególne metody. W celu weryfikacji ich działania dodano proste testy dla funkcji $f(x) = x^2 - 4$.

1.3 Wyniki

```
--- WERYFIKACJA NA FUNKCJI f(x) = x^2 - 4 ---  
Bisekcja [1.0, 3.0]:      (2.0, 0.0, 1, 0)  
Newton (x0=3.0):         (2.000000000026214, 1.0485656787295738e-10, 4, 0)  
Sieczne (x0=1.0, x1=3.0):(2.000000195092221, 7.803689223706556e-7, 5, 0)
```

1.4 Wnioski

Wyniki testu potwierdzają, że zaimplementowane funkcje działają poprawnie dla prostych danych wejściowych, zbiegając do oczekiwanego rozwiązania.

2 Zadanie 4

2.1 Opis zadania

Celem zadania było wyznaczenie pierwiastka równania $f(x)$ przy użyciu trzech zaimplementowanych metod iteracyjnych:

- Metody bisekcji,
- Metody Newtona,
- Metody siecznych.

2.2 Opis rozwiązania

Wykorzystano moduł miejsca zerowe zawierający implementacje metod. Zdefiniowano funkcję $f(x)$ oraz jej pochodną $f'(x)$. Dla każdej metody wywołano odpowiednią funkcję z zadanymi parametrami i zmierzono liczbę iteracji oraz końcowy błąd $f(r)$.

2.3 Wyniki

Wymagana dokładność: delta = 5.0e-6, epsilon = 5.0e-6

```
1. Metoda Bisekcji (przedział [1.5, 2.0]):  
Pierwiastek r = 1.933753967285156  
Wartość f(r)  = -2.702768013840284e-07  
Iteracje      = 16
```

```

-----
2. Metoda Newtona (x0 = 1.5):
Pierwiastek r = 1.933753779789742
Wartość f(r)  = -2.242331631485683e-08
Iteracje      = 4
-----

```

```

3. Metoda Siecznych (x0 = 1.0, x1 = 2.0):
Pierwiastek r = 1.933753644474301
Wartość f(r)  = 1.564525129449379e-07
Iteracje      = 4
=====

```

2.4 Obserwacje

- Bardzo podobne miejsca zerowe.
- Większa ilość iteracji w metodzie bisekcji.
- Różne znaki $f(r)$.

2.5 Wnioski

Ten eksperyment potwierdza teoretyczne właściwości badanych metod:

- **Metoda Bisekcji** – Jest zdecydowanie najwolniejsza, posiada zbieżność liniową.
- **Metoda Newtona** – Ma teoretycznie najlepszą zbieżność (kwadratową) – w eksperymencie również daje najlepsze wyniki.
- **Metoda Siecznych** – Uzyskała równie dobre wyniki co metoda Newtona, mimo teoretycznie gorszej zbieżności.

Eksperyment ten ukazuje, że na określonym wąskim przedziale lepiej sprawdzają się metody Newtona i siecznych. Pokazuje to, dlaczego metody hybrydowe są skuteczne.

3 Zadanie 5

3.1 Opis zadania

Zadanie polegało na znalezieniu wartości x , dla których przecinają się wykresy funkcji $y = 3x$ oraz $y = e^x$.

3.2 Opis rozwiązania

Sprawdzenie szerokiego zakresu dla metody bisekcji $[-100, 100]$ – szansa, że algorytm i tak znajdzie rozwiązanie. Zauważyć można, że $f(0) = -1$, $f(1) < 0$, $f(2) > 0$, co oznacza, że w przedziałach $[0, 1]$ i $[1, 2]$ znajdują się miejsca zerowe. Zaimplementowano skrypt wykorzystujący funkcję mbisekcji z modułu MiejscaZerowe, uruchamiając ją niezależnie dla obu wyznaczonych wyżej przedziałów.

3.3 Wyniki

Szukanie w przedziale $[-100.0, 100.0]$:

Błąd: Funkcja nie zmienia znaku w zadanym przedziale.

Szukanie w przedziale $[0.0, 1.0]$:

Pierwiastek $r = 0.61914062$

Wartość $f(r) = 9.06632034e-05$

Liczba iteracji: 9

Szukanie w przedziale $[1.0, 2.0]$:

Pierwiastek $r = 1.51208496$

Wartość $f(r) = 7.61857860e-05$

Liczba iteracji: 13

3.4 Obserwacje

- W szerokim zakresie nie działa metoda – ustalono, że funkcja ma 2 pierwiastki, więc na końcach szerokiego zakresu znak będzie taki sam.
- W obu przybliżonych przypadkach pierwiastek funkcji został znaleziony z rozsądną ilością iteracji.

3.5 Wnioski

- Metoda bisekcji wymaga zmiany znaku na danym zakresie, więc w przypadku wystąpienia na nim parzystej ilości pierwiastków metoda może zawieść.
 - Na przedziałach, gdzie zmiana znaku występuje raz, metoda bisekcji gwarantuje znalezienie pierwiastka.
-

4 Zadanie 6

4.1 Opis zadania

Zadanie polegało na znalezieniu miejsc zerowych dwóch zadanych funkcji. Celem było przetestowanie metod Bisekcji, Newtona i Siecznych dla standardowych przedziałów, a następnie zbadanie zachowania Metody Newtona dla "trudnych" punktów startowych, gdzie pochodna jest bliska zeru lub zmienia znak.

4.2 Opis rozwiązania

Zaimplementowano funkcje f_1, f_2 oraz ich pochodne.

- Dla f_1 przeprowadzono testy stabilności Newtona dla dużych x_0 , gdzie wykres funkcji staje się płaski (asymptota pozioma).
- Dla f_2 sprawdzono punkt $x_0 = 1$ (ekstremum lokalne) oraz punkty $x_0 > 1$, gdzie styczna kieruje iteracje w przeciwną stronę od pierwiastka.

4.3 Wyniki

Analiza funkcji $f_1(x) = e^{(1-x)} - 1$

```
-----  
Bisekcja [0.0, 2.0]:      r=1.000000, it=1, err=0  
Newton (x0=2.0):         r=1.000000, it=5, err=0  
Sieczne (x0=0.0, x1=2.0): r=1.000002, it=6, err=0
```

Testy specjalne Newtona dla f_1 ($x_0 > 1$):

```
x0 = 5.0   -> r=1.000000, it=54, v=3.6e-07  
x0 = 10.0  -> r=NaN, it=100, v=NaN  
x0 = 100.0 -> r=100.000000, it=1, v=-1.0e+00
```

Analiza funkcji $f_2(x) = x * e^{-x}$

```
-----  
Bisekcja [-0.5, 0.5]:    r=0.000000, it=1, err=0  
Newton (x0=-0.5):        r=-0.000000, it=4, err=0  
Sieczne (x0=-0.5, x1=0.5): r=0.000005, it=6, err=0
```

Testy specjalne Newtona dla f_2 (szukanie zera w $x=0$):

```
x0 = 1.0 (ekstremum!): err kod = 2 (oczekiwany błąd pochodnej)  
x0 = 1.5 -> r=14.787437, it=10 (czy zbiegła do 0?)  
x0 = 2.0 -> r=14.398663, it=10 (czy zbiegła do 0?)  
x0 = 10.0 -> r=14.380524, it=4 (czy zbiegła do 0?)
```

4.4 Obserwacje

Dla funkcji f_1 :

- Metody zbiegły szybko. Bisekcja trafiła idealnie w 1 iteracji, ponieważ $x = 1$ jest środkiem przedziału $[0, 2]$.
- Dla $x = 5$ pochodna jest bardzo mała (funkcja płaska). Metoda Newtona potrzebowała aż 54 iteracji, aby "wrócić" do pierwiastka.
- Dla bardzo dużych x , pochodna jest numerycznie zerowa. Metoda albo generuje błędy (NaN), albo stoi w miejscu, ponieważ styczna jest prawie równoległa do osi OX.

Dla funkcji f_2 :

- Funkcja ma maksimum w $x = 1$. Pochodna wynosi 0. Metoda Newtona zwróciła błąd (dzielenie przez zero), co jest zachowaniem poprawnym.
- Dla $x > 1$ styczna do wykresu przecina oś OX po prawej stronie (w coraz większych wartościach x), oddalając się od pierwiastka $x = 0$. Metoda rozbiega się do nieskończoności. Wartości typu 14.7 to moment, w którym algorytm się zatrzymał (przypadkowo spełniając warunek tolerancji dla bardzo małej wartości funkcji), ale nie jest to poszukiwany pierwiastek.