1 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Identifique la variable cuantitativa discreta

A Peso de periódicos recuperados para reciclar en un solo día.

B Talla de los alumnos de primaria de un colegio estatal.

Correcta:
Número de damnificados de cada distrito del país.

D Tiempo promedio para completar un examen de bioestadística.

Comentarios

Good work

2 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Identifique la variable medida en escala de intervalo:

Incorrecta:
Tiempo para completar un examen de bioestadística.

B Pesos de recién nacidos en un hospital.

C Puntajes de un cuestionario de calidad de vida

D Número de habitantes de cada departamento del país.

Comentarios

That's not correct

3 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

En cuál de las siguientes etapas de la investigación se elabora el protocolo o proyecto de investigación:

A Planificación

B Ejecución

Incorrecta:
Evaluación

D Deliberación

Comentarios

That's not correct

4 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Se talla (en cm) a 10 niños, entre 10 a 12 años de edad, y se encuentran los siguientes resultados:
Media: 155
Desviación estándar: 2.03
Mediana: 160
Moda: 161
Rango intercuartílico: 157 – 163.

Se puede concluir respecto a la distribución de las tallas en este grupo que:

A Es simétrica respecto a la media.

Incorrecta:
Está sesgada hacia la derecha.

C Está sesgada hacia la izquierda.

D Es asimétrica respecto a la media.

Comentarios

That's not correct

5 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Se talla (en cm) a 10 niños, entre 10 a 12 años de edad, y se encuentran los siguientes resultados:
Media: 155
Desviación estándar: 2.03
Mediana: 160
Moda: 161
Rango intercuartílico: 157 – 163

Para describir la distribución de estos datos, se debe considerar:

A La media aritmética y la mediana.

B La media aritmética y el rango intercuartílico.

✕ **Incorrecta:**
La media aritmética y la desviación estándar.

D La mediana y el rango intercuartílico.

Comentarios

That's not correct

6 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO 0 / 1

En un estudio cuyo objetivo fue establecer la relación entre la ansiedad en estudiantes de educación secundaria, y el rendimiento académico. Se realizó un estudio transversal, efectuado en 350 estudiantes (muestra) de un colegio público del distrito Cercado de Lima entre el 2020 al 2022. Se midió la ansiedad mediante el puntaje obtenido en la escala de ansiedad de Beck. El rendimiento académico se midió a través del promedio de notas obtenidas en cada semestre. Además, se registró información sobre género y edad mediante el cuestionario.

(Según esta información responder a las preguntas 6-10)

De las siguientes variables, NO fue una variable de estudio:

Incorrecta:
Edad.

B Género

C Ansiedad.

D Grado de instrucción. Respuesta correcta

Comentarios

That's not correct

7 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

La variable Ansiedad estuvo medida en una escala:

A Intervalo

B De razón

C Ordinal

Incorrecta:
Nominal

Comentarios

That's not correct

8 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

La expresión "En la muestra la ansiedad presento puntajes superiores a 30 en el 50% de los participantes", corresponde a una:

Incorrecta:
Razón

B Proporción

C Tasa

D Mediana

Comentarios

That's not correct

9 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

La medida enunciada en la pregunta previa, corresponde a:

A Estadístico

B Parámetro

Incorrecta:
Dato

D Unidad de análisis

Comentarios

That's not correct

10 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

La unidad de análisis del estudio sería:

A) Estudiante de un colegio público del distrito Cercado de Lima entre el 2020 al 2022

B) Estudiantes de educación secundaria de un colegio público del distrito Cercado de Lima entre el 2020 al 2022

Correcta:
Estudiante de educación secundaria de un colegio público del distrito Cercado de Lima entre el 2020 al 2022

D) Estudiantes de un colegio público del distrito Cercado de Lima entre el 2020 al 2022

Comentarios

Good work

11 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Si la media del peso de estudiantes es 70 kg y la desviación estándar es 10, el coeficiente de variación (CV) es:

A 14.3%

B 0.07%

C 10%

Incorrecta:
70%

Comentarios

That's not correct

12 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

El percentil 75(P75) o Q3 representa:

A El valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos

Correcta:
El valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos

C La media de la variable

D El valor que está en el centro de los datos

Comentarios

Good work

13 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

El gráfico apropiado para una variable cuantitativa en escala de razón

---

A Barras

Correcta:
Histograma.

C Torta o circular.

D Circular y barras

Comentarios

Good work

14 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Un gráfico de cajas permite:

Incorrecta:
Evaluar la distribución de los datos.

B Todas las anteriores.

C Mostrar valores atípicos.

D Identificar a la mediana.

Comentarios

That's not correct

15 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

El coeficiente de variación del peso de los recién nacidos es igual a 19.9% indica:

A El 19.9% de los pesos de los recién nacidos se dispersan con respecto a la media.

B El peso del recién nacido presenta una dispersión por debajo de 19.9% gramos con respecto a la media.

Incorrecta:
El peso del recién nacido presenta una dispersión en promedio de 19.9 gramos con respecto a la media.

D El 19.9% de los pesos de los recién nacidos se dispersan con respecto a la mediana.

Comentarios

That's not correct

16 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Un gráfico adecuado para dos variables cuantitativas:

A Torta o circular

B Todas anteriores

Incorrecta:
Barras

D Dispersión

Comentarios

That's not correct

17 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Cuando se evalúa en variables cualitativas, "mide la intensidad de la ocurrencia de un evento en una población en una unidad de tiempo" corresponde a:

Correcta:
Tasa

B Proporción

C Proporción y Razón

D Razón

Comentarios

Good work

18 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Se tiene el resultado de kurtosis=-2.3 de pesos del recién nacidos:

✕ **Incorrecta:**
Presenta una distribución mesocúrtica.

B Presenta una distribución mesocúrtica y leptocúrtica

C Presenta una distribución leptocúrtica.

D Presenta una distribución platicúrtica

Comentarios

That's not correct

19 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Un resultado de Skew=-4.3, se interpretaría como una distribución:

✕ **Incorrecta:**
Asimétrica positiva

B Simétrica

C Mesocúrtica

D Asimétrica negativa

Comentarios

That's not correct

20 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

0 / 1

Cuando se elabora la tabla "está conformado por los espacios que constituyen las intersecciones de las filas y columnas (celdas) donde se anotan las frecuencias absolutas y relativas obtenidas" se refiere a:

A Matriz

B Notas aclaratorias

Incorrecta:
Título

D Cuerpo

Respuesta correcta

Comentarios

That's not correct