1 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

¿Qué es el espacio muestral Ω?

A El conjunto de resultados imposibles.

B Un subconjunto vacío de eventos.

C El conjunto de resultados favorables.

Correcta:
El conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Comentarios

Good work

2 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Al lanzar una moneda tres veces, ¿cuántos elementos tiene Ω?

A 3

B 8

Incorrecta:
6

D 9

Comentarios

That's not correct

3 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Si A es un evento, su complemento $\bar{A}$ satisface:

A $P(A \cap \bar{A})=P(A)$

B $P(\bar{A})=P(A)$

Correcta:
$P(A)+P(\bar{A})=1$

D $P(A)+P(\bar{A})=0$

Comentarios

Good work

4 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Para eventos disjuntos A y B se cumple:

A $P(A \cap B)=P(A)P(B)$

B $P(A|B)=P(A)$

Correcta:
$P(A \cup B)=P(A)+P(B)$

D $P(A)=0$ o $P(B)=0$

Comentarios

Good work

5 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Seleccione la expresión correcta:

A $P(A \cap B)=P(A)+P(B)-P(A \cup B)$

Incorrecta:
$P(A \cap B)=P(A)+P(B)$

C $P(A \cap B)=P(A)/P(B)$

D $P(A \cap B)=1-P(A \cup B)$

Comentarios

That's not correct

6 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Al lanzar un dado, P(número mayor que 4) es:

✕ **Incorrecta:**
1/6

B 1/3

C 1/2

D 2/3

Comentarios

That's not correct

7 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Si $P(B)=0.25$ y $P(A \cap B)=0.05$, entonces $P(A/B)=$

A 0.05

B 0.25

C 0.80

Correcta:
0.20

Comentarios

Good work

8 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Si A y B son independientes, entonces:

Incorrecta:
$P(A \cap B)=P(A)+P(B)$

B $P(A/B)=P(B)$

C $P(A/B)=0$

D $P(A/B)=P(A)$

Comentarios

That's not correct

9 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

En una clase: P(inglés)=0.30, P(francés)=0.25, P(ambos)=0.08. P(al menos uno) es:

A 0.38

Incorrecta:
0.22

C 0.55

D 0.47

Comentarios

That's not correct

10 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Dos eventos con P(A)=0.6, P(B)=0.5. ¿Cuál es el valor de P(A∩B), para que los eventos A y B sean independientes?

A 0.50

Correcta:
0.30

C 0.60

D 0.10

Comentarios

Good work

11 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Si $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$ y $P(A \cup B)=0.7$, entonces $P(A \cap B)=$

A 0.4

B 0.3

Correcta:
0.2

D 0.1

Comentarios

Good work

12 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Dos personas eligen números del 0 al 9. Probabilidad de que NO elijan el mismo número:

A 2/9

Incorrecta:
1/10

C 9/10

D 10/9

13 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En un banco de sangre: P(VIH+)=0.001, P(herpes+)=0.01, P(ambos)=0.0005. P(al menos uno) es:

A 0.0095

B 0.0115

C 0.0005

Correcta:
0.0105

14 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En una población hospitalaria: P(Corazón)=0.35 y P(fumador/Corazón)=0.86. P(fumador ∩ corazón) es:

A 0.4070

Correcta:
0.3010

C 0.3100

D 0.1300

15 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Definición de probabilidad condicional P(A/B):

A $P(B|A)$

B $P(A \cup B)/P(A)$

Correcta:
$P(A \cap B)/P(B)$

D $P(A)+P(B)$

16 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Al lanzar dos dados, la probabilidad de que la suma sea 7 es:

✕ **Incorrecta:**
7/36

B 2/6

C 1/6

D 3/6

17 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

Considerando los datos que se muestran en la tabla (responder las preguntas 17 al 20).

Tabla 1. Asociación entre el hábito tabáquico y el desarrollo de una enfermedad. Datos de una muestra de 180 sujetos.

	Enfermos (E)	No enfermos ($\bar{E}$)	Total
Fumador (F)	60	10	70
No fumador ($\bar{F}$)	20	90	110
Total	80	100	180

Para un sujeto tomado al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que el sujeto seleccionado NO sea fumador y esté enfermo?

- ⊗ **Incorrecta:** 0.056
- (B) 0.444
- (C) 0.333
- (D) 0.111

18 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

¿Cuál es la probabilidad de que sea fumador o no fumador?

A 1.000

B 0.611

Incorrecta:
0.389

D 0.500

Comentarios

That's not correct

19 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

¿Cuál es la probabilidad de que el sujeto seleccionado NO esté enfermo dado que NO fuma?

A 0.500

B 0.818

C 0.909

Incorrecta:
0.182

Comentarios

That's not correct

20 **OPCIÓN MÚLTIPLE** INCORRECTO

En la misma tabla, P(F) es:

Incorrecta:
60/180

B 80/180

C 70/180

D 110/180

Comentarios

That's not correct