

## Physique des particules – L3

## TD 6 (correction)

**Exercice 1 : Section efficace différentielle**

1. Pour passer d'un référentiel à l'autre on effectue un boost  $\Lambda$  selon  $\vec{e}_z$  donc les coordonnées selon  $\vec{e}_x$  et  $\vec{e}_y$  sont inchangées, en particulier pour  $p_1 = \Lambda p_1^*$  :

$$|\vec{p}_1|(\sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y) = |\vec{p}_1^*|(\sin \theta^* \cos \phi^* \vec{e}_x + \sin \theta^* \sin \phi^* \vec{e}_y). \quad (1)$$

Cela entraîne en effet  $\phi = \phi^*$  (mais aussi  $|\vec{p}_1| \sin \theta = |\vec{p}_1^*| \sin \theta^*$ ).

2. On a

$$s = (p_a^* + p_b^*)^2 = p_a^{*2} + 2p_a \cdot p_b + p_b^{*2} = m_a^2 + 2E_a^* E_b^* + 2\vec{p}_i^{*2} + m_b^2 \quad (2)$$

soit

$$E_a^* E_b^* = \frac{s - m_a^2 - m_b^2}{2} - \vec{p}_i^{*2} \implies (m_a^2 + \vec{p}_i^{*2})(m_b^2 + \vec{p}_i^{*2}) = \left( \frac{s - m_a^2 - m_b^2}{2} - \vec{p}_i^{*2} \right)^2 \quad (3)$$

donc

$$|\vec{p}_i^*| = \frac{\sqrt{(s - (m_a + m_b)^2)(s - (m_a - m_b)^2)}}{2\sqrt{s}}. \quad (4)$$

On a aussi

$$s = (p_a + p_b)^2 = m_a^2 + 2E_a m_b + m_b^2 \iff E_a = \frac{s - m_a^2 - m_b^2}{2m_b}. \quad (5)$$

Enfin

$$\vec{p}_a^2 = E_a^2 - m_a^2 = \frac{(s - (m_a + m_b)^2)(s - (m_a - m_b)^2)}{4m_b^2} \iff m_b |\vec{p}_a| = \sqrt{s} |\vec{p}_i^*|. \quad (6)$$

3. On a  $t = (p_a^* - p_1^*)^2 = m_a^2 - 2(E_a^* E_1^* - |\vec{p}_i^*| |\vec{p}_f^*| \cos \theta^*) + m_1^2$ . Les valeurs de  $E_a^*$ ,  $E_1^*$ ,  $|\vec{p}_i^*|$  et  $|\vec{p}_f^*|$  sont fixées par la conservation de l'énergie impulsion, donc indépendantes de  $\theta^*$  et  $\phi^*$ , par conséquent

$$dt = 2|\vec{p}_i^*| |\vec{p}_f^*| d\cos \theta^*. \quad (7)$$

On en déduit (on rappelle que  $\phi = \phi^*$  et que  $d\Omega^* = -d\cos \theta^* d\phi^*$ )

$$\frac{d\sigma}{dt d\phi} = \frac{d\sigma}{d\Omega^*} \left| \frac{d\Omega^*}{dt d\phi} \right| = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2 |\vec{p}_f^*|}{64\pi^2 s |\vec{p}_i^*| 2|\vec{p}_i^*| |\vec{p}_f^*|} \frac{1}{2|\vec{p}_i^*| |\vec{p}_f^*|} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{128\pi^2 s \vec{p}_i^{*2}}. \quad (8)$$

La valeur absolue n'est là que par convention parce que l'on veut que le résultat soit positif : c'est une densité que l'on calcule.

4. Pour la première partie de la question il suffit d'écrire  $t$  dans le référentiel du laboratoire de deux façons différentes,

$$t = (p_b - p_2)^2 = (p_a - p_1)^2, \quad (9)$$

puis de développer les carrés en utilisant le fait que  $\vec{p}_b = \vec{0}$  et que  $\vec{p}_a \cdot \vec{p}_1 = |\vec{p}_a||\vec{p}_1| \cos \theta$  :

$$t = m_2^2 - 2E_b E_2 + m_b^2 = m_a^2 + m_1^2 - 2E_1 E_a + 2|\vec{p}_a||\vec{p}_1| \cos \theta, \quad (10)$$

et enfin d'utiliser le fait que  $E_b = m_b$  et la conservation de l'énergie  $E_2 = E_a + E_b - E_1$  pour obtenir

$$t = m_2^2 - m_b^2 + 2m_b(E_1 - E_a) = m_a^2 + m_1^2 - 2E_1 E_a + 2|\vec{p}_a||\vec{p}_1| \cos \theta. \quad (11)$$

On veut ensuite prendre une variation infinitésimale des égalités précédentes, il faut se rappeler que  $E_a$  est fixée (on l'a calculée à la question 2.) mais que  $E_1$  et  $|\vec{p}_1| = \sqrt{E_1^2 - m_1^2}$  ne le sont pas. Cela donne

$$dt = 2m_b dE_1 = -2E_a dE_1 + 2|\vec{p}_a| \frac{d|\vec{p}_1|}{dE_1} dE_1 \cos \theta + 2|\vec{p}_a||\vec{p}_1| d\cos \theta. \quad (12)$$

Puisque  $d|\vec{p}_1|/dE_1 = E_1/|\vec{p}_1|$ , la deuxième égalité implique bien

$$\frac{dE_1}{d\cos \theta} = \frac{|\vec{p}_a||\vec{p}_1|^2}{(E_a + m_b)|\vec{p}_1| - E_1|\vec{p}_a| \cos \theta}. \quad (13)$$

5. En utilisant les résultats des questions précédentes et le fait que  $dt = 2m_b dE_1$  on obtient

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma}{dt d\phi} \frac{dt}{dE_1} \frac{dE_1}{d\cos \theta} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{128\pi^2 s \vec{p}_i^{*2}} \times 2m_b \times \frac{|\vec{p}_a||\vec{p}_1|^2}{(E_a + m_b)|\vec{p}_1| - E_1|\vec{p}_a| \cos \theta}. \quad (14)$$

Comme en outre  $s \vec{p}_i^{*2} = m_b^2 \vec{p}_a^2$  (d'après la question 2.) c'est bien le résultat demandé. Dans cette formule il faut bien noter que non seulement  $|\mathcal{M}_{fi}|^2$  mais aussi  $E_1$  et  $\vec{p}_1^2 = E_1^2 - m_1^2$  sont des fonctions de  $\theta$ .

6. Dans ce cas de figure on a

$$m_b = m_p, \quad |\vec{p}_1| \approx E_1, \quad |\vec{p}_a| \approx E_a \quad (15)$$

et l'équation (11) implique

$$E_1 \approx \frac{m_b |\vec{p}_a|}{E_a + m_p - E_a \cos \theta}. \quad (16)$$

La section efficace différentielle se simplifie alors en effet en

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{64\pi^2} \frac{1}{(E_a + m_p - E_a \cos \theta)^2} \quad (17)$$

où la seule dépendance implicite en  $\theta$  provient de  $|\mathcal{M}_{fi}|^2$ .

## Exercice 2

1. Dans la limite non relativiste on a

$$E = \gamma m = \frac{m}{\sqrt{1 - \vec{v}^2}} \approx m \left( 1 + \frac{\vec{v}^2}{2} \right), \quad \vec{p} = \gamma m \vec{v} \approx m \vec{v}. \quad (18)$$

Par conséquent

$$p_a \cdot p_b = E_a E_b - \vec{p}_a \cdot \vec{p}_b \approx m_a m_b \left( 1 + \frac{\vec{v}_a^2 + \vec{v}_b^2 - 2\vec{v}_a \cdot \vec{v}_b}{2} \right) = m_a m_b \left( 1 + \frac{(\vec{v}_a - \vec{v}_b)^2}{2} \right) \quad (19)$$

et

$$F = \sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2} \approx m_a m_b |\vec{v}_a - \vec{v}_b|. \quad (20)$$

2. On commence par remarquer que (on rappelle que  $\vec{v} = \vec{p}/E$  pour une particule libre)

$$\begin{aligned} E_a^2 E_b^2 (\vec{v}_a - \vec{v}_b)^2 - (p_a \cdot p_b)^2 &= E_b^2 \vec{p}_a^2 - 2E_a E_b \vec{p}_a \cdot \vec{p}_b + E_a^2 \vec{p}_b^2 - (E_a^2 E_b^2 - 2E_a E_b \vec{p}_a \cdot \vec{p}_b + (\vec{p}_a \cdot \vec{p}_b)^2) \\ &= E_b^2 \vec{p}_a^2 + E_a^2 \vec{p}_b^2 - E_a^2 E_b^2 - (\vec{p}_a \cdot \vec{p}_b)^2 \\ &= (m_b^2 + \vec{p}_b^2) \vec{p}_a^2 + (m_a^2 + \vec{p}_a^2) \vec{p}_b^2 - (m_a^2 + \vec{p}_a^2)(m_b^2 + \vec{p}_b^2) - (\vec{p}_a \cdot \vec{p}_b)^2 \\ &= \vec{p}_a^2 \vec{p}_b^2 - (\vec{p}_a \cdot \vec{p}_b)^2 - m_a^2 m_b^2. \end{aligned}$$

Si les impulsions des deux particules sont colinéaires alors  $\vec{p}_a \cdot \vec{p}_b = \pm |\vec{p}_a| |\vec{p}_b|$  et on a bien

$$E_a^2 E_b^2 (\vec{v}_a - \vec{v}_b)^2 = (p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2 = F^2. \quad (21)$$

3. Dans le référentiel du centre de masse les deux impulsions sont opposées donc colinéaires et le résultat de la question précédente entraîne

$$F = E_a^* E_b^* (|\vec{v}_a^*| + |\vec{v}_b^*|) = E_a^* E_b^* \left( \frac{|\vec{p}^*|}{E_a^*} + \frac{|\vec{p}^*|}{E_b^*} \right) = (E_a^* + E_b^*) |\vec{p}^*| = \sqrt{s} |\vec{p}^*|. \quad (22)$$