

Physique des particules – L3

TD 6

Exercice 1 : Section efficace différentielle

On considère un processus du type $a + b \rightarrow 1 + 2$ dans deux référentiels différents : le référentiel du laboratoire (4-impulsions p_a, p_b , etc.) dans lequel la particule b est immobile (on étudie des collisions sur une cible fixe) et la particule a a une impulsion selon \vec{e}_z et le référentiel du centre de masse (4-impulsions p_a^*, p_b^* , etc.). On repère \vec{p}_1 par les angles (θ, ϕ) tels que

$$\vec{p}_1 = |\vec{p}_1|(\sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z) \quad (1)$$

et de même pour \vec{p}_1^* et les angles (θ^*, ϕ^*) .

On s'intéresse dans cet exercice à la distribution angulaire de la section efficace dans le référentiel du laboratoire c'est-à-dire à

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\text{nombre de particules 1 produites dans la direction } d\Omega \text{ par unité de temps}}{(\text{nombre de particules } b) \times (\text{flux incident } a)}. \quad (2)$$

Elle vérifie en particulier $\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega$. D'après ce qui a été fait en cours, on a

$$\frac{d\sigma}{d\Omega^*} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2 |\vec{p}_f^*|}{64\pi^2 s |\vec{p}_i^*|}. \quad (3)$$

1. Justifier que $\phi = \phi^*$.
2. Montrer que

$$|\vec{p}_i^*| = \frac{\sqrt{(s - (m_a + m_b)^2)(s - (m_a - m_b)^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad E_a = \frac{s - m_a^2 - m_b^2}{2m_b}, \quad m_b |\vec{p}_a| = \sqrt{s} |\vec{p}_i^*|. \quad (4)$$

3. Montrer que $dt = 2|\vec{p}_i^*||\vec{p}_f^*| d\cos \theta^*$ où $t = (p_a - p_1)^2$ est une des variables de Mandelstam et en déduire

$$\frac{d\sigma}{dt d\phi} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{128\pi^2 s |\vec{p}_i^*|^2}. \quad (5)$$

4. Montrer que

$$t = m_2^2 - m_b^2 + 2m_b(E_1 - E_a) = m_a^2 + m_1^2 - 2E_1 E_a + 2|\vec{p}_a||\vec{p}_1| \cos \theta \quad (6)$$

et en déduire

$$\frac{dE_1}{d\cos \theta} = \frac{|\vec{p}_a||\vec{p}_1|^2}{(E_a + m_b)|\vec{p}_1| - E_1|\vec{p}_a| \cos \theta}. \quad (7)$$

5. Montrer que

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{64\pi^2} \frac{|\vec{p}_1|^2}{m_b|\vec{p}_a|} \frac{1}{(E_a + m_b)|\vec{p}_1| - E_1|\vec{p}_a|\cos\theta}. \quad (8)$$

6. Montrer que lorsque l'on considère la diffusion élastique $e^-p \rightarrow e^-p$ (c'est-à-dire $a = 1 = e^-$ et $b = 2 = p$) avec $E_a \gg m_e$ et $E_1 \gg m_e$, la formule précédente se simplifie en

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{64\pi^2} \frac{1}{(E_a + m_p - E_a \cos\theta)^2}. \quad (9)$$

Exercice 2

Pour deux particules libres a et b on définit

$$F = \sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2}. \quad (10)$$

1. Justifier que dans la limite non-relativiste $F \approx m_a m_b |\vec{v}_a - \vec{v}_b|$.
2. Montrer que si \vec{p}_a et \vec{p}_b sont colinéaires on a $F = E_a E_b |\vec{v}_a - \vec{v}_b|$.
3. Montrer que $F = \sqrt{s} |\vec{p}^*|$ où $s = (p_a + p_b)^2$ et $|\vec{p}^*|$ est la norme de l'impulsion dans le référentiel du centre de masse.