

EL DOLOR OCASIONADO POR HERPES ZÓSTER:

PUEDE SENTIRSE COMO **DESCARGAS ELÉCTRICAS EN EL CUERPO***

*Basado en testimonios reales de pacientes. Los síntomas del Herpes Zóster pueden variar.



¿QUÉ ES EL HERPES ZÓSTER?

El Herpes Zóster, también conocido como culebrilla, es una enfermedad causada por la reactivación del Virus de la Varicela Zóster (VVZ), el mismo virus que causa la Varicela.

Luego de que una persona contrae Varicela, el virus permanece latente en su sistema nervioso.

A mayor edad se produce un debilitamiento del sistema inmune que puede aumentar el riesgo de que el virus se reactive.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Generalmente los primeros síntomas del Herpes Zóster son picazón, dolor, hormigueo, sensación molesta o sensibilidad al tacto en el tórax, el abdomen o el rostro.

Tras los primeros días, comienza la fase aguda de la enfermedad, en la que aparece la erupción cutánea, con ampollas en las zonas afectadas, acompañadas de un dolor agudo . Al cabo de unos 10 días, las ampollas se convierten en costras que, normalmente, duran entre 2 y 4 semanas.

¿ESTÁS EN RIESGO DE DESARROLLAR HERPES ZÓSTER?

Estás en riesgo si:

- Ya tuviste varicela*: todas las personas que tuvieron varicela, ya llevan el virus del Herpes Zóster en su cuerpo. 1 de cada 3 lo manifestará a lo largo de su vida.
- Tenés 50 años o más: a partir de los 50 años las celulas del sistema inmune se debilitan, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad.
- Si tenés otros factores de riesgo como por ejemplo, enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o el consumo de corticoides.
 Asimismo, otras condiciones, como enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, Asma), la diabetes, el estrés y la fatiga, pueden favorecer también la reactivación del Herpes Zóster.

¿CÓMO PUEDE EL HERPES ZÓSTER AFECTAR TU VIDA?

El Herpes Zóster puede alterar tus actividades cotidianas durante semanas e incluso meses.

¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES?

Algunas personas pueden experimentar complicaciones, tales como:

- Neuralgia Posherpética (PHN): una vez que desaparece la erupción por Herpes Zóster, el dolor neurálgico puede durar meses e incluso años, sobre el área donde se manifestó la erupción.
- Enfermedad ocular: las complicaciones oculares se manifiestan en algunas personas con Herpes Zóster Oftálmico (HZO). Las secuelas prolongadas o permanentes pueden dar lugar a pérdida de la visión.
- Alteraciones auditivas: el Herpes Zóster puede afectar el sistema auditivo y causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado (sindrome de Ramsay Hunt).

^{*}Basado en testimonios reales de pacientes. Los síntomas del Herpes Zóster pueden variar.

⁻ Harpaz R, et al. MMWR Recomm Rep. 2008 June;57(RR-5):1-30

⁻ Mueller NH et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. -Neurologic Clinics. 2008;26:675-697

-Chen SY, Suaya JA, Li D, et al. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection. 2014;42(2):325-334. doi:10.1007/s15010-013-0550-8

-Marra F, Parhar K, Huang B, Vadlamudi N, Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis.8:nbsp:0pen Forum Infect Dis. 2020;7(1):ofaa005. Published
2020 Jan 9. doi:10.1093/orlid/ofaa005



ACTIVÁ ANTES DE QUE EL HERPES ZÓSTER SE REACTIVE.

CONSULTÁ CON TU MÉDICO O MÉDICA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER





