

Cálculo II para Economia

Professora: Yunelsy N Alvarez

Monitores: Guilherme A. Cota e Marcos A. Alves



Lista 6. Derivadas parciais

Objetivos

- Compreender o conceito de derivada parcial de uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ em relação a uma variável, mantendo as demais constantes.
- Interpretar geometricamente a derivada parcial como a taxa de variação da função ao longo de uma direção coordenada.
- Ser capaz de calcular derivadas parciais utilizando regras de diferenciação: soma, produto, quociente, cadeia, e derivadas de funções elementares.
- Aplicar as derivadas parciais ao estudo local do comportamento de funções de múltiplas variáveis.

Exercício 6.1.

Seja $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$. Calcular as derivadas parciais de f pela definição.

Solução.

Em relação a x :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-((x+h)^2+y^2)} - e^{-(x^2+y^2)}}{h} \\ &= e^{-(x^2+y^2)} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-(2xh+h^2)} - 1}{h} = e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x) = -2xe^{-(x^2+y^2)}.\end{aligned}$$

Em relação a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2ye^{-(x^2+y^2)}.$$

□

Exercício 6.2.

Calcule $\frac{\partial h}{\partial y}(x, y)$ para a função do Exemplo 6.7:

$$h(x, y) = \cos(x^2 + y) + \sin(xy).$$

Solução.

Primeiro, escrevemos:

$$\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} [\cos(x^2 + y) + \sin(xy)]$$

Derivando cada termo separadamente:

Para o termo $\cos(x^2 + y)$, usamos a regra da cadeia:

$$\frac{\partial}{\partial y} \cos(x^2 + y) = -\sin(x^2 + y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y)$$

Como x^2 é constante em relação a y , temos $\frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y) = 1$, então:

$$= -\sin(x^2 + y)$$

Para o termo $\sin(xy)$, também aplicamos a regra da cadeia:

$$\frac{\partial}{\partial y} \sin(xy) = \cos(xy) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (xy)$$

Como $\frac{\partial}{\partial y} (xy) = x$, resulta:

$$= x \cos(xy)$$

Assim, juntando tudo:

$$\boxed{\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = -\sin(x^2 + y) + x \cos(xy)}$$

□

Exercício 6.3.

Calcule $\frac{\partial h}{\partial y}(x, y)$ para a função do Exemplo 6.8:

$$h(x, y) = \ln((x + y)^2 + (xy)^2).$$

Solução.

Usamos a regra da cadeia para o logaritmo:

$$\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{(x + y)^2 + (xy)^2} \cdot \frac{\partial}{\partial y} [(x + y)^2 + (xy)^2]$$

Derivando $(x + y)^2$ em relação a y :

$$\frac{\partial}{\partial y} (x + y)^2 = 2(x + y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (x + y) = 2(x + y) \cdot 1 = 2(x + y)$$

Derivando $(xy)^2$ em relação a y :

$$\frac{\partial}{\partial y} (xy)^2 = 2xy \cdot \frac{\partial}{\partial y} (xy) = 2xy \cdot x = 2x^2y$$

Somando as derivadas:

$$2(x + y) + 2x^2y$$

Assim,

$$\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = \frac{2(x+y) + 2x^2y}{(x+y)^2 + (xy)^2}$$

□

Exercício 6.4.

Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função.

- (a) $f(x, y) = y^5 - 3xy$
- (b) $z = (2x + 3y)^{10}$
- (c) $w = \ln(x + 2y + 3z)$
- (d) $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

Solução.

- (a) $f_x(x, y) = 0 - 3y = -3y$, $f_y(x, y) = 5y^4 - 3x$.
- (b) $\frac{\partial z}{\partial x} = 10(2x + 3y)^9 \cdot 2 = 20(2x + 3y)^9$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 10(2x + 3y)^9 \cdot 3 = 30(2x + 3y)^9$.
- (c) $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{x+2y+3z}$, $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{2}{x+2y+3z}$, $\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{3}{x+2y+3z}$.
- (d) Para cada $i = 1, \dots, n$, $u_{x_i} = \frac{1}{2} (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)^{-1/2} (2x_i) = \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}}$.

□

Exercício 6.5.

Para cada uma das funções a seguir, responda aos itens:

- (a) Calcule suas derivadas parciais.
- (b) Determine o domínio da função e das suas derivadas parciais. Compare.
- (c) Determine a imagem da função e das suas derivadas parciais. Compare.

Funções:

$$(1) f(x, y) = \frac{e^{x^2 - y^2}}{2x}$$

$$(2) \quad g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

$$(3) \quad h(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$$

$$(4) \quad k(x, y, z) = \frac{\ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Solução.

1. Para $f(x, y) = \frac{e^{x^2 - y^2}}{2x}$

(a) Derivadas parciais:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^{x^2 - y^2}}{2x} \right)$$

Usando a regra do quociente:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x e^{x^2 - y^2} \cdot 2x - e^{x^2 - y^2} \cdot 2}{(2x)^2}$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{2x \cdot 2x e^{x^2 - y^2} - 2e^{x^2 - y^2}}{4x^2} \\ &= \frac{4x^2 e^{x^2 - y^2} - 2e^{x^2 - y^2}}{4x^2} = \frac{e^{x^2 - y^2} (4x^2 - 2)}{4x^2} \\ &= e^{x^2 - y^2} \frac{2x^2 - 1}{2x^2} \end{aligned}$$

Agora, a parcial em y:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{1}{2x} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (e^{x^2 - y^2}) = \frac{1}{2x} \cdot e^{x^2 - y^2} \cdot (-2y) \\ &= -\frac{y}{x} e^{x^2 - y^2} \end{aligned}$$

(b) Domínio:

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$$

As derivadas parciais têm o mesmo domínio, pois também há divisão por x :

$$D \frac{\partial f}{\partial x} = D \frac{\partial f}{\partial y} = D f$$

Assim, os domínios coincidem.

- (c) **Imagem:** Como $e^{x^2-y^2} > 0$ para todo x, y , o valor de f pode ser qualquer valor real não-nulo, visto que x pode ser negativo ou positivo pequeno/grande, e y livre:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

As derivadas parciais também podem assumir qualquer valor real, pois não há barreira para seus valores conforme varia x, y .

$$\text{Im}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \mathbb{R}$$

Imagens também coincidem.

2. **Para** $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$

- (a) **Derivadas parciais:**

Para x :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x} &= \frac{2xy(x^2 + y^2) - x^2 y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy(x^2 + y^2) - 2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{2xyx^2 + 2xyy^2 - 2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xyy^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Para y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial y} &= \frac{x^2(x^2 + y^2) - x^2 y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 x^2 + x^2 y^2 - 2x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^4 - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

- (b) **Domínio:**

$$D_g = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

As derivadas parciais são definidas para o mesmo domínio, pois o denominador é $(x^2 + y^2)^2$:

$$D \frac{\partial g}{\partial x} = D \frac{\partial g}{\partial y} = D_g$$

Domínios coincidem.

- (c) **Imagem:** O valor de $g(x, y)$ pode ser arbitrariamente grande em módulo, tomando, por exemplo, y grande e fixando x , ou $x \neq 0$ e $y \rightarrow 0$. A imagem é, portanto:

$$\text{Im}(g) = \mathbb{R}$$

As derivadas parciais possuem as seguintes imagens:

$$\text{Im}\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right) = [-1, 1]$$

3. **Para** $h(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$

- (a) **Derivadas parciais:**

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}}$$

Analogamente,

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}}, \quad \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}}$$

- (b) **Domínio:** Como o radicando é sempre maior ou igual a 1, temos domínio em todo \mathbb{R}^3 :

$$D_h = \mathbb{R}^3$$

As derivadas parciais também estão definidas em todo \mathbb{R}^3 .

$$D \frac{\partial h}{\partial x} = D \frac{\partial h}{\partial y} = D \frac{\partial h}{\partial z} = D_h$$

(c) **Imagem:** O menor valor de h é quando $x = y = z = 0$:

$$h(0,0,0) = 1$$

Para valores arbitrariamente grandes de x, y, z , h tende ao infinito.

$$\text{Im}(h) = [1, +\infty[$$

As derivadas parciais estão limitadas: Para (x, y, z) grandes e positivos (negativos), o numerador se aproxima de 1 (-1), portanto

$$\text{Im}\left(\frac{\partial h}{\partial x}\right) = (-1, 1)$$

4. Para $k(x, y, z) = \frac{\ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2}$

(a) **Derivadas parciais:** Seja $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial k}{\partial x} &= \frac{\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}(x^2 + y^2 + z^2) - \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \\ &= \frac{2x(x^2 + y^2 + z^2) - 2x \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)(x^2 + y^2 + z^2)} \\ &= \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} \left(1 - \frac{\ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2} \right) \end{aligned}$$

As demais derivadas parciais seguem o mesmo padrão trocando x por y ou z .

(b) **Domínio:**

$$D_k = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \neq 0\}$$

Ou seja, todos exceto a origem. As derivadas parciais têm o mesmo denominador nulo na origem, então:

$$D \frac{\partial k}{\partial x} = D \frac{\partial k}{\partial y} = D \frac{\partial k}{\partial z} = D_k$$

(c) **Imagem:** Para $x^2 + y^2 + z^2$ tendendo a zero:

$$k(x, y, z) \rightarrow 1$$

Para $x^2 + y^2 + z^2$ grande,

$$k \rightarrow 0$$

Logo,

$$D_k = (0, 1)$$

As derivadas parciais podem assumir:

$$\text{Im} \left(\frac{\partial k}{\partial x} \right) = \text{Im} \left(\frac{\partial k}{\partial y} \right) = \text{Im} \left(\frac{\partial k}{\partial z} \right) = (-1, 1)$$

□

Exercício 6.6.

Cobb e Douglas usaram a equação $P(L, K) = 1,01L^{0,75}K^{0,25}$ para o modelo de economia norte-americana de 1899 a 1922, onde L é a quantidade de trabalho e K , a quantidade de capital.

- (a) Calcule $P_L = \frac{\partial P}{\partial L}$ e $P_K = \frac{\partial P}{\partial K}$.
- (b) Encontre a produtividade marginal de trabalho e a produtividade marginal de capital no ano de 1920, quando $L = 194$ e $K = 407$ (em comparação com os valores atribuídos $L = 100$ e $K = 100$ em 1899). Interprete os resultados considerando que P , L e K são expressos em porcentagem em relação a 1899.
- (c) No ano de 1920, o que trouxe mais benefícios para a produção: um aumento no capital de investimento ou um aumento nos gastos com mão de obra?

Solução.

(a)

$$P(L, K) = 1,01L^{0,75}K^{0,25}$$

Assim,

$$P_L(L, K) = 1,01 \left(0,75L^{-0,25} \right) K^{0,25} = 0,7575L^{-0,25} K^{0,25}$$

e

$$P_K(L, K) = 1,01L^{0,75} \left(0,25K^{-0,75} \right) = 0,2525L^{0,75} K^{-0,75}$$

(b) A produtividade marginal do trabalho em 1920 é

$$P_L(194, 407) = 0,7575 \times (194)^{-0,25} \times (407)^{0,25} \approx 0,912$$

Lembrando que P , L e K são expressos em porcentagem em relação a 1899, isso significa que, em 1920, se a quantidade de trabalho aumentar, a produção aumenta a uma taxa de aproximadamente 0,912 pontos percentuais por ponto percentual de aumento no trabalho.

A produtividade marginal do capital em 1920 é

$$P_K(194, 407) = 0,2525 \times (194)^{0,75} \times (407)^{-0,75} \approx 0,145$$

Portanto, um aumento no capital leva a produção a aumentar a uma taxa de cerca de 0,145 pontos percentuais por ponto percentual de aumento no capital.

(c) O valor de $P_L(194, 407)$ é maior que o valor de $P_K(194, 407)$, sugerindo que, em 1920, aumentar a mão de obra teria aumentado a produção mais do que aumentar o capital.

□