



KIT DIGITAL DE ORGANIZAÇÃO

Meu Primeiro Bebê

O guia completo para pais de primeira viagem se prepararem para a chegada do bebê — sem gastar dinheiro à toa e sem esquecer o que realmente importa.

10 módulos · 10 bônus · informações de saúde conferidas em fontes médicas confiáveis

Como este material foi feito (e o que ele não é)

Este kit é um **organizador**. Ele ajuda vocês a planejar compras, orçamento, casa, documentos, mala e rotina. Nas partes que tocam em saúde, trouxemos o que dizem **fontes médicas reconhecidas** — livros-texto usados na formação de obstetras e pediatras, manuais do Ministério da Saúde e recomendações de sociedades científicas — sempre resumidas com nossas palavras.

Importante

Nada aqui substitui o pré-natal, a consulta com obstetra, pediatra, enfermeira obstetra ou qualquer profissional de saúde. Recomendações mudam com o tempo e cada gestação é única. **Diante de qualquer dúvida ou sinal de alerta, procure a equipe que acompanha vocês ou um serviço de urgência.**

Emergência: **SAMU 192** · Apoio emocional: **CVV 188** (24h, gratuito)

Como ler as marcações

O QUE DIZEM AS FONTES

Caixas azuis resumem o que diz a literatura médica. O número entre colchetes (ex.: **[5]**) aponta para a lista de fontes no final.

Caixas vermelhas são **sinais de alerta**: situações em que se deve procurar atendimento.

Caixas amarelas são dicas práticas para economizar tempo e dinheiro.

Como usar o kit

- **No computador:** imprima as páginas de checklist ou preencha a planilha (arquivo .xlsx).
- **No celular:** abra a versão para celular. Toque em um item para marcá-lo — o celular lembra o que já foi feito. Ótimo para conferir a lista dentro da loja.
- **Em casal:** escolham um dia fixo por semana (15 minutos bastam) para revisar o Planner do Casal.

O que tem neste kit

Produto principal

1. Começou a jornada
2. Planner da gestação
3. O enxoval inteligente
4. Planilha do enxoval
5. Como economizar
6. Mala da maternidade
7. Preparando a casa
8. Guia do pai
9. Primeiros 30 dias
0. Cronograma + documentos e direitos

Parte especial

- Saúde com base em fontes confiáveis
- Fontes consultadas

Bônus

1. Chá de bebê + lista de presentes
2. Organizador e calculadora de fraldas
3. Perguntas para o obstetra/pediatra
4. Cartões da gestação
5. Primeiras vezes + checklist de fotos
6. Lista de contatos
7. Planner semanal do casal
8. Operação Bebê a Caminho
9. Guia de bolso: sinais de alerta
10. Visita à maternidade

Começou a jornada

Parabéns! Agora começa uma nova fase.

O que muda depois da descoberta

A notícia costuma vir junto com uma avalanche: alegria, medo, listas infinitas, palpites de todo mundo. É normal. A boa notícia é que **quase nada precisa ser resolvido nesta semana** — a gestação dura cerca de 40 semanas justamente para dar tempo.

O que resolver primeiro

1. **Iniciar o pré-natal.** É a prioridade número 1 — o resto pode esperar.
2. **Criar uma pasta de documentos** (física e digital) para exames, cartão da gestante e receitas.
3. **Conversar sobre dinheiro** antes de comprar qualquer coisa.

O QUE DIZEM AS FONTES

O Ministério da Saúde orienta iniciar o pré-natal **o mais cedo possível, idealmente até a 12ª semana**, com no mínimo 6 consultas [\[1\]\[19\]](#). A OMS recomenda pelo menos **8 contatos** com a equipe ao longo da gestação [\[3\]](#).

A suplementação de **ácido fólico** é recomendada desde antes da concepção até o fim do 1º trimestre para reduzir o risco de defeitos do tubo neural; dose e duração são definidas pelo profissional [\[1\]\[5\]](#).

O que pode esperar

Quarto decorado, carrinho, chá de bebê, roupinhas de tamanhos maiores. Nada disso precisa acontecer no 1º trimestre.

Checklist de largada

- ☐ Confirmar acompanhamento pré-natal (UBS, convênio ou particular)
- ☐ Pegar a Caderneta da Gestante e levá-la a todas as consultas
- ☐ Criar pasta de documentos (física + pasta no celular/nuvem)
- ☐ Organizar exames e datas de consultas em um calendário compartilhado
- ☐ Definir orçamento total para a chegada do bebê
- ☐ Conversar sobre licença-maternidade/paternidade com RH ou contador

☐ Verificar a cobertura obstétrica do plano de saúde (se houver)

☐ Começar o planejamento do enxoval (sem comprar ainda!)

☐ Pesquisar maternidades

☐ Criar lista de contatos importantes (Bônus 6)

Planner da gestação

A gestação é dividida em três trimestres. Cada um tem seu foco — e sua lista.

O QUE DIZEM AS FONTES

Ritmo das consultas de pré-natal (gestação de risco habitual) segundo o Ministério da Saúde [1]
[19]:

- até 28 semanas: consultas **mensais**;
- de 28 a 36 semanas: **quinzenais**;
- de 36 semanas até o parto: **semanais**.

A gestação é considerada **a termo entre 37 e 41 semanas e 6 dias**. A "data provável do parto" é uma estimativa: poucos bebês nascem exatamente nela [5][6].

1º trimestre (até 13 semanas)

- ☐ Primeira consulta de pré-natal
- ☐ Exames solicitados pela equipe (anote datas e resultados)
- ☐ Suplementação conforme prescrição
- ☐ Documentos: Caderneta da Gestante, cartão SUS/convênio
- ☐ Planejamento financeiro inicial (Módulo 4)
- ☐ Começar a pesquisar maternidades
- ☐ Rever medicamentos de uso contínuo com o médico

2º trimestre (14 a 27 semanas)

- ☐ Definir onde o bebê vai dormir nos primeiros meses
- ☐ Começar o enxoval — primeiro os itens  essenciais
- ☐ Pesquisar carrinho
- ☐ Pesquisar bebê-conforto adequado ao peso do recém-nascido e ao seu carro
- ☐ Planejar chá de bebê (Bônus 1)
- ☐ Revisar orçamento
- ☐ Perguntar sobre vacinas da gestação na consulta

☐ Anotar a data em que sentiu o bebê mexer pela primeira vez (Bônus 5)

3º trimestre (28 semanas até o parto)

☐ Lavar e organizar as roupinhas

☐ Finalizar o enxoval

☐ Arrumar a mala da maternidade (pronta até 34–36 semanas)

☐ Organizar documentos em uma pasta única

☐ Planejar transporte até a maternidade (e um plano B)

☐ Instalar o bebê-conforto conforme o manual do fabricante

☐ Preparar a casa (Módulo 7)

☐ Conhecer a maternidade / fazer a visita (Bônus 10)

☐ Conversar com a equipe sobre plano de parto e sinais de trabalho de parto

Exames, vacinas e movimentos do bebê

Não é para decorar — é para vocês reconhecerem os nomes quando aparecerem no pedido médico.

Quem decide o que pedir e quando é a equipe de pré-natal.

O QUE DIZEM AS FONTES

Exames que costumam aparecer no pré-natal [1][5][6][19]: hemograma; tipagem sanguínea e fator Rh; glicemia de jejum e, entre 24 e 28 semanas, teste de tolerância à glicose (curva glicêmica); testes para sífilis, HIV e hepatites B e C; toxoplasmose; exame de urina e urocultura; ultrassonografias. Em muitos serviços também se pesquisa o estreptococo do grupo B no fim da gestação.

Exame	Data	Resultado / observação	Mostrei ao médico?
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Vacinas da gestação

O QUE DIZEM AS FONTES

O Calendário Nacional de Vacinação da gestante inclui [13][18]:

- **dTpa** (difteria, tétano e coqueluche): **a cada gestação**, a partir da 20ª semana — protege o bebê contra a coqueluche nos primeiros meses;
- **Influenza** (gripe): na campanha anual, em qualquer fase da gestação;
- **Hepatite B**: completar o esquema se não estiver vacinada;
- **VSR** (vírus sincicial respiratório, principal causador de bronquiolite): **dose única a partir de 28 semanas**, em cada gestação — incorporada ao SUS em 2025;
- **Covid-19**: conforme o calendário vigente.

O calendário é atualizado com frequência. Confirme na UBS ou com o obstetra.

Vacina	Data	Local	Registrada na caderneta?
dTpa			☐
Influenza			☐
Hepatite B			☐
VSR			☐
Covid-19			☐

Movimentos do bebê

O QUE DIZEM AS FONTES

Na primeira gestação, a mãe costuma começar a perceber os movimentos entre **18 e 22 semanas** (às vezes um pouco antes ou depois) [5][6]. No 3º trimestre, cada bebê cria seu próprio padrão. A orientação dos manuais é: **a mãe conhece o padrão do seu bebê; se os movimentos diminuírem ou pararem, procure atendimento no mesmo dia — não espere até a próxima consulta** [1][5].



Sinais de alerta na gestação

Estes sinais aparecem na Caderneta da Gestante e nos principais livros de obstetrícia como motivos para **procurar atendimento imediatamente** [1][5][6][7]:

- Sangramento pela vagina
- Perda de líquido (água) pela vagina
- Dor de cabeça forte ou que não passa, visão embaçada, pontos brilhantes na visão
- Inchaço repentino no rosto, nas mãos ou nas pernas
- Dor forte na barriga ou no alto do abdome (“boca do estômago”)
- Contrações regulares **antes de 37 semanas**
- Bebê mexendo menos ou parando de mexer
- Febre, calafrios, ardência ao urinar
- Falta de ar, dor no peito, desmaio ou convulsão
- Vômitos que não deixam comer nem beber
- Tristeza profunda, desesperança ou pensamentos de se machucar

E como saber se é trabalho de parto?



O QUE DIZEM AS FONTES

Sinais que costumam indicar trabalho de parto [1][5][6]: contrações **ritmadas**, que ficam mais fortes, mais longas e mais próximas e **não passam com repouso**; perda do tampão mucoso (pode acontecer dias antes); rompimento da bolsa. Contrações irregulares que somem com repouso costumam ser de “treinamento” (Braxton Hicks).

Combinem com a equipe, antes, quando ir para a maternidade. Se a bolsa romper, observe a cor do líquido (claro, esverdeado ou com sangue) e procure a maternidade.

Minha maternidade de referência	
Telefone	
Quando a equipe orientou ir	

O enxoval inteligente

Em vez de uma lista gigante, cada item tem uma cor. Comece pelo verde.

 ESSENCIAL	Precisa estar em casa quando o bebê chegar.
 IMPORTANTE	Facilita muito a rotina, mas dá para esperar algumas semanas.
 PODE ESPERAR	Só vai ser usado daqui a meses.
 PENSE ANTES	Pouco usado por muitas famílias — ou desaconselhado por questões de segurança.

Roupinhas

As quantidades são **estimativas flexíveis**: dependem do clima, de quantas vezes vocês lavam roupa por semana, do tamanho do bebê ao nascer e do que vão ganhar. Bebês grandes podem usar pouco (ou nada) do tamanho RN — compre pouco RN e mais P.

Item	Sugestão RN	Sugestão P	M	G	Já tenho	Falta
 Body manga curta	3–4	5–6			☐	
 Body manga longa	3–4	5–6			☐	
 Macacão	2–3	4–5			☐	
 Calça (com pé ou culote)	2–3	4–5			☐	
 Meias	3 pares	4–6 pares			☐	
 Toucas	1–2	1–2			☐	
 Manta / cueiro	2–3				☐	
 Casaquinho	1–2	2			☐	
 Fraldas de pano (boca)	8–12				☐	
 Sapatinho	Dispensável até o bebê andar				☐	

Prefira roupas de algodão, com abertura fácil (botões de pressão no meio das pernas poupam muitas trocas completas) e sem cordões, fitas ou botões soltos que possam se soltar.

Higiene, quarto e passeio



Higiene

- | | |
|--|---|
| ☐ ☒ Toalhas com capuz (2–3) | ☐ ☒ Banheira, se a família optar por usar |
| ☐ ☒ Fraldas descartáveis (ver Bônus 2) | ☐ ☒ Cesto para roupas |
| ☐ ☒ Trocador (portátil ou sobre a cômoda) | ☐ ☒ Lixeira com tampa |
| ☐ ☒ Termômetro digital | ☐ ☒ Cortador de unhas / lixa infantil |
| ☐ ☒ Algodão/gaze, conforme orientação | ☐ ☒ Talco |
| ☐ ☒ Sabonete líquido neutro indicado pelo pediatra | ☐ ☒ Perfumes e colônias |
| ☐ ☒ Pomada para assaduras, se o pediatra indicar | ☐ ☒ Aquecedor de lenço umedecido |



O QUE DIZEM AS FONTES

A Academia Americana de Pediatria desaconselha o uso de **talco** em bebês, pelo risco de o pó ser inalado [9]. Para a pele do recém-nascido, a recomendação geral é usar o mínimo de produtos, sem perfume [8][9].



Quarto / sono

- | | |
|---|---|
| ☐ ☒ Berço (ou mini berço) com selo do Inmetro | ☐ ☒ Luz noturna fraca (para mamadas e trocas) |
| ☐ ☒ Colchão firme, do tamanho exato do berço | ☐ ☒ Poltrona de amamentação, se desejada |
| ☐ ☒ Lençóis de elástico (3) | ☐ ☒ Protetor de berço (“kit berço”) |
| ☐ ☒ Cômoda/trocador | ☐ ☒ Travesseiro, almofadas e “posicionadores” |
| ☐ ☒ Guarda-roupa ou organizadores | ☐ ☒ Ninho/redutor para o bebê dormir |
| ☐ ☒ Cortina/persiana (ajuda nas sonecas) | ☐ ☒ Edredom e cobertores soltos |

O QUE DIZEM AS FONTES

As recomendações de **sono seguro** da Academia Americana de Pediatria (2022) e da Sociedade Brasileira de Pediatria orientam que o berço tenha **apenas colchão firme e plano com lençol ajustado** — sem protetores, travesseiros, almofadas, bichos de pelúcia ou cobertores soltos — e desaconselham posicionadores e superfícies inclinadas para dormir [10][11]. Veja a página “Sono seguro” na Parte Especial.

Passeio e transporte

☐  Bebê-conforto (obrigatório no carro)

☐  Sling/canguru ergonômico

☐  Carrinho

☐  Cadeirinha de alimentação

☐  Bolsa de maternidade

☐  Andador

O QUE DIZEM AS FONTES

A Sociedade Brasileira de Pediatria **contraindica o andador**, por estar associado a quedas e acidentes e não ajudar no desenvolvimento da marcha [11].

Alimentação

☐  Almofada de amamentação (opcional)

☐  Esterilizador — só se usar mamadeiras

☐  Absorventes para seios

☐  Chupeta — converse com o pediatra

☐  Mamadeiras — só se houver indicação

O QUE DIZEM AS FONTES

O Ministério da Saúde e a OMS recomendam **aleitamento materno exclusivo até os 6 meses**, sem água, chás ou outros leites, salvo orientação profissional [12]. Por isso mamadeiras e fórmulas não são itens obrigatórios do enxoval. Se houver necessidade, o pediatra orienta.

Antes de comprar: segurança, medidas e compatibilidade

Berço

- ☐ Tem selo do Inmetro (a certificação de berços é obrigatória no Brasil)
- ☐ Espaço entre as grades pequeno o bastante para a cabeça não passar (norma técnica: até cerca de 6,5 cm)
- ☐ Colchão encaixa sem folga — não cabem dois dedos entre o colchão e a lateral
- ☐ Sem peças soltas, lascas, tinta descascando ou recortes decorativos na cabeceira
- ☐ Berço usado: todas as peças originais, sem improvisos

Bebê-conforto

- ☐ Selo do Inmetro e faixa de peso que inclui o recém-nascido
- ☐ Compatível com o seu carro (cinto de 3 pontos ou Isofix) — teste antes de comprar
- ☐ Instalado **voltado para trás**, no **banco traseiro**
- ☐ Dentro do prazo de validade indicado pelo fabricante
- ☐ Usado? Só se souber a história: nunca de carro que sofreu batida

O QUE DIZEM AS FONTES

A Resolução CONTRAN nº 819/2021 determina que crianças de até 1 ano (ou até 13 kg) sejam transportadas em **bebê-conforto voltado para trás**, no banco traseiro [15]. A SBP reforça: nunca transportar o bebê no colo, nem no banco da frente com airbag [11]. Muitas maternidades exigem o bebê-conforto na alta.

Carrinho

- ☐ Reclina totalmente (recém-nascido precisa ficar deitado)
- ☐ Cinto de 5 pontos e freio fácil de acionar
- ☐ Cabe no porta-malas e no elevador/corredor de casa
- ☐ Você consegue fechar com uma mão (teste na loja!)

Lista “não compre antes de pesquisar”

Item	Por quê
Kit berço com protetor	Desaconselhado pelas diretrizes de sono seguro [10]
Ninho, redutor, travesseiro antirrefluxo	Superfícies macias ou inclinadas não são recomendadas para dormir [10]
Andador	Contraindicado pela SBP [11]
Muitas roupas RN	Bebê pode perder o tamanho em poucas semanas
Sapatinho	Não é necessário antes de andar
Esterilizador, aquecedor de mamadeira, extrator elétrico	Depende de como será a alimentação — espere para ver
Babá eletrônica com câmera	Útil para algumas famílias, dispensável para outras (e o bebê deve dormir no quarto dos pais nos primeiros meses) [10]
Banheira com muitos acessórios	Uma banheira simples e estável resolve
Kits “prontos” de loja	Costumam incluir itens que vocês não usariam

MÓDULO 4

Planilha do enxoval

A versão automática está no arquivo **planilha-meu-primeiro-bebe.xlsx** (funciona no Excel, Google Planilhas e LibreOffice). Vocês digitam produto, quantidade e valor — ela calcula todo o resto. Esta página é a versão para imprimir.

Produto	Prioridade	Qtd.	Valor unit.	Total	Comprado?
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐
			R\$	R\$	☐

TOTAL DO ENXOVAL

JÁ GASTAMOS

AINDA FALTA

ORÇAMENTO DISPONÍVEL

DIFERENÇA

Se a diferença ficou negativa, volte aos itens  e .

Além do enxoval: custos que costumam ser esquecidos

☐ Fraldas dos primeiros meses

☐ Consultas e exames (coparticipação do plano)

☐ Medicamentos e vitaminas prescritos

☐ Transporte para consultas

☐ Queda de renda durante a licença (autônomos)

☐ Reserva de emergência

Não compre só porque está escrito BEBÊ 😂

Antes de passar o cartão, respondam juntos:

1. Eu realmente preciso disso?
2. Quantas vezes vou usar? (e por quantos meses?)
3. Posso comprar depois?
4. Posso pegar emprestado ou comprar usado? (exceto itens de segurança sem procedência)
5. Existe uma alternativa mais barata?
6. Cabe no orçamento?

10 truques que funcionam

1. Espere o chá de bebê antes de comprar roupas e fraldas.
2. Compre mais tamanho P do que RN.
3. Fraldas: compre de vários tamanhos aos poucos, não 20 pacotes de uma vez.
4. Grupos de desapego de bairro valem ouro para roupas e brinquedos.
5. Itens “de segurança” (bebê-conforto, berço) — compre novos ou de procedência conhecida.
6. Compare o preço por unidade (fralda, lenço), não por pacote.
7. Evite kits prontos de loja.
8. Crie uma lista de presentes com o que vocês realmente precisam (Bônus 1).
9. Espere para comprar itens de alimentação até saber como vai ser.
10. Sempre que der vontade de comprar algo “fofo”, anote e espere 7 dias.



O QUE DIZEM AS FONTES

Além de ser a recomendação de saúde, o **aleitamento materno** é também a opção mais econômica. Dificuldades são comuns no início e têm solução: a rede de **Bancos de Leite Humano** oferece orientação gratuita [12].

MÓDULO 6



Mala da maternidade

Deixe a mala pronta **entre 34 e 36 semanas** e peça a lista da sua maternidade — cada uma tem regras próprias. Separe em três bolsas (ou três sacos identificados).

Bebê

☐ Bodies (2–3 por dia de internação)

☐ Calças/macacões

☐ Meias e touca

☐ Manta

☐ Fraldas RN (se a maternidade pedir)

☐ Roupas de saída (1 tamanho RN e 1 P)

☐ Fraldas de pano

☐ Itens solicitados pela maternidade

Mãe

☐ Documento com foto, cartão SUS/convênio

☐ **Caderneta da Gestante e exames**

☐ Camisolas/pijamas com abertura na frente

☐ Calcinhas confortáveis (algumas descartáveis)

☐ Absorventes pós-parto

☐ Sutiã de amamentação, se desejado

☐ Chinelo

☐ Higiene pessoal

☐ Roupas para a saída

☐ Carregador (cabo longo)

☐ Itens pessoais (óculos, elástico de cabelo, hidratante labial)

Pai / acompanhante

☐ Documento com foto

☐ Roupas para 1–2 dias

☐ Higiene

☐ Carregador / bateria externa

☐ Dinheiro/cartão

☐ Água e lanches, conforme regras da maternidade

O QUE DIZEM AS FONTES

A Lei nº 11.108/2005 garante à gestante o direito a **um acompanhante de sua escolha** durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no SUS e na rede conveniada [\[16\]](#).



Checklist 48 horas

“Se o parto fosse hoje, está tudo pronto?”

- ☐ Mala no carro ou perto da porta
- ☐ Documentos + Caderneta da Gestante + exames na pasta
- ☐ Transporte combinado (e um plano B: táxi/aplicativo)
- ☐ Caminho até a maternidade testado (inclusive à noite)
- ☐ Contatos salvos no celular dos dois
- ☐ Casa em ordem mínima (louça, lixo, roupa lavada)
- ☐ Bebê-conforto instalado e testado
- ☐ Telefones carregados
- ☐ Pets/plantas: quem cuida?
- ☐ Combinado com a equipe: quando ir para a maternidade



Preparando a casa

Quarto (ou cantinho do bebê no quarto dos pais)

- ☐ Berço montado, colchão firme e lençol ajustado — nada mais dentro
- ☐ Berço longe de janelas, cortinas com cordão e tomadas
- ☐ Roupas lavadas e separadas por tamanho
- ☐ Fraldas organizadas por tamanho
- ☐ Estação de troca com tudo ao alcance da mão



O QUE DIZEM AS FONTES

As diretrizes de sono seguro recomendam que o bebê durma **no quarto dos pais, em berço próprio**, idealmente pelo menos nos primeiros 6 meses [10][11]. Por isso o “quarto do bebê” pode ficar pronto com calma.

Banheiro

- ☐ Toalhas separadas
- ☐ Produtos de higiene em um cesto
- ☐ Termômetro de banho ou teste com o antebraço

Cozinha

- ☐ Espaço para itens do bebê
- ☐ Congelar refeições prontas para as primeiras semanas
- ☐ Garrafa de água grande para quem amamenta

Sala

- ☐ Local confortável para amamentação/alimentação
- ☐ Espaço para o carrinho
- ☐ Cesto “kit de sobrevivência” (fralda, lenço, fralda de pano, carregador, água)

Segurança geral

- ☐ Detector de fumaça / revisão de gás
- ☐ Ambiente livre de fumo (inclusive visitas)
- ☐ Números de emergência na geladeira (Bônus 9)



O QUE DIZEM AS FONTES

A exposição à fumaça de cigarro, na gestação e após o nascimento, é um dos fatores de risco mais consistentes para a morte súbita do lactente [8][10].



Guia do pai

Pai, você não é o ajudante. Você também é pai.

Durante a gravidez

- ☐ Ir às consultas e ultrassons sempre que possível
- ☐ Ler este guia (sim, você também 😊)
- ☐ Assumir tarefas de organização: planilha, pesquisa de preços, documentos
- ☐ Fazer as vacinas em dia (dTpa e gripe protegem o bebê também)
- ☐ Conversar sobre medos e expectativas

Antes do parto

- ☐ Saber o caminho da maternidade (e o plano B)
- ☐ Saber onde estão os documentos
- ☐ Saber onde está a mala
- ☐ Conferir o transporte e o bebê-conforto
- ☐ Ver com o RH a licença-paternidade e os documentos exigidos

No pós-parto

- ☐ **Alimentação:** garantir comida e água para quem amamenta
- ☐ **Casa:** louça, roupa, lixo, compras
- ☐ **Visitas:** ser o “porteiro” — combinar horários e dizer não quando precisar
- ☐ **Bebê:** trocar fralda, dar banho, fazer arrotar, colo, ninar
- ☐ **Apoio emocional:** perceber sinais de cansaço extremo ou tristeza
- ☐ **Divisão das tarefas:** combinar turnos de sono

O QUE DIZEM AS FONTES

Pais também podem ter depressão pós-parto. Estudos estimam que cerca de 1 em cada 10 pais apresenta sintomas no período perinatal [17]. Irritabilidade, isolamento e excesso de trabalho podem ser sinais. Peça ajuda.

Choro que não para

O choro do bebê costuma aumentar nas primeiras semanas, com pico por volta de 6 a 8 semanas, e depois diminuir [8][9]. Se a paciência acabar: **coloque o bebê de barriga para cima no berço, saia do quarto por alguns minutos e respire. Nunca sacuda um bebê** — sacudir pode causar lesões cerebrais graves e permanentes [8][11]. Se o choro for diferente do habitual ou vier com outros sintomas, procure atendimento.

O que fazer quando você não sabe o que fazer? 😂



PERGUNTE

“O que eu posso fazer agora que tiraria algo das suas costas?”



OBSERVE

A garrafa de água está vazia? A fralda acabou?
Ela comeu hoje?



AJUDE

Faça por completo: lavar, secar e guardar.



NÃO ESPERE PEDIREM

Se você viu, é sua.

Lista rápida de “coisas que sempre ajudam”

- | | |
|--|--|
| ☐ Levar água durante a mamada | ☐ Cuidar das visitas |
| ☐ Fazer o bebê arrotar depois da mamada | ☐ Ir à farmácia/mercado |
| ☐ Trocar a fralda da madrugada | ☐ Garantir 1 bloco de sono de 4h para a mãe |
| ☐ Preparar o café da manhã | ☐ Marcar as consultas do bebê |
| ☐ Dar banho no bebê | ☐ Registrar o bebê no cartório |



Primeiros 30 dias

Este é um organizador da rotina, não um manual médico. Para dúvidas de saúde, a referência é o pediatra e a **Caderneta da Criança**, que vocês recebem na maternidade.

Semana 1 — Organização

- ☐ Registrar o bebê no cartório (certidão de nascimento + CPF)
- ☐ Incluir o bebê no plano de saúde (prazo de 30 dias)
- ☐ Teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida
- ☐ Conferir se foram feitos: orelhinha, olhinho, coraçãozinho, linguinha
- ☐ Conferir vacinas BCG e hepatite B na caderneta
- ☐ Primeira consulta do bebê (na primeira semana)
- ☐ Rotina da casa: quem faz o quê
- ☐ Fraldas e roupas acessíveis

Semana 2 — Adaptação

- ☐ Organizar horários (sem rigidez: bebê mama em livre demanda)
- ☐ Ativar a rede de apoio (quem ajuda em quê)
- ☐ Compras necessárias (o que faltou de verdade)
- ☐ Conferir se o coto umbilical caiu

Semana 3 — Ajustes

- ☐ O que está funcionando?
- ☐ O que está faltando?
- ☐ Como estamos dormindo? (dá para melhorar os turnos?)
- ☐ Como a mãe está se sentindo? (veja a página de saúde emocional)

Semana 4 — Revisão

- ☐ O que realmente usamos?
- ☐ O que precisamos comprar (tamanho P/M)?

☐ O que podemos deixar para depois?

☐ Consulta de revisão pós-parto da mãe marcada

☐ Agendar vacinas dos 2 meses

Diário de mamadas e fraldas (primeira semana)

Útil para levar à primeira consulta. O pediatra costuma perguntar sobre mamadas, xixi e cocô.

O QUE DIZEM AS FONTES

Nas primeiras semanas, o recém-nascido costuma mamar **8 a 12 vezes em 24 horas**, em livre demanda [9][12]. A partir do 5º–6º dia, espera-se em geral **6 ou mais fraldas molhadas por dia** [8] [9]. É comum o bebê perder um pouco de peso nos primeiros dias e recuperar o peso de nascimento por volta de 10 a 14 dias [8].

Dia	Mamadas (nº)	Fraldas com xixi	Fraldas com cocô	Observações / cor do cocô
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A Caderneta da Criança traz uma **escala de cores das fezes**. Cocô **esbranquiçado, cinza-claro ou cor de massa** deve ser mostrado ao pediatra com urgência, pois pode indicar problema no fígado que precisa de diagnóstico precoce [2].

Cronograma de preparação

Quando	Foco	Feito
Até 12 semanas	Iniciar pré-natal, pasta de documentos, orçamento	☐
20 semanas	Ultrassom morfológico (se solicitado), vacina dTpa, lista do enxoval	☐
24–28 semanas	Exame de glicose, pesquisar maternidade e carrinho/bebê-conforto	☐
28 semanas	Vacina VSR, consultas passam a ser quinzenais, chá de bebê	☐
30 semanas	Preparação inicial: listas finais, o que falta comprar	☐
32 semanas	Enxoval: comprar o que faltou dos itens 	☐
34 semanas	Quarto/cantinho do bebê, lavar roupas, instalar bebê-conforto	☐
36 semanas	Mala pronta, consultas semanais, visita à maternidade	☐
37 semanas	Conferência geral — “Operação Bebê a Caminho” (Bônus 8)	☐
Últimas semanas	Documentos, contatos e transporte à mão; seguir as orientações da equipe de saúde	☐



Documentos e direitos

Regras válidas na data de publicação deste material (setembro de 2026). Confirme sempre com RH, contador, INSS ou cartório.

Documentos do bebê

- ☐ **DNV** (Declaração de Nascido Vivo) — emitida pela maternidade
- ☐ **Certidão de nascimento** — gratuita; prazo legal de 15 dias (até 3 meses se o cartório ficar a mais de 30 km). Muitas maternidades têm posto de cartório **[16]**
- ☐ **CPF** — emitido junto com a certidão
- ☐ **Cartão SUS**
- ☐ **Inclusão no plano de saúde** — até 30 dias do nascimento, sem carência **[16]**
- ☐ **Caderneta da Criança** — guarde junto com a certidão

Direitos da gestante e da família

Direito	O que diz a lei
Licença-maternidade	120 dias; 180 dias em empresas do Programa Empresa Cidadã (CF art. 7º; Lei 11.770/2008)
Estabilidade	Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (ADCT art. 10)
Consultas	Dispensa do trabalho para, no mínimo, 6 consultas e exames (CLT art. 392)
Amamentação	Dois descansos de 30 min por jornada até o bebê completar 6 meses (CLT art. 396)
Licença-paternidade	5 dias (+15 em Empresa Cidadã). A Lei 15.371/2026 amplia gradualmente: 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029 (esta última etapa condicionada a metas fiscais) e cria o salário-paternidade
Acompanhante no parto	Lei 11.108/2005
Maternidade e de referência	Direito de saber, desde o pré-natal, onde será o parto no SUS (Lei 11.634/2007)

Onde está cada documento?

Documento	Onde está	Cópia digital?
RG/CPF dos pais		☐
Certidão de casamento / união		☐
Carteirinhas do plano		☐
Caderneta da Gestante		☐
Exames e ultrassons		☐
DNV / certidão do bebê		☐

Sono seguro

Esta é talvez a página mais importante do kit. As recomendações abaixo resumem a diretriz da Academia Americana de Pediatria (2022), adotada também pela Sociedade Brasileira de Pediatria [10] [11], e o capítulo sobre morte súbita do lactente do Nelson [8].

O “ABC” do sono

- **Alone** — **sozinho** no berço: sem travesseiro, protetor, pelúcias, cobertores soltos
- **Back** — **de barriga para cima**, em todos os sonos (inclusive sonecas)
- **Crib** — em **berço** com colchão firme e plano, com lençol ajustado

- ☐ Berço no quarto dos pais, idealmente pelo menos nos primeiros 6 meses
- ☐ Não dormir com o bebê no sofá ou na poltrona (risco alto)
- ☐ Não usar superfícies inclinadas, ninhos ou posicionadores para dormir
- ☐ Cadeirinha do carro, balanço e carrinho não são lugar para sono prolongado — ao chegar, transfira para o berço
- ☐ Evitar superaquecimento: roupa adequada à temperatura, sem gorro para dormir dentro de casa
- ☐ Ambiente 100% livre de fumo
- ☐ Amamentação está associada a menor risco
- ☐ “Tummy time” (tempo de barriga para baixo) só acordado e com supervisão

Se o bebê usa manta para dormir, ela deve ficar presa sob o colchão na altura do peito, com os pés do bebê encostando no fim do berço — ou prefira um saco de dormir próprio para bebês.

O QUE DIZEM AS FONTES

Sobre a **chupeta**, as fontes divergem em ênfase: a AAP considera que oferecê-la na hora de dormir, depois que a amamentação estiver bem estabelecida, está associada a menor risco de morte súbita [10]; o Ministério da Saúde e a SBP alertam que ela pode atrapalhar a amamentação [12]. **Decidam com o pediatra.**



Amamentação: o básico que ajuda muito

O QUE DIZEM AS FONTES

- OMS e Ministério da Saúde: **leite materno exclusivo até 6 meses** e continuado, com outros alimentos, **até 2 anos ou mais** [4][12].
- Contato pele a pele e primeira mamada **na primeira hora de vida**, quando mãe e bebê estão bem [4][12].
- **Livre demanda**: sem horários fixos; em geral 8 a 12 mamadas por dia no início [9][12].
- Não oferecer água, chás ou outros leites sem orientação profissional [12].

Sinais de boa pega

- ☐ Boca bem aberta
- ☐ Lábios virados para fora (“boca de peixinho”)
- ☐ Queixo encostando na mama
- ☐ Mais aréola visível acima da boca do que abaixo
- ☐ Barriga do bebê encostada na barriga da mãe
- ☐ Mamada não deve doer de forma intensa e contínua

Critérios adaptados do Caderno de Atenção Básica “Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação complementar” [12].

Procure ajuda se houver: dor forte que não melhora, rachaduras ou sangramento no mamilo, mama vermelha, quente e dolorida com febre, bebê muito sonolento que não acorda para mamar, ou poucas fraldas molhadas [2][12].

A **Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano** oferece orientação gratuita sobre amamentação. Salve o contato do banco de leite mais próximo antes do parto.



Recém-nascido: testes, vacinas e cuidados

Triagens neonatais

Teste	Quando	Feito
Teste do pezinho	Entre o 3º e o 5º dia de vida	☐
Teste da orelhinha (triagem auditiva)	Na maternidade ou no 1º mês	☐
Teste do olhinho (reflexo vermelho)	Antes da alta	☐
Teste do coraçãozinho (oximetria)	Entre 24 e 48 horas, antes da alta	☐
Teste da linguinha	Na maternidade	☐

Fontes: Programa Nacional de Triagem Neonatal e Caderneta da Criança [2][14].

Vacinas logo ao nascer



O QUE DIZEM AS FONTES

BCG e **hepatite B** (esta, idealmente nas primeiras 12 a 24 horas). A próxima ida à sala de vacina é aos 2 meses [2][13]. Levem sempre a Caderneta da Criança.

Cuidados do dia a dia



O QUE DIZEM AS FONTES

- **Coto umbilical:** manter limpo e seco e seguir a orientação da maternidade; costuma cair entre 1 e 2 semanas [2][8].
- **Banho:** água morna (por volta de 36–37 °C — teste com o antebraço ou cotovelo). **Nunca** deixe o bebê sozinho no banho, nem por um segundo [2][9].
- **Icterícia** (pele amarelada) é comum nos primeiros dias, mas precisa ser avaliada se surgir nas primeiras 24 horas, se se espalhar para barriga, pernas, palmas e plantas, ou se o bebê estiver muito sonolento [2][8].
- **Temperatura:** meça na axila com termômetro digital. Pela Caderneta da Criança, 37,5 °C ou mais é febre, e abaixo de 35,5 °C também é sinal de alerta [2].
- **Consulta:** a primeira avaliação do bebê (e da mãe) deve acontecer na primeira semana de vida [2][4].



Sinais de perigo no recém-nascido

Lista baseada nos sinais de perigo da Caderneta da Criança, da estratégia AIDPI Neonatal e dos livros de pediatria [2][4][8]. **Diante de qualquer um deles, procure atendimento imediatamente.**

- Não consegue mamar ou vomita tudo o que mama
- Convulsão (tremores ritmados, olhar parado, “ataque”)
- Muito molinho, difícil de acordar, sem reação
- Respiração muito rápida, com gemido, ou costelas “afundando” ao respirar
- Febre (37,5 °C ou mais na axila) ou temperatura baixa (abaixo de 35,5 °C)
- Pele ou lábios arroxeados, ou muito pálidos
- Pele muito amarela, principalmente nas primeiras 24 h ou chegando às palmas e plantas
- Umbigo com pus, mau cheiro ou vermelhidão que se espalha pela barriga
- Muitas bolhas ou pústulas na pele
- Cocô esbranquiçado ou muito claro
- Poucas fraldas molhadas, boca seca
- Choro muito diferente do habitual, que não acalma de jeito nenhum



O QUE DIZEM AS FONTES

Os livros de pediatria reforçam que **febre em bebês com menos de 3 meses sempre exige avaliação médica rápida**, pois o sistema imunológico ainda é imaturo e os sinais de infecção podem ser discretos [8][9]. Não dê remédio para febre sem orientação.

♥ Pós-parto: o corpo e as emoções da mãe

O QUE DIZEM AS FONTES

O puerpério dura cerca de 6 semanas. É normal ter sangramento (**lóquios**) que começa vermelho e vai clareando e diminuindo ao longo das semanas [5][6]. O Ministério da Saúde recomenda consulta de puerpério na primeira semana e revisão até 42 dias após o parto [1][19].

Procure atendimento se houver [1][4][5]

- Sangramento que aumenta, encharca um absorvente em 1 hora ou tem coágulos grandes
- Febre, calafrios ou secreção com mau cheiro
- Dor forte na barriga, nos pontos ou na cicatriz da cesárea (vermelha, com pus)
- Dor, calor e inchaço em uma perna só
- Falta de ar ou dor no peito
- Dor de cabeça forte, visão embaçada, pressão alta
- Mama vermelha, dura e dolorida com febre

Baby blues ou depressão pós-parto?

	Baby blues	Depressão pós-parto
Frequência	Muito comum — a maioria das mães	Comum — estimativas brasileiras e internacionais de 1 em cada 4 a 1 em cada 7 mães
Quando	Começa nos primeiros dias	Pode começar na gestação ou em qualquer momento do 1º ano
Duração	Melhora sozinho em até ~2 semanas	Dura mais de 2 semanas e atrapalha o dia a dia
O que fazer	Descanso, apoio, acolhimento	Procurar atendimento — tem tratamento

Fontes: [5][17]

Pensamentos de se machucar ou de machucar o bebê, ou sensação de desconexão da realidade, são uma emergência. Procure atendimento imediatamente (SAMU 192, pronto-socorro) e, para apoio emocional, CVV 188.

Check-in emocional (preenchem juntos, toda semana)

Semana	Como a mãe está (0–10)	Como o pai/parceria está (0–10)	Precisamos de ajuda?
1			☐ Sim ☐ Não
2			☐ Sim ☐ Não
3			☐ Sim ☐ Não
4			☐ Sim ☐ Não

BÔNUS 1



Chá de bebê + lista de presentes

Convidado(a)	Confirmou	Presente	Agradeci
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐

Presentes que realmente ajudam

☐ Fraldas — **peça tamanhos P e M**, não só RN

☐ Lenços umedecidos sem perfume

☐ Roupas tamanho P, M e G

☐ Toalhas com capuz

☐ Fraldas de pano

☐ Lençóis de elástico para o berço

☐ Itens de higiene indicados pelo pediatra

☐ Itens de alimentação, conforme necessidade

☐ Vale-refeição/delivery para o pós-parto 😊

Coloque na lista a sugestão de tamanho de fralda: “Sobrenome A–H: tamanho P · I–P: tamanho M · Q–Z: tamanho G”. Assim vocês não ganham 30 pacotes de RN.

BÔNUS 2



Organizador e calculadora de fraldas

Tamanho	Estimativa de uso*	Quantidade necessária	Recebidas	Compradas	Falta
RN	~10/dia por 2–4 semanas				
P	~8–10/dia por 1–2 meses				
M	~7–8/dia por 3–5 meses				
G	~6/dia por vários meses				
XG	~5–6/dia				

*Estimativas aproximadas: o número de trocas e o tempo em cada tamanho variam muito com o peso do bebê e a marca da fralda. A planilha .xlsx tem uma calculadora automática em que vocês ajustam esses números.

Como calcular: fraldas por dia × número de dias no tamanho = quantidade necessária. Depois, subtraia o que já ganharam e compraram. Compre de pouco em pouco — o bebê pode pular um tamanho.

BÔNUS 3



Perguntas para o obstetra/pediatra

Anote as dúvidas ao longo da semana — na consulta a gente sempre esquece. **Quem responde é o profissional de saúde.**

Sugestões de perguntas

☐ Minha gestação é de risco habitual ou precisa de algum cuidado especial?

☐ Quais vacinas ainda preciso tomar?

☐ Quais sinais devem me fazer ir direto à maternidade?

☐ Quando devo ir para a maternidade se entrar em trabalho de parto?

☐ Que exercícios físicos posso fazer?

☐ Posso continuar usando meus medicamentos?

☐ (Pediatria) Que produtos de higiene vocês indicam?

☐ (Pediatria) Como cuidar do umbigo?

☐ (Pediatria) Quando é a próxima consulta e as próximas vacinas?

Minha pergunta	Resposta / orientação	Acompanhar depois?
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não

BÔNUS 4



Cartões da gestação

Tire um print ou recorte. Perfeitos para fotos mês a mês.



Descobrimos que você está
chegando!



Estamos preparando tudo para
você.



Primeiros chutes.



Estamos cada dia mais perto.



Mala pronta. Só falta você!



Olá, mundo! Cheguei.

BÔNUS 5



Primeiras vezes + checklist de fotos

Momento	Data	Como foi
 Primeiro ultrassom		
 Primeira vez que ouvimos o coração		
 Primeiro chute		
 Primeiro presente		
 Quarto pronto		
 Mala pronta		
 Chegada do bebê		

Fotos para não esquecer

☐ Barriga mês a mês (mesmo lugar, mesma roupa)

☐ Teste positivo

☐ Ultrassom

☐ Chá de bebê

☐ Quarto/cantinho pronto

☐ Saída para a maternidade

☐ Primeiro colo da mãe e do pai

☐ Mãozinha e pezinho

☐ Saída da maternidade

☐ Chegada em casa

☐ Primeiro banho

☐ 1 mês de vida

BÔNUS 6

Lista de contatos

Quem	Nome	Telefone
Maternidade		
Obstetra / equipe de pré-natal		
Pediatra		
UBS de referência		
Plano de saúde		
Banco de leite mais próximo		
Familiar 1		
Familiar 2		
Transporte (plano A)		
Transporte (plano B)		
Quem cuida dos pets		
RH / trabalho		
SAMU		192
CVV (apoio emocional)		188

BÔNUS 7



Planner semanal do casal

Semana: ____ / ____ · Semanas de gestação (ou de vida do bebê): ____

Esta semana precisamos resolver

1. _____
2. _____
3. _____

Compras

Consultas / exames / vacinas

Gastos da semana

R\$ _____

Quem faz o quê

Como estamos nos sentindo?



Pinte os corações. Se a nota ficou baixa por duas semanas seguidas, conversem sobre isso — e com um profissional se precisar.

BÔNUS 8



Operação Bebê a Caminho

O checklist final “está tudo pronto?”

- ☐ Cantinho do bebê preparado (berço só com colchão e lençol)
- ☐ Roupas lavadas
- ☐ Enxoval organizado
- ☐ Mala pronta
- ☐ Documentos separados (+ Caderneta da Gestante)
- ☐ Transporte planejado (plano A e B)
- ☐ Contatos salvos
- ☐ Casa organizada
- ☐ Bebê-conforto instalado adequadamente
- ☐ Consultas e vacinas da gestação em dia
- ☐ Página de sinais de alerta na geladeira
- ☐ Pais respirando 🧘

Guia de bolso: quando procurar atendimento



Na gestação

- Sangramento ou perda de líquido
- Dor de cabeça forte, visão turva
- Inchaço súbito no rosto/mãos
- Contrações antes de 37 semanas
- Bebê mexendo menos
- Febre, falta de ar, convulsão



No bebê

- Não mama / vomita tudo
- Molinho, difícil de acordar
- Respiração difícil ou com gemido
- Febre $\geq 37,5$ °C ou $< 35,5$ °C
- Muito amarelo, roxo ou pálido
- Umbigo com pus/vermelhidão
- Convulsão



Na mãe (pós-parto)

- Sangramento que aumenta
- Febre, mau cheiro
- Dor/inchaço em uma perna
- Falta de ar, dor no peito
- Tristeza profunda, pensamentos de se machucar



Números

SAMU 192

Bombeiros 193

CVV 188

Maternidade: _____

Pediatra: _____

Baseado na Caderneta da Gestante, Caderneta da Criança e recomendações da OMS [1][2][4]. Em caso de dúvida, procure atendimento.



Checklist para visita à maternidade

Visite (presencialmente ou on-line) entre 30 e 36 semanas. Perguntas para fazer:

- ☐ Por qual entrada chegamos em trabalho de parto? (dia e noite)
- ☐ Onde estacionar?
- ☐ Quais documentos levar na admissão?
- ☐ A maternidade tem lista própria de itens para a mala?
- ☐ Como funciona o acompanhante? Pode trocar?
- ☐ O bebê fica no quarto com a mãe (alojamento conjunto)?
- ☐ Incentivam contato pele a pele e amamentação na primeira hora?
- ☐ Quais testes do recém-nascido são feitos lá?
- ☐ Tem posto de cartório para registro?
- ☐ Tem UTI neonatal?
- ☐ Regras de visitas
- ☐ O bebê-conforto é exigido na alta?

Anotações



Fontes consultadas

As informações de saúde deste kit foram resumidas, com nossas palavras, a partir das obras e documentos abaixo. Recomendações mudam: sempre prevalece a orientação do profissional que acompanha vocês. Conteúdo revisado em setembro de 2026.

Documentos oficiais brasileiros

1. Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Gestante*. Edição mais recente.
2. Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Criança — Passaporte da Cidadania*. Edição mais recente; e MS/OPAS, *Manual AIDPI Neonatal*.
12. Brasil. Ministério da Saúde. *Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar*. Cadernos de Atenção Básica nº 23, 2ª ed., 2015; e *Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos*, 2019.
13. Brasil. Ministério da Saúde. *Calendário Nacional de Vacinação* (gestante e criança) e *Estratégia de Vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em Gestantes*, 2025.
14. Brasil. Ministério da Saúde. *Programa Nacional de Triagem Neonatal*; Lei nº 12.303/2010 (triagem auditiva); Lei nº 13.002/2014 (teste da linguinha).
15. Conselho Nacional de Trânsito. *Resolução CONTRAN nº 819/2021* — transporte de crianças em veículos.
16. Legislação: Constituição Federal, art. 7º, XVIII, e ADCT, art. 10; CLT, arts. 392 e 396; Lei nº 11.770/2008 (Empresa Cidadã); Lei nº 15.371/2026 (licença e salário-paternidade); Lei nº 11.108/2005 (acompanhante); Lei nº 11.634/2007 (vinculação à maternidade); Lei nº 6.015/1973 e Lei nº 9.534/1997 (registro civil); Lei nº 9.656/1998, art. 12 (planos de saúde).
19. Brasil. Ministério da Saúde. *Atenção ao pré-natal de baixo risco*. Cadernos de Atenção Básica nº 32. Brasília, 2012.

Organizações internacionais e sociedades médicas

3. World Health Organization. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Genebra: WHO, 2016.
4. World Health Organization. *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Genebra: WHO, 2022.
10. Moon RY, Carlin RF, Hand I; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. *Pediatrics*. 2022;150(1):e2022057990. (American Academy of Pediatrics)
11. Sociedade Brasileira de Pediatria. *Tratado de Pediatria*, 5ª ed. Manole, 2022; e documentos científicos e campanhas da SBP (sono seguro, transporte seguro, prevenção de acidentes).

17. American College of Obstetricians and Gynecologists. Clinical Practice Guideline nº 4: Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. *Obstet Gynecol*. 2023; Paulson JF, Bazemore SD. Prenatal and postpartum depression in fathers. *JAMA*. 2010;303(19):1961-9; Theme Filha MM et al. Factors associated with postpartum depressive symptomatology in Brazil: the Birth in Brazil study. *J Affect Disord*. 2016;194:159-67.
18. FEBRASGO. Recomendações da vacina vírus sincicial respiratório para gestantes, 2025.

Livros-texto de medicina

5. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM. *Williams Obstetrics*. 26th ed. McGraw Hill, 2022.
6. Zugaib M, Francisco RPV (eds.). *Zugaib Obstetrícia*. 4ª ed. Manole, 2020.
7. Montenegro CAB, Rezende Filho J. *Rezende Obstetrícia*. 13ª ed. Guanabara Koogan, 2017.
8. Kliegman RM, St. Geme JW et al. *Nelson Textbook of Pediatrics*. 22nd ed. Elsevier, 2024.
9. American Academy of Pediatrics. *Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5*. 7th ed. Bantam, 2019.

💛 Feito com carinho para quem está esperando o primeiro filho. Respirem: vocês não precisam saber tudo — só precisam saber onde procurar.