



KIT DIGITAL DE ORGANIZAÇÃO

Meu Primeiro Bebê

O guia completo para pais de primeira viagem se prepararem para a chegada do bebê — sem gastar dinheiro à toa e sem esquecer o que realmente importa.

10 módulos · 10 bônus · informações de saúde conferidas em fontes médicas confiáveis

LEIA ANTES DE TUDO

Como este material foi feito (e o que ele não é)

Este kit é um **organizador**. Ele ajuda vocês a planejar compras, orçamento, casa, documentos, mala e rotina. Nas partes que tocam em saúde, trouxemos o que dizem **fontes médicas reconhecidas** — livros-texto usados na formação de obstetras e pediatras, manuais do Ministério da Saúde e recomendações de sociedades científicas — sempre resumidas com nossas palavras.



Importante

Nada aqui substitui o pré-natal, a consulta com obstetra, pediatra, enfermeira obstetra ou qualquer profissional de saúde. Recomendações mudam com o tempo e cada gestação é única.

Diante de qualquer dúvida ou sinal de alerta, procure a equipe que acompanha vocês ou um serviço de urgência.

Emergência: **SAMU 192** · Apoio emocional: **CVV 188** (24h, gratuito)

Como ler as marcações



O QUE DIZEM AS FONTES

Caixas azuis resumem o que diz a literatura médica. O número entre colchetes (ex.: [5]) aponta para a lista de fontes no final.

Caixas vermelhas são **sinais de alerta**: situações em que se deve procurar atendimento.

Caixas amarelas são dicas práticas para economizar tempo e dinheiro.

Como usar o kit

- **No computador:** imprima as páginas de checklist ou preencha a planilha (arquivo .xlsx).
- **No celular:** abra a versão para celular. Toque em um item para marcá-lo — o celular lembra o que já foi feito. Ótimo para conferir a lista dentro da loja.
- **Em casal:** escolham um dia fixo por semana (15 minutos bastam) para revisar o Planner do Casal.

SUMÁRIO

O que tem neste kit

Produto principal

1. Começou a jornada
2. Planner da gestação
3. O enxoval inteligente
4. Planilha do enxoval
5. Como economizar
6. Mala da maternidade
7. Preparando a casa
8. Guia do pai
9. Primeiros 30 dias
10. Cronograma + documentos e direitos

Parte especial

- Saúde com base em fontes confiáveis
- Fontes consultadas

Bônus

1. Chá de bebê + lista de presentes
2. Organizador e calculadora de fraldas

3. Perguntas para o obstetra/pediatra
4. Cartões da gestação
5. Primeiras vezes + checklist de fotos
6. Lista de contatos
7. Planner semanal do casal
8. Operação Bebê a Caminho
9. Guia de bolso: sinais de alerta
10. Visita à maternidade

Começou a jornada

Parabéns! Agora começa uma nova fase.

O que muda depois da descoberta

A notícia costuma vir junto com uma avalanche: alegria, medo, listas infinitas, palpites de todo mundo. É normal. A boa notícia é que **quase nada precisa ser resolvido nesta semana** — a gestação dura cerca de 40 semanas justamente para dar tempo.

O que resolver primeiro

1. **Iniciar o pré-natal.** É a prioridade número 1 — o resto pode esperar.
2. **Criar uma pasta de documentos** (física e digital) para exames, cartão da gestante e receitas.
3. **Conversar sobre dinheiro** antes de comprar qualquer coisa.



O QUE DIZEM AS FONTES

O Ministério da Saúde orienta iniciar o pré-natal **o mais cedo possível, idealmente até a 12ª semana**, com no mínimo 6 consultas [1][19]. A OMS recomenda pelo menos **8 contatos** com a equipe ao longo da gestação [3].

A suplementação de **ácido fólico** é recomendada desde antes da concepção até o fim do 1º trimestre para reduzir o risco de defeitos do tubo neural; dose e duração são definidas pelo profissional [1][5].

O que pode esperar

Quarto decorado, carrinho, chá de bebê, roupinhas de tamanhos maiores. Nada disso precisa acontecer no 1º trimestre.

Checklist de largada

- ☐ Confirmar acompanhamento pré-natal (UBS, convênio ou particular)
- ☐ Pegar a Caderneta da Gestante e levá-la a todas as consultas

- ☐ Criar pasta de documentos (física + pasta no celular/nuvem)
- ☐ Organizar exames e datas de consultas em um calendário compartilhado
- ☐ Definir orçamento total para a chegada do bebê
- ☐ Conversar sobre licença-maternidade/paternidade com RH ou contador
- ☐ Verificar a cobertura obstétrica do plano de saúde (se houver)
- ☐ Começar o planejamento do enxoval (sem comprar ainda!)
- ☐ Pesquisar maternidades
- ☐ Criar lista de contatos importantes (Bônus 6)

MÓDULO 2

Planner da gestação

A gestação é dividida em três trimestres. Cada um tem seu foco — e sua lista.



O QUE DIZEM AS FONTES

Ritmo das consultas de pré-natal (gestação de risco habitual) segundo o Ministério da Saúde [1] [19]:

- até 28 semanas: consultas **mensais**;
- de 28 a 36 semanas: **quinzenais**;
- de 36 semanas até o parto: **semanais**.

A gestação é considerada **a termo entre 37 e 41 semanas e 6 dias**. A "data provável do parto" é uma estimativa: poucos bebês nascem exatamente nela [5][6].



1º trimestre (até 13 semanas)



Primeira consulta de pré-natal



Exames solicitados pela equipe (anote datas e resultados)



Suplementação conforme prescrição

☐ Documentos: Caderneta da Gestante, cartão SUS/convênio

☐ Planejamento financeiro inicial (Módulo 4)

☐ Começar a pesquisar maternidades

☐ Rever medicamentos de uso contínuo com o médico



2º trimestre (14 a 27 semanas)

☐ Definir onde o bebê vai dormir nos primeiros meses

☐ Começar o enxoval — primeiro os itens  essenciais

☐ Pesquisar carrinho

☐ Pesquisar bebê-conforto adequado ao peso do recém-nascido e ao seu carro

☐ Planejar chá de bebê (Bônus 1)

☐ Revisar orçamento

☐ Perguntar sobre vacinas da gestação na consulta

☐ Anotar a data em que sentiu o bebê mexer pela primeira vez (Bônus 5)



3º trimestre (28 semanas até o parto)

- ☐ Lavar e organizar as roupinhas
- ☐ Finalizar o enxoval
- ☐ Arrumar a mala da maternidade (pronta até 34–36 semanas)
- ☐ Organizar documentos em uma pasta única
- ☐ Planejar transporte até a maternidade (e um plano B)
- ☐ Instalar o bebê-conforto conforme o manual do fabricante
- ☐ Preparar a casa (Módulo 7)
- ☐ Conhecer a maternidade / fazer a visita (Bônus 10)
- ☐ Conversar com a equipe sobre plano de parto e sinais de trabalho de parto

Exames, vacinas e movimentos do bebê

Não é para decorar — é para vocês reconhecerem os nomes quando aparecerem no pedido médico. **Quem decide o que pedir e quando é a equipe de pré-natal.**



O QUE DIZEM AS FONTES

Exames que costumam aparecer no pré-natal

[1][5][6][19]: hemograma; tipagem sanguínea e fator Rh; glicemia de jejum e, entre 24 e 28 semanas, teste de tolerância à glicose (curva glicêmica); testes para sífilis, HIV e hepatites B e C; toxoplasmose; exame de urina e urocultura; ultrassonografias. Em muitos serviços também se pesquisa o estreptococo do grupo B no fim da gestação.

Exame	Data	Resultado / observação	Mostrei ao médico?
			☐
			☐
			☐
			☐

			☐
			☐

Vacinas da gestação

O QUE DIZEM AS FONTES

O Calendário Nacional de Vacinação da gestante inclui [\[13\]](#)[\[18\]](#):

- **dTpa** (difteria, tétano e coqueluche): **a cada gestação**, a partir da 20^a semana — protege o bebê contra a coqueluche nos primeiros meses;
- **Influenza** (gripe): na campanha anual, em qualquer fase da gestação;
- **Hepatite B**: completar o esquema se não estiver vacinada;
- **VSR** (vírus sincicial respiratório, principal causador de bronquiolite): **dose única a partir de 28 semanas**, em cada gestação — incorporada ao SUS em 2025;
- **Covid-19**: conforme o calendário vigente.

O calendário é atualizado com frequência. Confirme na UBS ou com o obstetra.

Vacina	Data	Local	Registrada na caderneta?
dTpa			☐
Influenza			☐
Hepatite B			☐
VSR			☐
Covid-19			☐



Movimentos do bebê



O QUE DIZEM AS FONTES

Na primeira gestação, a mãe costuma começar a perceber os movimentos entre **18 e 22 semanas** (às vezes um pouco antes ou depois) [5][6]. No 3º trimestre, cada bebê cria seu próprio padrão. A orientação dos manuais é: **a mãe conhece o padrão do seu bebê; se os movimentos diminuïrem ou pararem, procure atendimento no mesmo dia — não espere até a próxima consulta** [1][5].



Sinais de alerta na gestação

Estes sinais aparecem na Caderneta da Gestante e nos principais livros de obstetrícia como motivos para **procurar atendimento imediatamente** [1][5][6][7]:

- Sangramento pela vagina
- Perda de líquido (água) pela vagina
- Dor de cabeça forte ou que não passa, visão embaçada, pontos brilhantes na visão
- Inchaço repentino no rosto, nas mãos ou nas pernas
- Dor forte na barriga ou no alto do abdome (“boca do estômago”)
- Contrações regulares **antes de 37 semanas**
- Bebê mexendo menos ou parando de mexer
- Febre, calafrios, ardência ao urinar
- Falta de ar, dor no peito, desmaio ou convulsão
- Vômitos que não deixam comer nem beber
- Tristeza profunda, desesperança ou pensamentos de se machucar

E como saber se é trabalho de parto?



O QUE DIZEM AS FONTES

Sinais que costumam indicar trabalho de parto [1] [5] [6]: contrações **ritmadas**, que ficam mais fortes, mais longas e mais próximas e **não passam com repouso**; perda do tampão mucoso (pode acontecer dias antes); rompimento da bolsa. Contrações irregulares que somem com repouso costumam ser de “treinamento” (Braxton Hicks).

Combinem com a equipe, antes, quando ir para a maternidade. Se a bolsa romper, observe a cor do líquido (claro, esverdeado ou com sangue) e procure a maternidade.

Minha maternidade de referência	
Telefone	
Quando a equipe orientou ir	

MÓDULO 3

O enxoval inteligente

Em vez de uma lista gigante, cada item tem uma cor. Comece pelo verde.

ESSENCIAL	Precisa estar em casa quando o bebê chegar.
IMPORTANTE	Facilita muito a rotina, mas dá para esperar algumas semanas.
PODE ESPERAR	Só vai ser usado daqui a meses.
PENSE ANTES	Pouco usado por muitas famílias — ou desaconselhado por questões de segurança.

 Roupinhas

As quantidades são **estimativas flexíveis**: dependem do clima, de quantas vezes vocês lavam roupa por semana, do tamanho do bebê ao nascer e do que vão ganhar. Bebês grandes podem usar pouco (ou nada) do tamanho RN — compre pouco RN e mais P.

Item	Sugestão RN	Sugestão P	M	G	Já tenho	Falta
Body manga curta	3–4	5–6			☐	

 Body manga longa	3–4	5–6			☐	
 Macacão	2–3	4–5			☐	
 Calça (com pé ou culote)	2–3	4–5			☐	
 Meias	3 pares	4–6 pares			☐	
 Toucas	1–2	1–2			☐	
 Manta / cueiro	2–3				☐	
 Casaquinho	1–2	2			☐	
 Fraldas de pano (boca)	8–12				☐	
 Sapatinho	Dispensável até o bebê andar				☐	

Prefira roupas de algodão, com abertura fácil (botões de pressão no meio das pernas poupam muitas trocas completas) e sem cordões, fitas ou botões soltos que possam se soltar.

Higiene, quarto e passeio



Higiene

- ☐ ● Toalhas com capuz (2–3)
- ☐ ● Fraldas descartáveis (ver Bônus 2)
- ☐ ● Trocador (portátil ou sobre a cômoda)
- ☐ ● Termômetro digital
- ☐ ● Algodão/gaze, conforme orientação
- ☐ ● Sabonete líquido neutro indicado pelo pediatra
- ☐ ● Pomada para assaduras, se o pediatra indicar
- ☐ ● Banheira, se a família optar por usar
- ☐ ● Cesto para roupas
- ☐ ● Lixeira com tampa
- ☐ ● Cortador de unhas / lixa infantil
- ☐ ● Talco
- ☐ ● Perfumes e colônias



Aquecedor de lenço umedecido



O QUE DIZEM AS FONTES

A Academia Americana de Pediatria desaconselha o uso de **talco** em bebês, pelo risco de o pó ser inalado [9]. Para a pele do recém-nascido, a recomendação geral é usar o mínimo de produtos, sem perfume [8][9].



Quarto / sono

- ☐ ● Berço (ou mini berço) com selo do Inmetro
- ☐ ● Colchão firme, do tamanho exato do berço
- ☐ ● Lençóis de elástico (3)
- ☐ ● Cômoda/trocador
- ☐ ● Guarda-roupa ou organizadores
- ☐ ● Cortina/persiana (ajuda nas sonecas)
- ☐ ● Luz noturna fraca (para mamadas e trocas)
- ☐ ● Poltrona de amamentação, se desejada
- ☐ ● Protetor de berço (“kit berço”)
- ☐ ● Travesseiro, almofadas e “posicionadores”
- ☐ ● Ninho/redutor para o bebê dormir



Edredom e cobertores soltos



O QUE DIZEM AS FONTES

As recomendações de **sono seguro** da Academia Americana de Pediatria (2022) e da Sociedade Brasileira de Pediatria orientam que o berço tenha **apenas colchão firme e plano com lençol ajustado** — sem protetores, travesseiros, almofadas, bichos de pelúcia ou cobertores soltos — e desaconselham posicionadores e superfícies inclinadas para dormir [10][11]. Veja a página “Sono seguro” na Parte Especial.



Passeio e transporte



Bebê-conforto (obrigatório no carro)



Carrinho



Bolsa de maternidade



Sling/canguru ergonômico



Cadeirinha de alimentação



Andador



O QUE DIZEM AS FONTES

A Sociedade Brasileira de Pediatria **contraindica o andador**, por estar associado a quedas e acidentes e não ajudar no desenvolvimento da marcha [11].



Alimentação



Almofada de amamentação (opcional)



Absorventes para seios



Mamadeiras — só se houver indicação



Esterilizador — só se usar mamadeiras



Chupeta — converse com o pediatra



O QUE DIZEM AS FONTES

O Ministério da Saúde e a OMS recomendam **aleitamento materno exclusivo até os 6 meses**, sem água, chás ou outros leites, salvo orientação profissional [12]. Por isso mamadeiras e fórmulas não são itens obrigatórios do enxoval. Se houver necessidade, o pediatra orienta.

Antes de comprar: segurança, medidas e compatibilidade

Berço

- ☐ Tem selo do Inmetro (a certificação de berços é obrigatória no Brasil)
- ☐ Espaço entre as grades pequeno o bastante para a cabeça não passar (norma técnica: até cerca de 6,5 cm)
- ☐ Colchão encaixa sem folga — não cabem dois dedos entre o colchão e a lateral
- ☐ Sem peças soltas, lascas, tinta descascando ou recortes decorativos na cabeceira
- ☐ Berço usado: todas as peças originais, sem improvisos

Bebê-conforto

- ☐ Selo do Inmetro e faixa de peso que inclui o recém-nascido
- ☐ Compatível com o seu carro (cinto de 3 pontos ou Isofix) — teste antes de comprar

- ☐ Instalado **voltado para trás**, no **banco traseiro**
- ☐ Dentro do prazo de validade indicado pelo fabricante
- ☐ Usado? Só se souber a história: nunca de carro que sofreu batida



O QUE DIZEM AS FONTES

A Resolução CONTRAN nº 819/2021 determina que crianças de até 1 ano (ou até 13 kg) sejam transportadas em **bebê-conforto voltado para trás**, no banco traseiro [15]. A SBP reforça: nunca transportar o bebê no colo, nem no banco da frente com airbag [11]. Muitas maternidades exigem o bebê-conforto na alta.

Carrinho

- ☐ Reclina totalmente (recém-nascido precisa ficar deitado)
- ☐ Cinto de 5 pontos e freio fácil de acionar
- ☐ Cabe no porta-malas e no elevador/corredor de casa

☐ Você consegue fechar com uma mão (teste na loja!)

Lista “não compre antes de pesquisar”

Item	Por quê
Kit berço com protetor	Desaconselhado pelas diretrizes de sono seguro [10]
Ninho, redutor, travesseiro antirrefluxo	Superfícies macias ou inclinadas não são recomendadas para dormir [10]
Andador	Contraindicado pela SBP [11]
Muitas roupas RN	Bebê pode perder o tamanho em poucas semanas
Sapatinho	Não é necessário antes de andar
Esterilizador, aquecedor de mamadeira, extrator elétrico	Depende de como será a alimentação — espere para ver
Babá eletrônica com câmera	Útil para algumas famílias, dispensável para outras (e o bebê deve dormir no quarto dos pais nos primeiros meses) [10]
Banheira com muitos acessórios	Uma banheira simples e estável resolve
Kits “prontos” de loja	Costumam incluir itens que vocês não usariam

MÓDULO 4

Planilha do enxoval

A versão automática está no arquivo **planilha-meu-primeiro-bebe.xlsx** (funciona no Excel, Google Planilhas e LibreOffice). Vocês digitam produto, quantidade e valor — ela calcula todo o resto. Esta página é a versão para imprimir.

[illegible]

TOTAL DO ENXOVAL

JÁ GASTAMOS

AINDA FALTA

ORÇAMENTO DISPONÍVEL

DIFERENÇA

Se a diferença ficou negativa, volte aos itens  e



Além do enxoval: custos que costumam ser esquecidos

☐

Fraldas dos primeiros meses

☐

Consultas e exames (coparticipação do plano)

☐ Medicamentos e vitaminas prescritos

☐ Transporte para consultas

☐ Queda de renda durante a licença (autônomos)

☐ Reserva de emergência

MÓDULO 5

Não compre só porque está escrito BEBÊ 😂

Antes de passar o cartão, respondam juntos:

1. **Eu realmente preciso disso?**
2. **Quantas vezes vou usar?** (e por quantos meses?)
3. **Posso comprar depois?**
4. **Posso pegar emprestado ou comprar usado?**
(exceto itens de segurança sem procedência)
5. **Existe uma alternativa mais barata?**
6. **Cabe no orçamento?**

10 truques que funcionam

1. Espere o chá de bebê antes de comprar roupas e fraldas.
2. Compre mais tamanho P do que RN.
3. Fraldas: compre de vários tamanhos aos poucos, não 20 pacotes de uma vez.
4. Grupos de desapego de bairro valem ouro para roupas e brinquedos.
5. Itens “de segurança” (bebê-conforto, berço) — compre novos ou de procedência conhecida.
6. Compare o preço por unidade (fralda, lenço), não por pacote.
7. Evite kits prontos de loja.
8. Crie uma lista de presentes com o que vocês realmente precisam (Bônus 1).
9. Espere para comprar itens de alimentação até saber como vai ser.
10. Sempre que der vontade de comprar algo “fofo”, anote e espere 7 dias.



O QUE DIZEM AS FONTES

Além de ser a recomendação de saúde, o **aleitamento materno** é também a opção mais econômica. Dificuldades são comuns no início e têm solução: a rede de **Bancos de Leite Humano** oferece orientação gratuita [12].

MÓDULO 6



Mala da maternidade

Deixe a mala pronta **entre 34 e 36 semanas** e peça a lista da sua maternidade — cada uma tem regras próprias. Separe em três bolsas (ou três sacos identificados).



Bebê

☐

Bodies (2–3 por dia de internação)

☐

Calças/macacões

☐

Meias e touca

☐

Manta

☐

Fraldas RN (se a maternidade pedir)

☐

Roupa de saída (1 tamanho RN e 1 P)

☐

Fraldas de pano

☐

Itens solicitados pela maternidade



Mãe

☐

Documento com foto, cartão SUS/convênio

☐

Caderneta da Gestante e exames

- ☐ Camisolas/ pijamas com abertura na frente
- ☐ Calcinhas confortáveis (algumas descartáveis)
- ☐ Absorventes pós-parto
- ☐ Sutiã de amamentação, se desejado
- ☐ Chinelo
- ☐ Higiene pessoal
- ☐ Roupa para a saída
- ☐ Carregador (cabo longo)
- ☐ Itens pessoais (óculos, elástico de cabelo, hidratante labial)



Pai / acompanhante

- ☐ Documento com foto
- ☐ Roupa para 1–2 dias
- ☐ Higiene
- ☐ Carregador / bateria externa
- ☐ Dinheiro/cartão
- ☐ Água e lanches, conforme regras da maternidade



O QUE DIZEM AS FONTES

A Lei nº 11.108/2005 garante à gestante o direito a **um acompanhante de sua escolha** durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no SUS e na rede conveniada [16].



Checklist 48 horas

“Se o parto fosse hoje, está tudo pronto?”

- ☐ Mala no carro ou perto da porta
- ☐ Documentos + Caderneta da Gestante + exames na pasta
- ☐ Transporte combinado (e um plano B: táxi/aplicativo)
- ☐ Caminho até a maternidade testado (inclusive à noite)
- ☐ Contatos salvos no celular dos dois
- ☐ Casa em ordem mínima (louça, lixo, roupa lavada)
- ☐ Bebê-conforto instalado e testado
- ☐ Telefones carregados
- ☐ Pets/plantas: quem cuida?
- ☐ Combinado com a equipe: quando ir para a maternidade

MÓDULO 7



Preparando a casa

Quarto (ou cantinho do bebê no quarto dos pais)

- ☐ Berço montado, colchão firme e lençol ajustado — nada mais dentro
- ☐ Berço longe de janelas, cortinas com cordão e tomadas
- ☐ Roupas lavadas e separadas por tamanho
- ☐ Fraldas organizadas por tamanho
- ☐ Estação de troca com tudo ao alcance da mão



O QUE DIZEM AS FONTES

As diretrizes de sono seguro recomendam que o bebê durma **no quarto dos pais, em berço próprio**, idealmente pelo menos nos primeiros 6 meses [10][11]. Por isso o “quarto do bebê” pode ficar pronto com calma.

Banheiro

- ☐ Toalhas separadas

- ☐ Produtos de higiene em um cesto
- ☐ Termômetro de banho ou teste com o antebraço

Cozinha

- ☐ Espaço para itens do bebê
- ☐ Congelar refeições prontas para as primeiras semanas
- ☐ Garrafa de água grande para quem amamenta

Sala

- ☐ Local confortável para amamentação/alimentação
- ☐ Espaço para o carrinho
- ☐ Cesto “kit de sobrevivência” (fralda, lenço, fralda de pano, carregador, água)

Segurança geral

- ☐ Detector de fumaça / revisão de gás
- ☐ Ambiente livre de fumo (inclusive visitas)
- ☐ Números de emergência na geladeira (Bônus 9)



O QUE DIZEM AS FONTES

A exposição à fumaça de cigarro, na gestação e após o nascimento, é um dos fatores de risco mais consistentes para a morte súbita do lactente [8][10].

MÓDULO 8



Guia do pai

Pai, você não é o ajudante. Você também é pai.

Durante a gravidez

- ☐ Ir às consultas e ultrassons sempre que possível
- ☐ Ler este guia (sim, você também 😊)
- ☐ Assumir tarefas de organização: planilha, pesquisa de preços, documentos
- ☐ Fazer as vacinas em dia (dTpa e gripe protegem o bebê também)
- ☐ Conversar sobre medos e expectativas

Antes do parto

- ☐ Saber o caminho da maternidade (e o plano B)
- ☐ Saber onde estão os documentos
- ☐ Saber onde está a mala
- ☐ Conferir o transporte e o bebê-conforto

- ☐ Ver com o RH a licença-paternidade e os documentos exigidos

No pós-parto

- ☐ **Alimentação:** garantir comida e água para quem amamenta
- ☐ **Casa:** louça, roupa, lixo, compras
- ☐ **Visitas:** ser o “porteiro” — combinar horários e dizer não quando precisar
- ☐ **Bebê:** trocar fralda, dar banho, fazer arrotar, colo, ninar
- ☐ **Apoio emocional:** perceber sinais de cansaço extremo ou tristeza
- ☐ **Divisão das tarefas:** combinar turnos de sono



O QUE DIZEM AS FONTES

Pais também podem ter depressão pós-parto. Estudos estimam que cerca de 1 em cada 10 pais apresenta sintomas no período perinatal [17]. Irritabilidade, isolamento e excesso de trabalho podem ser sinais. Peça ajuda.

Choro que não para

O choro do bebê costuma aumentar nas primeiras semanas, com pico por volta de 6 a 8 semanas, e depois diminuir [8][9]. Se a paciência acabar: **coloque o bebê de barriga para cima no berço, saia do quarto por alguns minutos e respire. Nunca sacuda um bebê** — sacudir pode causar lesões cerebrais graves e permanentes [8][11]. Se o choro for diferente do habitual ou vier com outros sintomas, procure atendimento.

O que fazer quando você não sabe o que fazer? 😂



PERGUNTE

“O que eu posso fazer agora que tiraria algo das suas costas?”



OBSERVE

A garrafa de água está vazia? A fralda acabou? Ela comeu hoje?



AJUDE

Faça por completo: lavar, secar e guardar.



NÃO ESPERE PEDIREM

Se você viu, é sua.

Lista rápida de “coisas que sempre ajudam”

- ☐ Levar água durante a mamada
- ☐ Fazer o bebê arrotar depois da mamada
- ☐ Trocar a fralda da madrugada
- ☐ Preparar o café da manhã
- ☐ Dar banho no bebê
- ☐ Cuidar das visitas
- ☐ Ir à farmácia/mercado
- ☐ Garantir 1 bloco de sono de 4h para a mãe
- ☐ Marcar as consultas do bebê
- ☐ Registrar o bebê no cartório

MÓDULO 9



Primeiros 30 dias

Este é um organizador da rotina, não um manual médico. Para dúvidas de saúde, a referência é o pediatra e a **Caderneta da Criança**, que vocês recebem na maternidade.

Semana 1 — Organização

- ☐ Registrar o bebê no cartório (certidão de nascimento + CPF)
- ☐ Incluir o bebê no plano de saúde (prazo de 30 dias)
- ☐ Teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida
- ☐ Conferir se foram feitos: orelhinha, olhinho, coraçãozinho, linguinha
- ☐ Conferir vacinas BCG e hepatite B na caderneta
- ☐ Primeira consulta do bebê (na primeira semana)
- ☐ Rotina da casa: quem faz o quê
- ☐ Fraldas e roupas acessíveis

Semana 2 — Adaptação

- ☐ Organizar horários (sem rigidez: bebê mama em livre demanda)
- ☐ Ativar a rede de apoio (quem ajuda em quê)
- ☐ Compras necessárias (o que faltou de verdade)
- ☐ Conferir se o coto umbilical caiu

Semana 3 — Ajustes

- ☐ O que está funcionando?
- ☐ O que está faltando?
- ☐ Como estamos dormindo? (dá para melhorar os turnos?)
- ☐ Como a mãe está se sentindo? (veja a página de saúde emocional)

Semana 4 — Revisão

- ☐ O que realmente usamos?
- ☐ O que precisamos comprar (tamanho P/M)?
- ☐ O que podemos deixar para depois?
- ☐ Consulta de revisão pós-parto da mãe marcada



Agendar vacinas dos 2 meses

Diário de mamadas e fraldas (primeira semana)

Útil para levar à primeira consulta. O pediatra costuma perguntar sobre mamadas, xixi e cocô.



O QUE DIZEM AS FONTES

Nas primeiras semanas, o recém-nascido costuma mamar **8 a 12 vezes em 24 horas**, em livre demanda [9][12]. A partir do 5º–6º dia, espera-se em geral **6 ou mais fraldas molhadas por dia** [8][9]. É comum o bebê perder um pouco de peso nos primeiros dias e recuperar o peso de nascimento por volta de 10 a 14 dias [8].

Di a	Mamadas (nº)	Fraldas com xixi	Fraldas com cocô	Observações / cor do cocô
1				
2				
3				
4				
5				
6				

A Caderneta da Criança traz uma **escala de cores das fezes**. Cocô **esbranquiçado, cinza-claro ou cor de massa** deve ser mostrado ao pediatra com urgência, pois pode indicar problema no fígado que precisa de diagnóstico precoce [2].

MÓDULO 10

July
17

Cronograma de preparação

Quando	Foco	Feito
Até 12 semanas	Iniciar pré-natal, pasta de documentos, orçamento	☐
20 semanas	Ultrassom morfológico (se solicitado), vacina dTpa, lista do enxoval	☐
24–28 semanas	Exame de glicose, pesquisar maternidade e carrinho/bebê-conforto	☐
28 semanas	Vacina VSR, consultas passam a ser quinzenais, chá de bebê	☐
30 semanas	Preparação inicial: listas finais, o que falta comprar	☐
32 semanas	Enxoval: comprar o que faltou dos itens 	☐
34 semanas	Quarto/cantinho do bebê, lavar roupas, instalar bebê-conforto	☐
36 semanas	Mala pronta, consultas semanais, visita à maternidade	☐
37 semanas	Conferência geral — “Operação Bebê a Caminho” (Bônus 8)	☐
Últimas semanas	Documentos, contatos e transporte à mão; seguir as orientações da equipe de saúde	☐



Documentos e direitos

Regras válidas na data de publicação deste material (setembro de 2026). Confirme sempre com RH, contador, INSS ou cartório.

Documentos do bebê

- ☐ **DNV** (Declaração de Nascido Vivo) — emitida pela maternidade
- ☐ **Certidão de nascimento** — gratuita; prazo legal de 15 dias (até 3 meses se o cartório ficar a mais de 30 km). Muitas maternidades têm posto de cartório **[16]**
- ☐ **CPF** — emitido junto com a certidão
- ☐ **Cartão SUS**
- ☐ **Inclusão no plano de saúde** — até 30 dias do nascimento, sem carência **[16]**
- ☐ **Caderneta da Criança** — guarde junto com a certidão

Direitos da gestante e da família

Direito	O que diz a lei
---------	-----------------

Licença - maternidade	120 dias; 180 dias em empresas do Programa Empresa Cidadã (CF art. 7º; Lei 11.770/2008)
Estabilidade	Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (ADCT art. 10)
Consultas	Dispensa do trabalho para, no mínimo, 6 consultas e exames (CLT art. 392)
Amamentação	Dois descansos de 30 min por jornada até o bebê completar 6 meses (CLT art. 396)
Licença - paternidade	5 dias (+15 em Empresa Cidadã). A Lei 15.371/2026 amplia gradualmente: 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029 (esta última etapa condicionada a metas fiscais) e cria o salário-paternidade
Acompanhante no parto	Lei 11.108/2005
Maternidade de referência	Direito de saber, desde o pré-natal, onde será o parto no SUS (Lei 11.634/2007)

Fontes: [\[16\]](#)

Onde está cada documento?

Documento	Onde está	Cópia digital?
RG/CPF dos pais		☐

Certidão de casamento / união		☐
Carteirinhas do plano		☐
Caderneta da Gestante		☐
Exames e ultrassons		☐
DNV / certidão do bebê		☐



Sono seguro

Esta é talvez a página mais importante do kit. As recomendações abaixo resumem a diretriz da Academia Americana de Pediatria (2022), adotada também pela Sociedade Brasileira de Pediatria [10][11], e o capítulo sobre morte súbita do lactente do Nelson [8].

O “ABC” do sono

- **Alone** — **sozinho** no berço: sem travesseiro, protetor, pelúcias, cobertores soltos
- **Back** — **de barriga para cima**, em todos os sonos (inclusive sonecas)
- **Crib** — em **berço** com colchão firme e plano, com lençol ajustado



Berço no quarto dos pais, idealmente pelo menos nos primeiros 6 meses



Não dormir com o bebê no sofá ou na poltrona (risco alto)

- ☐ Não usar superfícies inclinadas, ninhos ou posicionadores para dormir
- ☐ Cadeirinha do carro, balanço e carrinho não são lugar para sono prolongado — ao chegar, transfira para o berço
- ☐ Evitar superaquecimento: roupa adequada à temperatura, sem gorro para dormir dentro de casa
- ☐ Ambiente 100% livre de fumo
- ☐ Amamentação está associada a menor risco
- ☐ “Tummy time” (tempo de barriga para baixo) só acordado e com supervisão

Se o bebê usa manta para dormir, ela deve ficar presa sob o colchão na altura do peito, com os pés do bebê encostando no fim do berço — ou prefira um saco de dormir próprio para bebês.



O QUE DIZEM AS FONTES

Sobre a **chupeta**, as fontes divergem em ênfase: a AAP considera que oferecê-la na hora de dormir, depois que a amamentação estiver bem estabelecida, está associada a menor risco de morte súbita [10]; o Ministério da Saúde e a SBP alertam que ela pode atrapalhar a amamentação [12]. **Decidam com o pediatra.**



Amamentação: o básico que ajuda muito



O QUE DIZEM AS FONTES

- OMS e Ministério da Saúde: **leite materno exclusivo até 6 meses** e continuado, com outros alimentos, **até 2 anos ou mais** [4] [12].
- Contato pele a pele e primeira mamada **na primeira hora de vida**, quando mãe e bebê estão bem [4][12].
- **Livre demanda**: sem horários fixos; em geral 8 a 12 mamadas por dia no início [9] [12].
- Não oferecer água, chás ou outros leites sem orientação profissional [12].

Sinais de boa pega



Boca bem aberta



Lábios virados para fora (“boca de peixinho”)



Queixo encostando na mama



Mais aréola visível acima da boca do que abaixo

- ☐ Barriga do bebê encostada na barriga da mãe
- ☐ Mamada não deve doer de forma intensa e contínua

Critérios adaptados do Caderno de Atenção Básica “Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação complementar” [12].

Procure ajuda se houver: dor forte que não melhora, rachaduras ou sangramento no mamilo, mama vermelha, quente e dolorida com febre, bebê muito sonolento que não acorda para mamar, ou poucas fraldas molhadas [2][12].

A **Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano** oferece orientação gratuita sobre amamentação. Salve o contato do banco de leite mais próximo antes do parto.



Recém-nascido: testes, vacinas e cuidados

Triagens neonatais

Teste	Quando	Feito
Teste do pezinho	Entre o 3º e o 5º dia de vida	☐
Teste da orelhinha (triagem auditiva)	Na maternidade ou no 1º mês	☐
Teste do olhinho (reflexo vermelho)	Antes da alta	☐
Teste do coraçãozinho (oximetria)	Entre 24 e 48 horas, antes da alta	☐
Teste da linguinha	Na maternidade	☐

Fontes: Programa Nacional de Triagem Neonatal e Caderneta da Criança [2][14].

Vacinas logo ao nascer



O QUE DIZEM AS FONTES

BCG e **hepatite B** (esta, idealmente nas primeiras 12 a 24 horas). A próxima ida à sala de vacina é **aos 2 meses** [2][13]. Levem sempre a Caderneta da Criança.

Cuidados do dia a dia



O QUE DIZEM AS FONTES

- **Coto umbilical:** manter limpo e seco e seguir a orientação da maternidade; costuma cair entre 1 e 2 semanas [2][8].
- **Banho:** água morna (por volta de 36–37 °C — teste com o antebraço ou cotovelo). **Nunca deixe o bebê sozinho no banho, nem por um segundo** [2][9].
- **Icterícia** (pele amarelada) é comum nos primeiros dias, mas precisa ser avaliada se surgir nas primeiras 24 horas, se se espalhar para barriga, pernas, palmas e plantas, ou se o bebê estiver muito sonolento [2][8].
- **Temperatura:** meça na axila com termômetro digital. Pela Caderneta da Criança, 37,5 °C ou mais é febre, e abaixo de 35,5 °C também é sinal de alerta [2].
- **Consulta:** a primeira avaliação do bebê (e da mãe) deve acontecer na primeira semana de vida [2][4].

PARTE ESPECIAL



Sinais de perigo no recém-nascido

Lista baseada nos sinais de perigo da Caderneta da Criança, da estratégia AIDPI Neonatal e dos livros de pediatria [2][4][8]. **Diante de qualquer um deles, procure atendimento imediatamente.**

- Não consegue mamar ou vomita tudo o que mama
- Convulsão (tremores ritmados, olhar parado, “ataque”)
- Muito molinho, difícil de acordar, sem reação
- Respiração muito rápida, com gemido, ou costelas “afundando” ao respirar
- Febre ($37,5^{\circ}\text{C}$ ou mais na axila) ou temperatura baixa (abaixo de $35,5^{\circ}\text{C}$)
- Pele ou lábios arroxeados, ou muito pálidos
- Pele muito amarela, principalmente nas primeiras 24 h ou chegando às palmas e plantas
- Umbigo com pus, mau cheiro ou vermelhidão que se espalha pela barriga
- Muitas bolhas ou pústulas na pele
- Cocô esbranquiçado ou muito claro
- Poucas fraldas molhadas, boca seca
- Choro muito diferente do habitual, que não acalma de jeito nenhum



O QUE DIZEM AS FONTES

Os livros de pediatria reforçam que **febre em bebês com menos de 3 meses sempre exige avaliação médica rápida**, pois o sistema imunológico ainda é imaturo e os sinais de infecção podem ser discretos [8][9]. Não dê remédio para febre sem orientação.

♥ Pós-parto: o corpo e as emoções da mãe



O QUE DIZEM AS FONTES

O puerpério dura cerca de 6 semanas. É normal ter sangramento (**lóquios**) que começa vermelho e vai clareando e diminuindo ao longo das semanas [5][6]. O Ministério da Saúde recomenda consulta de puerpério na primeira semana e revisão até 42 dias após o parto [1][19].

Procure atendimento se houver [1]

[4][5]

- Sangramento que aumenta, encharca um absorvente em 1 hora ou tem coágulos grandes
- Febre, calafrios ou secreção com mau cheiro
- Dor forte na barriga, nos pontos ou na cicatriz da cesárea (vermelha, com pus)
- Dor, calor e inchaço em uma perna só
- Falta de ar ou dor no peito
- Dor de cabeça forte, visão embaçada, pressão alta
- Mama vermelha, dura e dolorida com febre

Baby blues ou depressão pós-parto?

	Baby blues	Depressão pós-parto
Frequência	Muito comum — a maioria das mães	Comum — estimativas brasileiras e internacionais de 1 em cada 4 a 1 em cada 7 mães
Quando	Começa nos primeiros dias	Pode começar na gestação ou em qualquer momento do 1º ano
Duração	Melhora sozinho em até ~2 semanas	Dura mais de 2 semanas e atrapalha o dia a dia

O que fazer	Descanso, apoio, acolhimento	Procurar atendimento — tem tratamento
-------------------	------------------------------------	--

Fontes: [\[5\]](#)[\[17\]](#)

Pensamentos de se machucar ou de machucar o bebê, ou sensação de desconexão da realidade, são uma emergência. Procure atendimento imediatamente (SAMU 192, pronto-socorro) e, para apoio emocional, CVV 188.

Check-in emocional (preenchem juntos, toda semana)

Sem ana	Como a mãe está (0–10)	Como o pai/parceria está (0–10)	Precisamos de ajuda?
1			☐ Sim ☐ Não
2			☐ Sim ☐ Não
3			☐ Sim ☐ Não
4			☐ Sim ☐ Não

BÔNUS 1

 Chá de bebê + lista de presentes

Convidado(a)	Confirmou	Presente	Agradeci
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐

Presentes que realmente ajudam

- ☐ Fraldas — **peça tamanhos P e M**, não só RN
- ☐ Lenços umedecidos sem perfume
- ☐ Roupas tamanho P, M e G
- ☐ Toalhas com capuz
- ☐ Fraldas de pano

- ☐ Lençóis de elástico para o berço
- ☐ Itens de higiene indicados pelo pediatra
- ☐ Itens de alimentação, conforme necessidade
- ☐ Vale-refeição/delivery para o pós-parto 😊

Coloque na lista a sugestão de tamanho de fralda: “*Sobrenome A–H: tamanho P · I–P: tamanho M · Q–Z: tamanho G*”. Assim vocês não ganham 30 pacotes de RN.

BÔNUS 2



Organizador e calculadora de fraldas

Tamanho	Estimativa de uso*	Quantidade necessária	Recebidas	Compradas	Falta
RN	~10/dia por 2–4 semanas				
P	~8–10/dia por 1–2 meses				
M	~7–8/dia por 3–5 meses				
G	~6/dia por vários meses				
XG	~5–6/dia				

*Estimativas aproximadas: o número de trocas e o tempo em cada tamanho variam muito com o peso do bebê e a marca da fralda. A planilha .xlsx tem uma calculadora automática em que vocês ajustam esses números.

Como calcular: fraldas por dia × número de dias no tamanho = quantidade necessária. Depois, subtraia o que já ganharam e compraram. Compre de pouco em pouco — o bebê pode pular um tamanho.

BÔNUS 3



Perguntas para o obstetra/pediatra

Anote as dúvidas ao longo da semana — na consulta a gente sempre esquece. **Quem responde é o profissional de saúde.**

Sugestões de perguntas

- ☐ Minha gestação é de risco habitual ou precisa de algum cuidado especial?
- ☐ Quais vacinas ainda preciso tomar?
- ☐ Quais sinais devem me fazer ir direto à maternidade?
- ☐ Quando devo ir para a maternidade se entrar em trabalho de parto?
- ☐ Que exercícios físicos posso fazer?
- ☐ Posso continuar usando meus medicamentos?
- ☐ (Pediatra) Que produtos de higiene vocês indicam?
- ☐ (Pediatra) Como cuidar do umbigo?

☐ (Pediatria) Quando é a próxima consulta e as próximas vacinas?

Minha pergunta	Resposta / orientação	Acompanhar depois?
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não

BÔNUS 4



Cartões da gestação

Tire um print ou recorte. Perfeitos para fotos mês a mês.



Descobrimos que você está chegando!



Estamos preparando tudo para você.



Primeiros chutes.



Estamos cada dia mais perto.



Mala pronta. Só falta você!



Olá, mundo! Cheguei.

BÔNUS 5

Primeiras vezes + checklist de fotos

Momento	Data	Como foi
 Primeiro ultrassom		
 Primeira vez que ouvimos o coração		
 Primeiro chute		
 Primeiro presente		
 Quarto pronto		
 Mala pronta		
 Chegada do bebê		

Fotos para não esquecer

☐ Barriga mês a mês (mesmo lugar, mesma roupa)

☐ Teste positivo

☐ Ultrassom

☐ Chá de bebê

☐ Quarto/cantinho pronto

☐ Saída para a maternidade

☐ Primeiro colo da mãe e do pai

☐ Mãozinha e pezinho

☐ Saída da maternidade

☐ Chegada em casa

☐ Primeiro banho

☐ 1 mês de vida

BÔNUS 6



Lista de contatos

Quem	Nome	Telefone
Maternidade		
Obstetra / equipe de pré-natal		
Pediatra		
UBS de referência		
Plano de saúde		
Banco de leite mais próximo		
Familiar 1		
Familiar 2		
Transporte (plano A)		
Transporte (plano B)		
Quem cuida dos pets		
RH / trabalho		
SAMU		192
CVV (apoio emocional)		188

BÔNUS 7



Planner semanal do casal

Semana: ____ / ____ · Semanas de gestação (ou de vida do bebê): ____

Esta semana precisamos resolver

1. _____
2. _____
3. _____

Compras

Consultas / exames / vacinas

Gastos da semana

R\$ _____

Quem faz o quê

Como estamos nos sentindo?



Pinte os corações. Se a nota ficou baixa por duas semanas seguidas, conversem sobre isso — e com um profissional se precisar.

BÔNUS 8



Operação Bebê a Caminho

O checklist final “está tudo pronto?”

☐ Cantinho do bebê preparado (berço só com colchão e lençol)

☐ Roupas lavadas

☐ Enxoval organizado

☐ Mala pronta

☐ Documentos separados (+ Caderneta da Gestante)

☐ Transporte planejado (plano A e B)

☐ Contatos salvos

☐ Casa organizada

☐ Bebê-conforto instalado adequadamente

☐ Consultas e vacinas da gestação em dia

☐ Página de sinais de alerta na geladeira

☐ Pais respirando 😊

Guia de bolso: quando procurar atendimento



Na gestação

- Sangramento ou perda de líquido
- Dor de cabeça forte, visão turva
- Inchaço súbito no rosto/mãos
- Contrações antes de 37 semanas
- Bebê mexendo menos
- Febre, falta de ar, convulsão



No bebê

- Não mama / vomita tudo
- Molinho, difícil de acordar
- Respiração difícil ou com gemido
- Febre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ou $< 35,5^{\circ}\text{C}$
- Muito amarelo, roxo ou pálido
- Umbigo com pus/vermelhidão
- Convulsão

Na mãe (pós-parto)

- Sangramento que aumenta
- Febre, mau cheiro
- Dor/inchaço em uma perna
- Falta de ar, dor no peito
- Tristeza profunda, pensamentos de se machucar

Números

SAMU 192

Bombeiros 193

CVV 188

Maternidade: _____

Pediatra: _____

Baseado na Caderneta da Gestante, Caderneta da Criança e recomendações da OMS [\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[4\]](#). Em caso de dúvida, procure atendimento.

BÔNUS 10



Checklist para visita à maternidade

Visite (presencialmente ou on-line) entre 30 e 36 semanas. Perguntas para fazer:

- ☐ Por qual entrada chegamos em trabalho de parto? (dia e noite)
- ☐ Onde estacionar?
- ☐ Quais documentos levar na admissão?
- ☐ A maternidade tem lista própria de itens para a mala?
- ☐ Como funciona o acompanhante? Pode trocar?
- ☐ O bebê fica no quarto com a mãe (alojamento conjunto)?
- ☐ Incentivam contato pele a pele e amamentação na primeira hora?
- ☐ Quais testes do recém-nascido são feitos lá?
- ☐ Tem posto de cartório para registro?
- ☐ Tem UTI neonatal?
- ☐ Regras de visitas

☐

O bebê-conforto é exigido na alta?

Anotações

REFERÊNCIAS



Fontes consultadas

As informações de saúde deste kit foram resumidas, com nossas palavras, a partir das obras e documentos abaixo. Recomendações mudam: sempre prevalece a orientação do profissional que acompanha vocês. Conteúdo revisado em setembro de 2026.

Documentos oficiais brasileiros

1. Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Gestante*. Edição mais recente.
2. Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Criança — Passaporte da Cidadania*. Edição mais recente; e MS/OPAS, *Manual AIDPI Neonatal*.
12. Brasil. Ministério da Saúde. *Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar*. Cadernos de Atenção Básica nº 23, 2ª ed., 2015; e *Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos*, 2019.
13. Brasil. Ministério da Saúde. *Calendário Nacional de Vacinação* (gestante e criança) e *Estratégia de Vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em Gestantes*, 2025.

14. Brasil. Ministério da Saúde. *Programa Nacional de Triagem Neonatal*; Lei nº 12.303/2010 (triagem auditiva); Lei nº 13.002/2014 (teste da linguinha).
15. Conselho Nacional de Trânsito. *Resolução CONTRAN nº 819/2021* — transporte de crianças em veículos.
16. Legislação: Constituição Federal, art. 7º, XVIII, e ADCT, art. 10; CLT, arts. 392 e 396; Lei nº 11.770/2008 (Empresa Cidadã); Lei nº 15.371/2026 (licença e salário-paternidade); Lei nº 11.108/2005 (acompanhante); Lei nº 11.634/2007 (vinculação à maternidade); Lei nº 6.015/1973 e Lei nº 9.534/1997 (registro civil); Lei nº 9.656/1998, art. 12 (planos de saúde).
19. Brasil. Ministério da Saúde. *Atenção ao pré-natal de baixo risco*. Cadernos de Atenção Básica nº 32. Brasília, 2012.

Organizações internacionais e sociedades médicas

3. World Health Organization. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Genebra: WHO, 2016.

4. World Health Organization. *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Genebra: WHO, 2022.
10. Moon RY, Carlin RF, Hand I; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. *Pediatrics*. 2022;150(1):e2022057990. (American Academy of Pediatrics)
11. Sociedade Brasileira de Pediatria. *Tratado de Pediatria*, 5ª ed. Manole, 2022; e documentos científicos e campanhas da SBP (sono seguro, transporte seguro, prevenção de acidentes).
17. American College of Obstetricians and Gynecologists. Clinical Practice Guideline nº 4: Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. *Obstet Gynecol*. 2023; Paulson JF, Bazemore SD. Prenatal and postpartum depression in fathers. *JAMA*. 2010;303(19):1961-9; Theme Filha MM et al. Factors associated with postpartum depressive symptomatology in Brazil: the Birth in Brazil study. *J Affect Disord*. 2016;194:159-67.

18. FEBRASGO. Recomendações da vacina vírus sincicial respiratório para gestantes, 2025.

Livros-texto de medicina

5. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM. *Williams Obstetrics*. 26th ed. McGraw Hill, 2022.
6. Zugaib M, Francisco RPV (eds.). *Zugaib Obstetrícia*. 4ª ed. Manole, 2020.
7. Montenegro CAB, Rezende Filho J. *Rezende Obstetrícia*. 13ª ed. Guanabara Koogan, 2017.
8. Kliegman RM, St. Geme JW et al. *Nelson Textbook of Pediatrics*. 22nd ed. Elsevier, 2024.
9. American Academy of Pediatrics. *Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5*. 7th ed. Bantam, 2019.

💛 Feito com carinho para quem está esperando o primeiro filho. Respirem: vocês não precisam saber tudo — só precisam saber onde procurar.