

Tarea 7

1. Supón que el tensor de esfuerzos $\boldsymbol{\sigma}$ es simétrico, es decir, $\boldsymbol{\sigma}^T = \boldsymbol{\sigma}$. Entonces:

a) Muestra que la ecuación de energía se puede escribir como:

$$\rho \frac{D}{Dt} \left(e + \frac{v^2}{2} \right) = \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) + \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \rho r_h - \nabla \cdot \mathbf{q}$$

b) Obtén la *versión termodinámica* de la ecuación de energía:

$$\rho \frac{De}{Dt} = \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) - \nabla \cdot \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho r_h - \nabla \cdot \mathbf{q}$$

2. Demuestra que para un fluido compresible, las ecuaciones de movimiento de Cauchy se pueden expresar como:

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \frac{1}{\rho} \mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mu \nabla^2 \mathbf{v}.$$

Simplifica la ecuación para:

- a) Fluido incompresible.
b) Estado de esfuerzo hidrostático.
3. El campo de velocidad \mathbf{v} se dice que es irrotacional cuando la vorticidad es cero, es decir, $\mathbf{w} = 0$. Entonces, existe un potencial de velocidad $\phi(\mathbf{x}, t)$ tal que $\mathbf{v} = \nabla \phi$. Muestra que las ecuaciones de Navier-Stokes del problema anterior se pueden expresar como:

$$\rho \nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + (\lambda + 2\mu) \nabla (\nabla^2 \phi).$$

4. Muestra que, en el caso de una fuerza de cuerpo irrotacional $\mathbf{f} = -\nabla V$ y cuando la presión p es función únicamente de la densidad ρ , se cumple:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + V + P(\rho) - \frac{1}{\rho} (\lambda + 2\mu) (\nabla^2 \phi)^2 = g(t),$$

donde $P(\rho) = \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{dp}{\rho}$, p_0 es una constante y $g(t)$ es una función únicamente del tiempo.