

Tarea 7

Entrega: 1 de diciembre de 2023

Problema 1

Un reactor de 100 MW consume la mitad de su combustible en 3 años. ¿Cuánto $^{235}\text{U}^{92}$ contiene el reactor?

Solución

Sabemos que la potencia está dada por

$$P = \frac{E}{t},$$
$$\implies E = P \cdot t.$$

Así,

$$E = 100 \text{ MW} \cdot 9.46 \times 10^7 \text{ s},$$

$$E = 9.46 \times 10^{15} \text{ J}.$$

Recordando que

$$E = mc^2,$$

pero como la energía obtenida es para cuando el reactor ha consumido la mitad de su combustible, así que

$$E = \frac{m}{2}c^2,$$
$$\implies m = \frac{2E}{c^2}.$$

Por lo que la cantidad de combustible es de

$$m = \frac{2(9.46 \times 10^{15} \text{ J})}{(3 \times 10^8 \text{ m/s}^2)^2},$$

$$m \approx 0.21 \text{ kg}.$$

Problema 2

Si la masa del Sol es de 10^{29} kg, y su vida total es de 10^9 años, ¿qué potencia disipa al año?

Solución

Sabemos que la energía que se libera por en el ciclo p-p es de 24.68 MeV, que en J es

$$E_{\text{pp}} = 3.95 \times 10^{-12} \text{ J.}$$

Y la cantidad de núcleos se obtiene a partir de

$$N = (10^{29} \cdot 1000 \text{ g}) \cdot \frac{6.023 \times 10^{23} \text{ 1/mol}}{1 \text{ g/mol}},$$

$$N = 6.023 \times 10^{56}.$$

Entonces, la energía liberada es de

$$E = (3.95 \times 10^{-12} \text{ J})(6.023 \times 10^{56}),$$

$$E = 2.38 \times 10^{45} \text{ J.}$$

Finalmente, para obtener la potencia disipada por año,

$$P = \frac{2.38 \times 10^{45} \text{ J}}{3.15 \times 10^{16} \text{ s}},$$

$$P = 7.5417 \times 10^7 \text{ W.}$$

Problema 3

Maussan te da un pedazo de madera que dice ser proveniente de una nave espacial que llegó en 1325 y se estacionó en el patio de su casa ¿qué actividad debería tener dos gramos de esa madera?

Problema 4

El ^{210}Po es un isótopo radiactivo, emisor alfa con la misma actividad que 5 g de ^{226}Ra , con una vida media de 138 376 días. En 2006 el ex espía ruso Alexander Litvinenko fue envenenado con este isótopo. Suponiendo que bastó un microgramo para envenenarlo y que siendo un espía su peso estaba alrededor de los 100 kg ¿cuál sería la dosis equivalente absorbida por el ex espía si en cada decaimiento las partículas pueden depositar una energía de alrededor de 4 MeV?

Problema 5

¿Qué tiempo después del Big Bang se separaron los campos electromagnéticos y débiles? ¿En qué momento se formaron los hadrones?
