

Mecánica Cuántica 2026-1

Examen Parcial 1

Nombre: _____ No. Cuenta: _____

Resuelva los siguientes problemas *EXPLICANDO CON TODO LUJO DE DETALLE* cada paso para encontrar la solución. El examen se califica sobre **100 puntos**.

Problema 1: Función de Onda [30 pts.]:

Para una partícula de masa m que se encuentra en el estado

$$\Psi(x, t) = Ae^{-a\left[\frac{mx^2}{\hbar} + it\right]},$$

donde A y a son constantes positivas.

- Encuentra A .
- Calcula los valores esperados de los operadores \hat{x} , \hat{x}^2 , \hat{p} y \hat{p}^2 .
- Encuentra Δ_x y Δ_p , ¿Es consistente con el principio de incertidumbre?

Problema 2: Barrera de Potencial [30 pts.]:

Considera una partícula de masa m , que se mueve dentro de un potencial cuadrado infinito, cuya función de onda es

$$\psi(x) = \frac{3}{\sqrt{30}}\phi_0 + \frac{4}{\sqrt{30}}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}\phi_4,$$

donde ϕ_n es el n -ésimo estado excitado con energía $E_n = \pi^2 \hbar^2 n^2 / (2ma^2)$.

Encuentra:

- La probabilidad de encontrar el sistema en el estado base.
- La energía promedio del sistema.

Problema 3: Oscilador Armónico [40 pts.]:

Para los primeros dos estados de un oscilador armónico cuántico, encuentra, en términos de los operadores de ascenso y descenso, \hat{a}^\dagger y \hat{a} lo siguiente:

- El valor esperado de $\langle \hat{x} \rangle$ y $\langle \hat{p} \rangle$
- El valor esperado de $\langle \hat{x}^2 \rangle$ y $\langle \hat{p}^2 \rangle$
- Las desviaciones estándar Δr y Δp .
- ¿Es Δr para $n=0$ igual que para $n=1$? Argumenta tu respuesta.
- ¿Es Δp para $n=0$ igual que para $n=1$? Argumenta tu respuesta.
- Encuentra el valor esperado de la energía cinética $\langle T \rangle$ y la energía potencial $\langle V \rangle$. ¿Qué da su suma?

Hint: Recuerda que los estados excitados se pueden encontrar a partir de los estados contiguos, $\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$, $\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$.

Problema extra: Generalización Relativista [10 pts.]:

Tomando en cuenta que la expresión relativista de la energía para una partícula de masa m y momentum p es $E^2 = m_0^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2$. Escribe la versión cuántica de esta ecuación y discute la principal diferencia que existe con la ecuación de Schrödinger.