

Tabla 1
Pruebas de normalidad para variables continuas

Variable	n	W	p-value	Interpretación
Edad (años)	405	0.9770	< 0.001	No normal
Peso (kg)	405	0.9850	< 0.001	No normal
Altura (cm)	405	0.9714	< 0.001	No normal
IMC	405	0.9792	< 0.001	No normal

Nota. Prueba de Shapiro-Wilk; $p < 0.05$ indica desviación estadísticamente significativa de la normalidad.

Tabla 2
Descripción global de variables continuas

Variable	n	Mediana (Q1, Q3)	RIC	Mínimo - Máximo	Valores nulos
Edad (años)	405	65.00 (59.00, 72.00)	59.00 - 72.00	50.00 - 90.00	0
Peso (kg)	405	69.00 (62.00, 77.00)	62.00 - 77.00	38.00 - 112.00	0
Altura (cm)	405	155.00 (151.00, 162.00)	151.00 - 162.00	134.00 - 188.00	0
IMC	405	28.19 (25.28, 31.23)	25.28 - 31.23	17.35 - 48.68	0

Nota. Las variables se resumen con mediana y rango intercuartílico por la evidencia de no normalidad.

Tabla 3

Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value
Características demográficas					
Edad	50-59	111 (27.4)	77 (69.4)	34 (30.6)	< 0.001
	60 a 69	162 (40.0)	139 (85.8)	23 (14.2)	
	70 y más	132 (32.6)	128 (97.0)	4 (3.0)	
Sexo	Hombre	78 (19.3)	64 (82.1)	14 (17.9)	0.5371
	Mujer	327 (80.7)	280 (85.6)	47 (14.4)	
Estado civil	En pareja	230 (56.8)	187 (81.3)	43 (18.7)	
	Sin pareja	175 (43.2)	157 (89.7)	18 (10.3)	
Lugar de residencia	Municipios de Jalisco	210 (51.9)	178 (84.8)	32 (15.2)	1.0000
	Zona Metropolitana de Guadalajara	195 (48.1)	166 (85.1)	29 (14.9)	
Condiciones materiales de la vida					
Escolaridad	Con estudios	332 (82.0)	279 (84.0)	53 (16.0)	
	Sin estudios	73 (18.0)	65 (89.0)	8 (11.0)	
Situación laboral	Con trabajo	97 (24.0)	74 (76.3)	23 (23.7)	
	Desempleado	308 (76.0)	270 (87.7)	38 (12.3)	
Situación económica	Nivel bajo	337 (83.2)	290 (86.1)	47 (13.9)	
	Nivel medio	21 (5.2)	14 (66.7)	7 (33.3)	
	Nivel alto	2 (0.5)	2 (100.0)	0 (0.0)	
	Sin información	45 (11.1)	38 (84.4)	7 (15.6)	

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde.

Tabla 3 (continuación 2)
Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value
Sistema sanitario					
Derechohabiente	Sin cobertura	61 (15.1)	50 (82.0)	11 (18.0)	0.6102
	Con cobertura	344 (84.9)	294 (85.5)	50 (14.5)	
Enfermedad	Síndrome metabólico	301 (74.3)	253 (84.1)	48 (15.9)	
	Otras enfermedades	28 (6.9)	28 (100.0)	0 (0.0)	
	Sano	76 (18.8)	63 (82.9)	13 (17.1)	
Cohesión social					
Convivencia	Acompañado	335 (82.7)	280 (83.6)	55 (16.4)	
	Vive solo	70 (17.3)	64 (91.4)	6 (8.6)	
Apoyo en enfermedad	Autocuidado	195 (48.1)	164 (84.1)	31 (15.9)	0.7535
	Tiene apoyo	210 (51.9)	180 (85.7)	30 (14.3)	
Participación en grupos de ayuda mutua	No participa	358 (88.4)	301 (84.1)	57 (15.9)	0.2633
	Sí participa	47 (11.6)	43 (91.5)	4 (8.5)	
Estilo de vida					
Actividad física	No realiza	167 (41.2)	133 (79.6)	34 (20.4)	0.0185
	Sí realiza	238 (58.8)	211 (88.7)	27 (11.3)	
Frecuencia de actividad física	6+ veces	81 (20.0)	76 (93.8)	5 (6.2)	
	4-5 veces	49 (12.1)	44 (89.8)	5 (10.2)	
	2-3 veces	96 (23.7)	83 (86.5)	13 (13.5)	

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde.

Tabla 3 (continuación 3)
Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value
Plan alimenticio	1 vez	26 (6.4)	23 (88.5)	3 (11.5)	0.4579
	No aplica	153 (37.8)	118 (77.1)	35 (22.9)	
	Con plan alimenticio	66 (16.3)	56 (84.8)	10 (15.2)	
	Sin plan alimenticio	339 (83.7)	288 (85.0)	51 (15.0)	
Consumo de lácteos	Alta (5-7 días)	149 (36.8)	126 (84.6)	23 (15.4)	< 0.001
	Media (3-4 días)	83 (20.5)	74 (89.2)	9 (10.8)	
	Baja (0-2 días)	173 (42.7)	144 (83.2)	29 (16.8)	
Clasificación IMC	Normal	97 (24.0)	96 (99.0)	1 (1.0)	< 0.001
	Sobrepeso	164 (40.5)	150 (91.5)	14 (8.5)	
	Obesidad	144 (35.6)	98 (68.1)	46 (31.9)	

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde.

Tabla S1
Proceso de eliminación hacia atrás del modelo logístico

Iteración	Variables	Variable con mayor p	p máximo	Acción
1	edad, imc, sexo, trabaja, realiza_af, enfermedad_cat_1, enfermedad_cat_2	enfermedad_cat_2	0.9864	Eliminar
2	edad, imc, sexo, trabaja, realiza_af, enfermedad_cat_1	realiza_af	0.7885	Eliminar
3	edad, imc, sexo, trabaja, enfermedad_cat_1	trabaja	0.6168	Eliminar
4	edad, imc, sexo, enfermedad_cat_1	enfermedad_cat_1	0.4797	Eliminar
5	edad, imc, sexo	sexo	0.0024	Detener

Nota. El criterio de permanencia fue $p \leq 0.10$; la variable con mayor valor p se eliminó en cada iteración.

Tabla 4
Modelo de regresión logística multivariada para alteración ósea

Variable	Coefficiente (B)	Error Estándar	Valor p	OR	IC 95% Inferior	IC 95% Superior
Intercepto	1.073	1.840	0.560	2.92	0.08	107.80
Edad	0.147	0.026	< 0.001	1.16	1.10	1.22
IMC	-0.313	0.045	< 0.001	0.73	0.67	0.80
Sexo: mujer vs hombre	1.334	0.440	0.002	3.80	1.60	8.99

Nota. B = coeficiente logit; OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza. La categoría de referencia para sexo es Hombre (0); para trabaja y actividad física es No (0). El modelo final proviene de eliminación hacia atrás con criterio $p \leq 0.10$.