

C09 — Warsztat projektu: od scenariusza do dwóch małych analiz

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Miejsce w opowieści	1
2. Scena badawcza	3
3. Pytanie, jednostka i zmienne	4
4. Słownik statystyczny	5
5. Wzór czytany jak zdanie	6
6. Gotowy skrypt pomocniczy	7
7. Dane, braki i mianownik	8
8. Tor klasyczny	9
9. Tor permutacyjny lub decyzja o jego braku	10
10. Efekt i przedział	11
11. Wykres jako część argumentu	12
12. Wynik czytany linia po linii	13
13. Błędy interpretacji	14
14. Próba prowadzona	15
15. Zadanie Z09	16
16. Rubryka, kontrola i dalszy krok	17
Źródło kontekstu	17

1. Miejsce w opowieści

Każdy student ma jeden z dwudziestu scenariuszy i indywidualne dane. Budujemy plan, w którym pytanie, operacjonalizacja, zmienne, metoda i interpretacja tworzą jedną sekwencję.

Pytanie przewodnie: Jak zaplanować projekt ilościowy, aby dwie analizy odpowiadały pytaniom i nie wykraczały poza dane syntetyczne?

Rdzeń zajęć trwa 90 minut. Strony oznaczone jako „po zajęciach” służą utrwaleniu; podczas spotkania uruchamiamy gotowy kod, czytamy liczby i zapisujemy własne wyjaśnienie.

Minuty	Praca
0–10	Powrót do poprzedniego odcinka i pytanie
10–30	Zmienne, wzór i symbole
30–55	Gotowe wyniki i dwa tory, jeśli dotyczą
55–80	Zadanie na indywidualnych danych
80–90	Kontrola, oddanie i zapowiedź kolejnego kroku

2. Scena badawcza

Każdy student ma jeden z dwudziestu scenariuszy i indywidualne dane. Budujemy plan, w którym pytanie, operacjonalizacja, zmienne, metoda i interpretacja tworzą jedną sekwencję.

Badana osoba wykonuje krótkie zadanie wyszukiwawcze w cyfrowej usłudze informacyjnej, a potem odpowiada na sześć pozycji samooceny. Rejestrujemy czas i powodzenie jako pomiar obserwacyjny. Częstość korzystania, samoocena oraz wybrane kanały są deklaracjami. Rozdzielenie tych źródeł jest częścią interpretacji, ponieważ wysoka pewność nie musi oznaczać sprawnego wykonania.

Dane demonstracyjne dotyczą scenariusza S02 i są syntetyczne. Ich rozkłady przygotowano do nauki, dlatego nie wolno opisywać nimi realnej biblioteki ani użytkowników UJ. Jednostką analizy jest osoba po usunięciu identycznych duplikatów. Każdy brak pozostaje brakiem, dopóki słownik nie podaje jawnej reguły.

3. Pytanie, jednostka i zmienne

Analizowane zmienne: **wynik porównania, grupa, indeks, czas, powodzenie, druga analiza scenariusza.**

Przed spojrzeniem na wynik odpowiedz głośno na cztery pytania: kto jest obserwacją, co jest zmienną, jaka jest skala i w jakiej jednostce pojawi się rezultat. Nazwa kolumny jest technicznym adresem; znaczenie pochodzi z operacjonalizacji oraz słownika danych.

Element	Pytanie kontrolne	Odpowiedź w tej historii
Jednostka	Co zajmuje jeden wiersz?	jedna osoba i jedno zadanie
Samoopis	Co osoba deklaruje?	pozycje, częstość, kanały
Obserwacja	Co zapisuje procedura?	czas i powodzenie
Granica wniosku	O czym mówią dane?	o syntetycznej próbie dydaktycznej

Skala pomiarowa ogranicza sens działań. Dla kategorii liczymy osoby i odsetki; dla uporządkowanych odpowiedzi możemy porównywać kolejność; dla czasu sens mają różnice i ilorazy. Indeks 1–5 traktujemy w kursie jako przybliżoną zmienną ilościową, ale pamiętamy, że powstał z pozycji porządkowych. Nazwanie skali przed analizą chroni przed mechanicznym wyborem testu.

4. Słownik statystyczny

Statystyka jest językiem skrótu. Symbol ma nazwę, znaczenie w badaniu i jednostkę. Odczytuj wzór zdaniem, zanim podstawisz liczby.

Symbol	Nazwa	Znaczenie w przykładzie	Jednostka
Y	wynik	indeks albo czas	punkty/minuty
G	grupa	dwa poziomy scenariusza	kategoria
X	drugi predyktor	częstość, czas lub indeks	zależnie od skali
θ	efekt	różnica, V albo korelacja	jednostka metody

Wartość p nie jest prawdopodobieństwem prawdziwości hipotezy. Przedział nie jest zakresem środkowych 95% obserwacji. Efekt nie jest tym samym co istotność. Te trzy rozróżnienia wracają w każdej analizie.

Notatnik pojęć. Dla każdego symbolu dopisz jedną liczbę z gotowego wyniku i przeczytaj ją bez skrótu. Zamiast „ t równa się” powiedz „obserwowana różnica leży tyle błędów standardowych od wartości zerowej”. Zamiast „ V równa się” powiedz „znormalizowana siła związku w tabeli wynosi”. Taki przekład jest ważniejszy niż pamięciowe odtwarzanie wzoru.

5. Wzór czytany jak zdanie

pytanie → zmienne → estymata → niepewność → wniosek

Czytamy od lewej do prawej, nazywając licznik, mianownik i jednostkę. Znak wyniku ma sens dopiero po ustaleniu kolejności grup lub kierunku skali. Jeżeli we wzorze jest N, chodzi o przypadki rzeczywiście użyte w danym obliczeniu, a nie automatycznie o wszystkie wiersze surowego pliku.

Ćwiczenie ustne. Wskaż w formule estymatę, element niepewności i punkt odniesienia. Jeżeli dana metoda ich nie ma, powiedz to wprost. Następnie przewidź, co stanie się z wynikiem po zwiększeniu N, zmianie jednostki albo odwróceniu kolejności grup.

Czytanie wzoru ma pięć kroków: (1) nazwij wynik po lewej stronie, (2) nazwij obserwowane wielkości po prawej, (3) wskaż porównanie lub wartość zerową, (4) ustal jednostkę, (5) powiedz, jaka zmiana danych zwiększa wynik. Nie wykonujemy ręcznie długich obliczeń. Wzór ma odsłonić logikę liczby zwracanej przez gotową funkcję.

6. Gotowy skrypt pomocniczy

Pierwszy chunk materiału załadował towarzyszący plik `analiza.R`. Zawiera przygotowanie danych, obiekty i funkcje potrzebne na zajęciach. Uruchamiasz kolejne fragmenty i odczytujesz wynik. Nie implementujesz testu ani pętli permutacyjnej.

```
wynik_glowny
```

```
##      scenariusz                                projekt
## 1      S02 Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.
##      druga_analiza
## 1 tabela krzyżowa
```

W zadaniu indywidualnym analogiczny skrypt powstaje przez `przygotuj_zadanie()`. Wolno zmienić jedynie wartości oznaczone komentarzem jako parametry. Dzięki temu przedmiot ocenia rozumienie wyniku, a nie biegłość w programowaniu.

Po zmianie parametru uruchom cały skrypt od początku. Pojedyncze obiekty pozostawione w Environment mogą pochodzić ze starszej próby, dlatego nie są dowodem odtwarzalności. Zapisany plik w `wyniki` ma powstać ponownie w świeżej sesji. Jeśli nazwa zmiennej jest niedozwolona, funkcja zatrzymuje analizę i podaje listę dopuszczalnych wartości.

7. Dane, braki i mianownik

```
knitr::kable(head(tabela_glowna, 10), digits = 3)
```

etap	wartosc
pytanie 1	Czy grupy różnią się indeksem?
wynik	indeks
predyktor	grupa
metoda klasyczna	Welch
metoda permutacyjna	tasowanie etykiet
efekt	różnica i Hedges g

Zanim przeczytasz statystykę, ustal N i braki. Dla średniej N oznacza ważne liczby. Dla korelacji są to kompletne pary. Dla tabeli jest to suma analizowanych komórek. Dla indeksu przypadek musi mieć co najmniej pięć odpowiedzi po właściwym ukierunkowaniu.

Dwa wyniki mogą używać różnych N w tym samym raporcie. Nie jest to sprzeczność, jeśli wynika z braków i zostało jawnie opisane. Nie wolno dopasowywać reguły braków po zobaczeniu, która wersja daje korzystniejsze p.

Brak może dotyczyć jednej pozycji, całego indeksu albo pary zmiennych. Duplikat jest powtórzeniem rekordu, a obserwacja odstająca nadal może być prawdziwą obserwacją. Te pojęcia wymagają innych decyzji. Dziennik czyszczenia powinien pozwolić odtworzyć, ile elementów zmieniła każda reguła i dlaczego wynikowe N jest właściwym mianownikiem.

8. Tor klasyczny

Plan przewiduje jedną analizę porównania i jedną analizę związku właściwą scenariuszowi. Dla każdej zapisujemy wymagane N, statystykę, p, efekt i przedział.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(wynik_klasyczny), digits = 4)
```

analiza	wynik
porównanie grup	indeks
tabela kategorii	powodzenie

Odczytaj wynik bez etykiety „dobry” lub „zły”. Powiedz, jaka estymata odpowiada pytaniu, co mierzy statystyka oraz jakie założenie projektu ogranicza interpretację. Jeżeli widzisz p, opisz je warunkowo: przy modelu zerowym i przyjętej procedurze.

Karta odczytu toru klasycznego. Zapisz: (a) nazwę metody, (b) N lub liczebności grup, (c) estymatę i jednostkę, (d) statystykę wraz z df, jeśli występują, (e) p, (f) jedno założenie. Jeżeli metoda na tej stronie nie jest testem, wpisz „nie dotyczy” zamiast wymyślać p. Kompletność wyniku jest oceniana oddzielnie od jego istotności.

9. Tor permutacyjny lub decyzja o jego braku

Każda analiza inferencyjna ma odpowiadający tor permutacyjny: zmiana znaków, tasowanie grup, Monte Carlo tabeli albo tasowanie jednej zmiennej. Typ tasowania wynika z hipotezy zerowej.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(wynik_permutacyjny), digits = 4)
```

analiza	procedura
porównanie grup	tasowanie grup
tabela kategorii	Monte Carlo

W analizie inferencyjnej liczba B określa rozdzielczość szacowanego p . Za każdym razem trzeba powiedzieć, co dokładnie tasowano i jaki związek został zerwany. Nazwa „permutacyjny” nie zwalnia z wyjaśnienia hipotezy zerowej.

Karta odczytu toru permutacyjnego. Uzupełnij zdanie: „Przy braku związku lub różnicy wielokrotnie zmieniano znaki, tasowano etykiety lub losowano tabele, za każdym razem liczono tę samą statystykę, a określony odsetek wyników był co najmniej tak skrajny jak obserwowany”. Następnie porównaj wniosek z torem klasycznym bez wybierania mniejszego p .

10. Efekt i przedział

Projekt musi nazwać główny efekt przed oglądaniem p. Różnica w naturalnej jednostce ma pierwszeństwo interpretacyjne, a standaryzowany efekt ułatwia porównanie. CI wskazuje precyzję.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(efekt), digits = 4)
```


analiza	miara
porównanie grup	różnica + g
tabela kategorii	V Cramera

Znaczenie praktyczne oceniamy w kontekście usługi: minuty, punkty skali, różnica odsetków albo siła związku. Uniwersalne etykiety mały/średni/duży nie zastępują pytania, czy efekt zmienia decyzję instytucji i jak precyzyjnie został oszacowany.

Przedział szeroki obejmuje wiele możliwych wielkości efektu i wymaga ostrożniejszego języka. Przedział wąski może nadal koncentrować się wokół efektu praktycznie małego. Gdy przedział przecina zero, nie zapisujemy automatycznie „brak efektu”; podajemy zakres zgodnych wartości i oceniamy, czy obejmuje skutki istotne dla usługi informacyjnej.

11. Wykres jako część argumentu

wykres_glowny



Wykres odpowiada na pytanie o położenie, kształt, nakładanie się grup lub kierunek związku. Tytuł, osie i jednostki są częścią wyniku. Nie wnioskuj o istotności tylko z wyglądu, lecz sprawdź, czy obraz jest spójny z tabelą i estymatą.

Przeczytaj wykres w trzech warstwach. Najpierw opisz elementy widoczne bez testu: zakres, skupienie i nietypowe obserwacje. Potem połącz je z estymatą w tabeli. Na końcu nazwij rzecz, której wykres nie rozstrzyga, np. przyczynowość, błąd pomiaru albo zachowanie wyniku w nowej próbie. Nie usuwaj obserwacji tylko dlatego, że psuje prostą historię.

12. Wynik czytany linia po linii

Karta planu powinna pozwolić obcej osobie przewidzieć, które kolumny wejdą do analizy, jaki wiersz wyniku odpowie na pytanie i jakie ograniczenie będzie konieczne.

Schemat pełnego zdania: „W analizie N osób oszacowano [efekt] w [jednostce], 95% CI [dolna; górna]. Statystyka klasyczna wyniosła [symbol i df], p =[wartość], a procedura permutacyjna B losowań dała p_{perm} =[wartość]. Wynik opisuje [zakres] i nie rozstrzyga [ograniczenie]”.

Podczas zajęć jedna osoba czyta tabelę, druga sprawdza znak i jednostkę, a trzecia wskazuje granicę wniosku. Dopiero po tej kontroli zapisujemy odpowiedź do pliku Markdown.

Dobra interpretacja ma trzy warstwy. Warstwa liczbowa mówi, co oszacowano. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie informacyjne lub wykonanie zadania. Warstwa krytyczna wskazuje, czego projekt, pomiar i syntetyczność nie pozwalają stwierdzić. Pominięcie którejkolwiek warstwy tworzy tekst technicznie poprawny, lecz metodologicznie niepełny.

13. Błędy interpretacji

Błąd: „wykonam wszystkie testy i wybiorę istotny”. Poprawnie: „dla pytania o grupy wybieram indeks i test Welcha z permutacją etykiet; druga analiza wynika z przypisanego scenariusza”.

Dodatkowe pułapki: traktowanie braku istotności jako dowodu równości, pomijanie N , raportowanie samego p , utożsamienie samooceny z kompetencją oraz zamiana obserwacyjnego związku w przyczynę. Poprawa polega na dodaniu liczby, jednostki, zakresu i ograniczenia, a nie na bardziej stanowczym czasowniku.

Porównaj dwie konstrukcje: „test wykazał efekt” i „oszacowana różnica wyniosła..., a wynik testu był...”. Druga oddziela wielkość od decyzji. Podobnie „grupy były takie same” zastępujemy opisem przedziału i precyzji. W raporcie nie używamy słowa „trend” jako sposobu ratowania p nieco większego od .05; opisujemy rzeczywisty efekt i jego niepewność.

Po zajęciach. Znajdź w swoim szkicu jedno zdanie zawierające „wpływa”, „udowadnia”, „brak różnicy” albo „95% wyników”. Przepisz je tak, aby odpowiadało projektowi i rzeczywistemu znaczeniu statystyki.

14. Próba prowadzona

1. Otwórz gotowy skrypt i wskaż sekcję parametrów.
2. Uruchom cały plik bez zmiany dalszej części.
3. Otwórz zapisany CSV i odnajdź N , estymatę oraz jednostkę.
4. Jeżeli analiza jest inferencyjna, porównaj p klasyczne i permutacyjne.
5. Odczytaj efekt i przedział.
6. Napisz jedno zdanie wyniku oraz jedno zdanie ograniczenia.

Jeżeli skrypt zgłasza błąd, najpierw sprawdź katalog projektu, nazwę parametru i dozwoloną wartość. Nie poprawiaj wnętrza funkcji statystycznej. Błąd parametru jest informacją o niedozwolonym wyborze, a nie zaproszeniem do przepisania procedury.

Podział czasu próby: 3 minuty na uruchomienie, 4 na odnalezienie właściwego CSV, 5 na głośny odczyt tabeli, 5 na szkic interpretacji i 3 na kontrolę ograniczenia. Jeśli grupa utknie, wraca do pytania, jednostki i znaku efektu. Celem jest krótkie, sprawdzalne rozumowanie, nie zwiększanie liczby wykonanych poleceń.

15. Zadanie Z09

Uruchom Z09, wybierając jeden dozwolony wynik. W odpowiedziach zapisz dwa pytania, zmienne i skale, oba tory analiz, efekt, spodziewany plik oraz ograniczenia doboru, pomiaru i symulacji.

Przygotuj pliki poleceniem poniżej. Uruchom zapisany **analiza.R**, a następnie uzupełnij wszystkie pola [UZUPELNIJ] w **odpowiedzi.md**. Nie wklejaj kodu ani zrzutu całej konsoli.

```
przygotuj_zadanie('Z09', katalog = '.')  
sprawdz_zadanie('Z09', katalog = '.')  
oddaj_zadanie('Z09', katalog = '.')
```

16. Rubryka, kontrola i dalszy krok

Kryterium	Punkty
Z09.1: Indywidualny scenariusz i manifest danych zgodne z ID, rocznikiem i wersją.	2
Z09.2: Problem, pytania i hipotezy są konkretne i pasują do instytucji oraz dostępnych zmiennych.	3
Z09.3: Plan próby i operacjonalizacja/kwestionariusz nadają się do planowanego badania.	3
Z09.4: Dwie analizy mają uzasadnione tory klasyczne i permutacyjne, efekt, przedział oraz ograniczenie.	2

Automatyczna kontrola sprawdza pliki, parametry, odtwarzalność i zgodność eksportu. Prowadzący ocenia dobór języka, odczyt liczb, interpretację efektu oraz ograniczenie. Poprawny skrypt bez własnego wyjaśnienia nie realizuje zadania.

Po wysyłce sprawdź `status_oddania()` i zdalne SHA. Na współdzielonym komputerze wywołaj `wyloguj_github()`, wyloguj przeglądarkę i zamknij RStudio bez `.RData`. Następne ćwiczenie rozpoczyna się od pobrania potwierdzonej wersji.

Źródło kontekstu

Dwadzieścia scenariuszy różni kontekst i konstrukty, ale zachowuje równoważny ciężar analityczny. Każdy projekt jest indywidualny i wyłącznie ilościowy.

Materiały odwołują się do: Wilsona (1999), Kuhlthau (1991), Savolainen (1995), Hargittai (2002), Dig-Comp 2.2, ACRL Framework oraz Internet Skills Scale. Są to ramy pojęciowe; dane i pozycje kursowe pozostają syntetyczne i dydaktyczne.