preparatis samedicino gamoyenebis
instruqcia

`naloqsoni-zn”
(NALOXONE-ZN)

Semadgenloba:
aqtiuri nivTiereba: naloqsoni
1 ml xsnari Seicavs naloqsonis hidroqlorids 100%-ze gadaangariSebiT - 0.4 mg.
damxmare nivTierebebi: natriumis qloridi, ganzavebuli marilmJava, saineqcio wyali.

wamlis forma: saineqcio xsnari
ZiriTadi fizikur-qimiuri Tvisebebi: gamWvirvale ufero siTxe

farmakoTerapiuli jgufi
antidotebi, ATC kodi V03A B15

farmakologiuri Tvisebebi
farmakodinamika.
naloqsoni warmoadgens opiaturi receptorebis konkurent antagonists da miekuTvneba opiaturi receptorebis e.w. `sufTa~ antagonistebs. upiratesad, blokavs μ-receptorebs da am receptorebTan mniSvnelovani msgavsebis gamo, aviwroebs narkotikul analgetikebs maTi SekavSirebis adgilebSi da am gziT anadgurebs opiatebis Warbi dozis simptomebs da Trgunavs rogorc endogenuri opiaturi peptidebis, ise egzogenuri opioiduri analgetikebis moqmedebas; naklebi xarisxiT zemoqmedebs sxva opiatur receptorebze.
naloqsonis Seyvana xels uSlis, asustebs an gamoricxavs (dozis da Seyvanis xangrZlovobis mixedviT) opioiduri analgetikebis efeqtebs, aRadgens sunTqvas, amcirebs sedaciur moqmedebas da eiforias, asustebs hipotenzur efeqts.
naloqsoni gamoricxavs narkotikuli saSualebebis farTo jgufis, opiaturi receptorebis rogorc agonistebis, ise antagonistebis, moqmedebas, rogorebicaa morfini, apomorfini, heroini, kodeini, dihidrokodeini, promedoli, metadoni, pentazocini, fentanili, buprenorfini.
es preparati Tavidan gvacilebs centralur da periferul toqsikur simptomebs: sunTqvis daTrgunvas, Tvalis gugebis Seviwroebas, kuWis daclas, disforias, komas, krunCxvebs, agreTve narkotikuli analgetikebis analgezur efeqtebs, da aseve gvacilebs Tavidan alkoholis didi dozebis toqsikur moqmedebas.
naloqsoni efeqturia agreTve sunTqvis funqciis darRvevebisas Sereuli saxis mowamvlis dros, rasac iwvevs opioiduri saSualebebi barbituratebTan, benzodiazepinebTan da alkoholTan erTad.
naloqsoni aprovocirebs wamlis moxsnis sindroms opioidur saSualebebze damokidebul pacientebSi.
preparats ar gaaCnia analgeziuri aqtivoba, ar iwvevs disforiasa da fsiqomimetikur simptomebs, wamaldamokidebulebis niSnebis ganviTarebasa da Camoyalibebas.
farmakokinetika.
intravenurad Seyvanisas, preparatis moqmedeba iwyeba ukve 0,5-2 wuTis Semdeg da grZeldeba 20–40 wuTamde. kunTSi an kanqveSa Seyvanisas, misi moqmedeba iwyeba 2-3 wuTis Semdeg da grZeldeba 2,5–3 saaTamde periodis ganmavlobaSi. naxevardaSlis saSualo periodi Seadgens 1-1,5 saaTs; axalSobilebSi es periodi ufro xangrZlivia da Seadgens 3 saaTs. naloqsoni metabolizdeba RviZlSi, sadac warmoqmnis glukoronidebs. metabolitebi gamoiyofa SardTan erTad. Tirkmelebisa da RviZlis ukmarisobis

zemoqmedeba Seswavlili ar aris. naloqsons SeuZlia gadalaxos hematoencefaluri da placentaruli barierebi.

klinikuri maxasiaTeblebi

Cvenebebi.

opiatebis Warbi doza. gamoiyeneba sasunTqi centris opiatebiT gamowveuli daTrgunvis Tavidan asacileblad, sunTqvis aRsadgenad axalSobilebSi mSobiresaTvis opioiduri analgetikebis Seyvanis Semdeg; rogorc sadiagnostiko saSualeba savaraudod opioid-damokidebuli avadmyofebisaTvis.

ukuCvenebebi

momatebuli mgrZnobeloba preparatis komponentebis mimarT

urTierTqmedeba sxva wamlebTan da urTierTqmedebis sxva saxeebi

naloqsoni-zn Tavidan gvacilebs opioiduri analgetikebis analgezur moqmedebas.

opioidur saSualebebze damokidebul pacientebSi, naloqsonis hidroqloridis Seyvanam SeiZleba gamoiwvios gamoxatuli absistenciis (hipertonia, gulis riTmis darRveva, filtvebis SeSupeba, gulis gaCereba) simptomebi. es preparati amcirebs tramadolisa da buprenorfinis efeqtebs, magram misi moqmedeba xanmoklea. miiCneva, rom es efeqti warmoadgens buprenorfinis maRali dozebisas analgeziis Semcirebis `doza-pasuxis" TaRovani mrudis Sedegs.

pacientisaTvis klonidinTan kombinciaSi micemisas, naloqoni-zn-m SeiZleba Seamciros klonidinis antihipertenziuli moqmedeba.

standartuli dozebiT micemisas, preparati ar auqmebs barbituratebisa da trankvilizatorebis efeqtebs.

am preparatisa da alkoholis erTdruli gamoyenebis Sesaxeb informacia araerTgvarovania. multiintoqsikaciis pacientebSi, rodesac multiintoqsikacia gamowveulia opioidebisa da sedaciuri saSualebebis an alkoholis moqmedebis Sedegad, gamomdinare intoqsikaciis mizezidan SeiZleba naloqsonis hidroqloridis Seyvanis Semdeg, multiintoqsikaciis zogierTi efeqtis moxsnis Sedegi SeiZleba ufro swrafad dadges.

naloqsoni araTavsebadia bisulfitebis Semcveli preparatebis xsnarebTan. farmcevtulad Tavsebadia 0.9% natriumis qloridis xsnarTan, 5% deqstrozas xsnarTan, sterilur saineqcio wyalTan.

gamoyenebis Taviseburebebi

naloqsoni ar aris efeqturi araopioiduri narkotikebiT gamowveuli sunTqvis daTrgunvis mimarT. zogierTi opioiduri analgetikis moqmedebis xangrZlivobam SesaZloa naloqsoni-zn-is moqmedebis xangrZlivobas gadaaWarbos, amitom, pacientebi mudmivi samedicino meTvalyureobis qveS unda imyofebodnen, iseT pirobebSi, sadac SesaZlebeli iqneba filtvebis xelovnuri ventilacia da sxva reanimaciuli RonisZiebebis ganxorcieleba.

opioid-damokidebuli pacientebisaTvis, aucilebelia, rom preparatis Seyvana moxdes Zalian frTxilad, radgan SesaZloa ganviTardes absistencia. aRwerilia hipertoniis, gulis riTmis darRvevis, filtvebis SeSupebis, gulis gaCerebis SemTxvevebi. es aseve exeba opioid-damokidebuli dedebis axalSobilebs.

naloqsonis hidroqloridma SeiZleba gamoiwvios hipotonia, hipertonia, parkuWovani taqikardia, fibrilacia da filtvebis SeSupeba. es arasasurveli efeqtebi dafiqsirebulia operaciis Semdgom periodebSi, ufro xSirad im pacientebSi, romlebsac aReniSneboda gul-sisxlZarTvTa daavadebebi an romlebic Rebulobdnen gul-sisxlZarRvTa daavadebebis gverdiTi efeqtebis gamomwvev preparatebs. imis miuxedavad, rom uSualo mizez-Sedegobrivi kavSiri gamovlenili ar yofila, mainc saWiroa gamoviCinoT sifrTxile naloqsoni-zn-is

micemisas im pacientebisaTvis, romlebsac awuxebT gulis daavadebebi da aseve maTTvis, romlebic parkuWovani taqikardiis, fibrilaciis, gulis gaCerebis gamomwvev kardiologiur nivTierebebs (magaliTad – kokains, metamfetamins, ciklur antidepresantebs, kalciumis arxebis blokatorebs, beta-blokatorebs, digoqsins) Rebuloben.
cxovelebze Catarebuli eqsperimentebiT, dadgenilia fertilizaciis daTrgunva da teratogenuri efeqtis ararseboba.

gamoyeneba orsulobis an ZuZuTi kvebis periodSi
cxovelebze Catarebuli eqsperimentebiT, dadgenilia reproduqciuli toqsikuroba. potenciuri riski adamianis mimarT, ucnobia.
orsulobis periodSi preparati iniSneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac savaraudo sargebeli nayofisaTvis, potenciur risks aRemateba. naloqsonis hidroqloridma SeiZleba gamoiwvios absistenciis sindromi axalSobilebSi.
cnobili ar aris, aRwevs Tu ara es preparati mkerdis rZeSi, amitom, misi gamoyenebis aucileblobis SemTxvevaSi, ZuZuTi kveba unda Sewydes, an SeCerdes am preparatis miRebidan 24 saaTis periodiT.

zemoqmedeba reaqciis siswrafeze avtotansportis marTvisas an sxva meqanizmebTan muSaobisas
naloqsoni-zn mkurnalobis periodSi, satransporto saSualebebis marTva da sxva meqanizmebTan muSaoba nebadarTuli ar aris.

gamoyenebis wesi da dozebi
naloqsoni-zn preparati Seiyvaneba venaSi nakadiT (ineqcia), venaSi wveTovaniT (infuzia), da aseve Seiyvaneba kunTSi. dozas dgens eqimi individualurad, TiToeuli pacientisaTvis. kunTSi ineqcia iniSneba im SemTxvevebSi, rodesac preparatis Seyvana venaSi SeuZlebelia.
mwvave SemTxvevebSi, upiratesoba unda mieniWos am preparatis Seyvanas venaSi, radgan es meTodi yvelaze swraf Terapiul efeqts uzrunvelyofs. kunTSi Seyvanisas, preparatis efeqti vlindeba ufro gvian, magram grZeldeba ufro xangrZlivad (venaSi SeyvanasTan SedarebiT).
naloqsonis moqmedebis xangrZlivoba damokidebulia Seyvanil dozaze da Seyvanis meTodze, da cvalebadobs 45 wuTidan 4 saaTamde farglebSi.
imis gamo, rom zogirTi opioidis (magaliTad deqstropropoqsifenis, dihidrokodeinis, meTadonis) moqmedeba ufro didxans grZeldeba naloqsonTan SedarebiT, pacientebi mudmivi zedamxedvelobis qveS unda imyofebodnen, preparatis ganmeorebiTi micema ki dasaSvebia mxolod aucilebel SemTxveevebSi.
<u>sasunTqi centris opiatebiT gamowveuli daTrgunvis sruli an nawilobrivi moxsna.</u>
zrdasrulebi
dozas gansazRvravs eqimi, invividulurad sunTqvis funqciis normalizebis mizniT, adeqvaturi analgeziis SesanarCuneblad. naloqsonis venaSi ineqcia 0.1-0.2 mg doziT (daaxloebiT 1.5-3 mkg sxeulis masis 1 kg-ze) Cveulebriv, sakmarisia. aucileblobis SemTxvevebSi, damatebiT SeiZleba Seyvanili iqnas 0.1 mg doza 2-wuTiani intervaliT, sunTqvis srulad aRdgenamde da gonze mosvlamde. damatebiTi doza SeiZleba saWiro gaxdes 1-2 saaTis Semdeg, imis da mixedviT, Tu ra saxis moqmedebas (xanmokle efeqti an xangrZlivi efeqti) avlens aqtiuri nivTiereba, romlis mimarTac naloqsoni warmoadgens antagonists, agreTve misi raodenobis, Seyvanis xangrZlivobisa da meTodis mixedviT.
alternatiulad, naloqsoni-zn SeiZleba gamoviyenoT venaSi infuziis saxiT. zogierTi opioidebis moqmedebis xangrZlivoba venaSi mtkivneuli infuziis saxiT Seyvanili naloqsonis moqmedebis xangrrZlivobas aWarbebs. amitom, Tu sasunTqi centris daTrgunva gamowveulia aseTi nivTierebebiT, an arsebobs aseTi varaudi,

naloqsoni gamoyenebuli unda iqnas venaSi infuziis saxiT. Seyvanis siCqare ganisazRvreba pacientis mdgomareobidan gamomdinare, agreTve venaSi ineqciisa da infuziis mimarT misi reaqciis gaTvaliwinebiT. aseve unda iqnas ganxiluli venaSi uwyveti infuziis SesaZlebloba, xolo aucileblobis SemTxvevaSi, gatarebuli unda iqnas sunTqvis SenarCunebis zomebi.

bavSvebi

naloqsonis sawyisi doza Seadgens 0.01-0.02 mg-s sxeulis wonis TiToeul kg-ze, sami wuTis ganmavlobaSi SeyvaniT, sunTqvis srulad aRdgenamde da gonze mosvlamde. damatebiTi doza SeiZleba dainiSnos 1-2 saaTiani intervaliT, pacientis reaqciis, gamoyenebuli opiatebis dozisa da maTi moqmedebis xangrZlivobis mixedviT.

<u>opiatebis mwvave Warbi dozireba</u>

zrdasrulebi

sawyisi doza Seadgens 0,4-2 mg-s venaSi SeyvaniT. Tu sunTqvis aRdgena ver miiRweva, preparati ganmeorebiT Seiyvaneba 2-3 wuTis Semdeg. naloqsoni-zn SeiZleba agreTve gakeTdes kunTSi (sawyisi dozaa 0.4-2 mg), Tuki venaSi Seyvana SeuZlebelia. Tu pacientis mdgomareoba 10 mg naloqsonis Seyvanis Semdegac ar gaumjobesdeba, SeiZleba davaskvnaT, rom sasunTqi centris daTrgunva gamowveulia sxva faqtorebiT an sxva preparatebiT, da ara opioidebiT.

bavSvebi

rekomendirebuli sawyisi dozaa 0.1 mg sxeulis masis TiToeul 1 kg-ze. Tu sasurvvli efeqti ver iqneba miRweuli, damatebiTi ineqcia keTdeba doziT 0.1 mg sxeulis masis TiToeul 1 kg-ze. pacientis mdgomareobis mixedviT, SeiZleba dadebiTad iyos naCvenebi venaSi infuzia. Tu venaSi Seyvana SeuZlebelia, naliqsoni-zn keTdeba kunTSi, sawyisi doziT 0.1 mg sxeulis masis TiToeul 1 kg-ze. es doza nawildeba ramdenime Seyvanaze.

<u>sunTqvis aRdgena axalSobilebSi, romelTa dedebic opiatebs Rebulobdnen</u>

Cveulebrivi dozaa 0.01 mg sxeulis masis 1 kg-ze, venaSi SeyvaniT Tu am dozis micemis Semdeg sunTqvis funqcia ver aRdgeba, ineqcia SeiZleba ganmeodes 2-3 wuTis Semdeg. venaSi Seyvanis SeuZleblobis SemTxvevaSi, naloqsoni-zn keTdeba kunTSi, sawyisi doziT 0.01 mg sxeulis masis TiToeul 1 kg-ze.

xandazmuli asakis pacientebi

xandazmuli asakis pacientebs, romlebsac aReniSneba gulsisxlZarRvTa daavadebebi, an romlebic kardiologiur preparatebs Rebulobdnen, naloqsoni-zn sifrTxilis dacviT unda mieces. gasaTvaliswinebelia agreTve naloqsoni-zn-is arasasurveli efeqtebi, rogorebicaa taqikardia da parkuWebis fibrilacia operaciis Semdgom periodSi.

xsnaris ganzaveba

venaSi infuziisaTvis, naloqsoni-zn unda ganzavdes 0.9% natriumis qloridis xsnariT an 5% glukozis xsnariT. preparatis 5 ampulis SigTavsi (2 mg) unda ganzavdes 500 ml erT-erT am gamxsnelSi, manam, sanam mza xsnaris koncentracia ar miaRwevs 4 mkg/ml-s.

gamoyenebis win, agreTve ganzavebis Semdeg, aucilebelia, rom xsnari Semowmdes gamWvirvaleobaze. gamoiyeneba mxolod gamWvirvale, ufero, xiluli nawilakebisagan Tavisufali xsnari.

bavSvebi

pediatriul praqtikaSi, es preparati gamoiyenerba Cvenebebis mixedviT da instruqciaSi miiTebuli dozebiT

Warbi doza

simptomebi: gulisreva, pirRebineba, arteriuli hipertenzia, parkuWovani taqikardia, parkuWebis fibrilacia, gulis gaCereba, filtvebis SeSupeba.

mkurnaloba: simptomuri
dozis gadaWarbebis Tavidan asacileblad, aucilebelia mkacrad davicvaT preparatis rekomendirebuli dozebi.

gverdiTi reaqciebi
naloqsoni-zn-is swrafi Seyvanisas, SeiZleba ganviTardes sxvadasxva gverdiTi reaqciebi:
saWmlis momnelebeli sistemis mxriv: gulisreva, pirRebineba, diarea, piris simSrale.
gul-sisxlZarRvTa sistemis mxriv: ariTmia, bradikardia, taqikardia, hipotenzia, arteriuli hipertenzia, parkuWebis fibrilacia, gulis gaCereba, asistolia.
centraluri nervuli sistemis mxriv: kankali, krunCxvebi, Tavbrusxveva, Tavis tkivili, daZabuloba, hiperventilacia.
fsiqikuri darRvevebi: qceviTi xasiaTis cvlilebebi, maT Soris Zaladobrivi qcevebi, nervozuloba, mousvenroba, agznebadoba, gaRizianeba.
alergiuli reaqciebi: riniti, qoSini, gamonayari kanze, qavili, WinWris cieba, multiformuli eriTema, angionevrozuli SeSupeba, anafilaqsiuri Soki.
sxva: momatebuli oflianoba, operaciis Semdgomi tkivili, cvlilebebi Seyvanis adgilas, maT Soris sisxlZarRvebis kedlebis gaRizianeba (intravenuri Seyvanisas), adgilobrivi gaRizianebebi da anTebebi (kunTSi Seyvanisas).
naloqsoni-zn-is micemam rekomendirebulze ufro maRali dozebiT, SeiZleba gamoiwvios tkivilis ganaxleba operaciis Semdgom periodSi da agznebadoba, arteriuli hipotenzia an hipertenzia, parkuWovani taqikardia, parkuWovani fibrilacia, filtvebis SeSupeba, qoSini.
`moxsnis~ sindromi opioid-damokidebul pacientebSi: daudgeneli tkivili, diarea, hiperTermia, ronorea, cemineba, momatebuli oflianoba, gulisreva, pirRebineba, nervozi, gadaRliloba, gaRizianeba, tremori, spazmebi epigastriumis areSi, taqikardia, hipertenzia, mTqnareba, sisuste; axalSobilebSi – krunCxvebi, diarea, hiperTermia, uwyveti tirili, hiperrefleqsia, cemineba, tremori, uCveulo gaRizianeba, pirRebineba.
naloqsoni-zn-is micema Terapiuli dozebiT, im pacientebisaTvis, romelTa organizmi ar Seicavs opioidebs, rogorc wesi, ar iwvevs gverdiT efeqtebs.

vargisianobis vada.
3 weli.

Senaxvis pirobebi
inaxeba original SefuTvaSi, araumetes 25^0C temperaturaze.
SeinaxeT bavSvebisaTvis miuwvdomel adgilze.

SeuTavsebloba
praparati araTavsebadia im preparatiebis xsnarebTan, romlebic Seicavs bisulfitebs, metabisulfitebs, maRalmolekuluri wonis grZel jaWvs an anionebs, tutovan pH xsnarebs.
preparatis Sereva sxva wamlebTan, ar SeiZleba.
preparati gankuTvnilia mxolod calke gamoyenebisTvis.

SefuTva
1 ml ampulaSi, 5 ampula blisterze, 2 blisteri kolofSi.

gacemis wesi:
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით (გადაუდებელი დახმარებისას გაიცემა ურეცეპტოდ)

mwarmoebeli:
SezRuduli pasixismgeblobis sazogadoeba `xarkovis farmacevtuli sawarmo «zdorovie narodu».

mwarmoeblis adgilmdebareoba da misi saqmianobis ganxorcielebis adgilis misamarTi
ukraina, 61002, xarkovis olqi, q. xarkovi, kulikovskaias q. 41

bolo gadaxedvis TariRi: 03.04.2019