

GUÍA DE  
**AVES**  
DEL JARDÍN BOTÁNICO DE  
TIZATLÁN, TLAXCALA



CARLOS LARA  
CECILIA CUATIANQUIZ LIMA  
MARÍA JOSÉ PÉREZ CRESPO

# **Universidad Autónoma de Tlaxcala**

**Serafín Ortiz Ortiz**  
Rector

**Victor Job Paredes Cuahquentzi**  
Secretario Académico

**Dora Juárez Ortiz**  
Secretaria de Investigación y Posgrado

**Alfredo Adán Pimentel**  
Coordinador División de Ciencias Biológicas

**Jorge Rodríguez Antolín**  
Coordinador Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta

# Agradecimientos

Esta guía es producto del apoyo por parte de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, así como del financiamiento de la Secretaría de Educación Pública a través del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) otorgado a los Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para la divulgación de la avifauna que alberga el Jardín Botánico de Tizatlán, Tlaxcala. Con esto, se busca motivar la conservación y protección de las aves que esta importante área verde posee y divulgar el conocimiento generado por investigadores del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala trabajando en el Estado.

La conformación de esta guía fue posible gracias al trabajo entusiasta de los niños y jóvenes scouts del grupo 4 de Tlaxcala: Adriana, Christian, Felipe, Mildred, Sebastián, Carmina y Víctor, quienes aprendieron junto con nosotros a identificar las aves de este importante pulmón para la ciudad de Tlaxcala.

Todas las fotos de aves fueron tomadas en el Jardín Botánico por Carlos Lara y María José Pérez Crespo, excepto aquellas de Greg Lavaty.

Esperamos que la presente guía permita fomentar el gusto, admiración y conocimiento por este hermoso grupo de organismos, que forman una parte importante de la biodiversidad de nuestro país.

Los autores


Primera edición 2011

Forma de citar:

Lara, C., Cuatianquiz-Lima, C. y Pérez-Crespo, M. J. 2011. Guía de aves de Jardín Botánico de Tizatlán, Tlaxcala. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, México. 69 pp.

Foto de portada: Chinito (*Bombycilla cedrorum*) tomada por Carlos Lara

## ¿Que ver en un ave?



---

## DESCRIPCIÓN DE ESPECIES

---



## **Garza ganadera (*Bubulcus ibis*)**

**Identificación:** Mide hasta 50 cm. Pico amarillo, naranja-rosado cuando anida; patas rosa coral. Puede tener café rojizo en la corona, pecho y espalda.

**Distribución:** Principalmente tierras bajas y las vertientes de ambas costas, y tierras altas en el norte de México.

**Hábitat:** Campos, prados, tierras irrigadas, playas, zonas con vegetación baja y suelos desnudos.

**Alimentación:** Garrapatas y otros insectos chupadores de sangre, chapulines, escarabajos y lagartijas.



Maria Jose Pérez Crespo

## Chorlo tildío (*Charadrius vociferus*)

**Identificación:** Mide entre 22 y 28 cm. Vientre, barbilla y pecho blanco, el cual contrasta con dos bandas negras. Rabadilla color oro-rojiza.

**Distribución:** Anida desde Alaska hasta el centro de México. Inverna desde Alaska hasta Sudamérica.

**Hábitat:** Campos, prados, tierras irrigadas, playas, zonas con vegetación baja y suelos desnudos.

**Alimentación:** Come lombrices, larvas de insecto, caracoles y pequeños crustáceos.



## Playero alzacolita (*Actitis macularia*)

**Identificación:** Mide unos 19 cm. Tiene manchas redondas y negras en el pecho, ausentes cuando inverna. Tiene una línea blanca sobre el ojo.

**Distribución:** Migratorio común en el país. Inverna en las costas y tierras interiores bajas.

**Hábitat:** Lagos de orillas pedregosas, charcos, bordes de los arroyos y ríos; en invierno también en las playas.

**Alimentación:** Insectos, pequeños crustáceos, moluscos, gusanos; algunas veces semillas y bayas.



## Paloma ala blanca (*Zenaida asiatica*)

**Identificación:** Mide de 28 a 32 cm. Tiene un parche diagonal y blanco cruzando el ala. Anillo azul alrededor de los ojos. Cola redondeada, con las esquinas blancas.

**Distribución:** Amplia distribución en el país, excepto montañas elevadas.

**Hábitat:** Matorral, bosques secos, mezquite, ciudades, selva alta y sus acahuales.

**Alimentación:** Semillas, frutas e insectos.



Maria José Pérez Crespo

## Tórtola cola larga (*Columbina inca*)

**Identificación:** Pequeña, de 18 y 23 cm. Delgada, con el plumaje aparentando escamas. Tiene rojizo en las alas.

**Distribución:** Se encuentra en casi todo el país a excepción de la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Ciudades, granjas, matorrales, campos de cultivo.

**Alimentación:** Semillas, frutos e insectos.



Carlos Lara

## Colibrí oreja-blanca (*Hylocharis leucotis*)

**Identificación:** Macho tiene un línea blanca detrás del ojo. Pico rojo con la punta negra, partes inferiores verdes y garganta color esmeralda. Hembra parecida al macho pero con garganta blanquecina y con manchas, costados verdosos. Miden hasta 9 cm.

**Distribución:** Tierras altas de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Tamaulipas hacia el sur hasta Oaxaca.

**Hábitat:** Bosques de pino y encino, jardines y cerca de arroyos.

**Alimentación:** Néctar de flores, áfidos e insectos pequeños.



## Colibrí berilo (*Amazilia beryllina*)

**Identificación:** Macho verde brillante en las partes inferiores, la rabadilla y cola castaño purpúreo y mucho castaño en las alas. Pico rojo en la parte inferior. La hembra es más opaca, el vientre gris o café. Miden 9 cm.

**Distribución:** Tierras bajas del sur de Sonora, sur de Chihuahua al este hasta Veracruz y al sur hasta Chiapas.

**Hábitat:** Ecotonos de bosques, cafetales, plantíos de plátano, jardines.

**Alimentación:** Néctar de flores, áfidos e insectos pequeños.



## Carpintero de pechera (*Colaptes auratus*)

**Identificación:** Mide de 25 a 36 cm. Espalda café y rabadilla blanca. Tiene rojo bajo las alas y la cola. El bigote es rojo en el macho, la corona café, y garganta y mejillas grises.

**Distribución:** Amplia distribución. Desde Norteamérica, Centroamérica hasta Cuba.

**Hábitat:** Arboledas, ríos arbolados, ciudades y cañones desiertos.

**Alimentación:** Capturan insectos perforando la corteza de los árboles; algunos comen hormigas, insectos voladores, cerezas, bellotas y savia.



Carlos Lara

## Carpintero bellotero (*Melanerpes formicivorus*)

**Identificación:** Mide de 21 y 24 cm. Cabeza negra con vivos blancos y corona roja. Rabadilla blanca. Tiene un parche blanco en el ala visible cuando vuela.

**Distribución:** De amplia distribución desde el sur de los EU hasta Colombia. En México se encuentra en las tierras bajas del Golfo y norte de Chiapas. En el centro del país puede encontrarse en las tierras altas.

**Hábitat:** Bosques de encino, arboledas, bosques mixtos y estribaciones de montañas

**Alimentación:** Insectos, frutos, bellotas y savia.



Maria José Pérez Crespo

## Carpintero mexicano (*Picoides scalaris*)

**Identificación:** Mide de 14 a 19 cm. Tiene la espalda rayada como cebra y negro con líneas negras y el rostro formando un triángulo. El macho tiene la gorra negra y la hembra blanca.

**Distribución:** Casi en todas las zonas áridas del país.

**Hábitat:** Desiertos, cañones, vegetación árida, bosques húmedos.

**Alimentación:** Insectos.



## Píbi mayor (*Contopus pertinax*)

**Identificación:** Mosquero gris que mide cerca de 19 cm. Cabeza grande con cresta alborotada. Mandíbula inferior amarilla.

**Distribución:** Desde el suroeste de EU, las tierras altas de México y el norte de Centroamérica hasta Nicaragua.

**Hábitat:** Bosques de pino-encino, cañones arbolados y áreas de vegetación con claros

**Alimentación:** Insectos voladores, frutos pequeños y reptiles.



Maria José Pérez Crespo

## **Cardenalito (*Pyrocephalus rubinus*)**

**Identificación:** Mide de 13 a 15 cm. El macho tiene la mayor parte del cuerpo color rojo fuego, que contrasta con las alas y rabadilla de color negruzco. Hembra café gris de arriba, blanquecina de abajo, las partes inferiores con tinte rosa o amarillo.

**Distribución:** En zonas áridas o semiáridas de todo el país.

**Hábitat:** Cerca de agua en desiertos, mezquites, sauces, bosques de tierras bajas de pino, sabanas abiertas y matorrales.

**Alimentación:** Principalmente insectos voladores.



## Mosquero lampiño (*Camptostoma imberbe*)

**Identificación:** Pequeño, de hasta 10 cm. Muy parecido al reyezuelo. Partes inferiores gris oliva e inferiores banco sucio con grisáceo cruzándole el pecho. Barras de las alas color ante opaco.

**Distribución:** Bosques bajos, mezquite, vegetación riparia, arbustos.

**Hábitat:** Cerca de agua en desiertos, mezquites, sauces, bosques de tierras bajas de pino, sabanas abiertas y matorrales.

**Alimentación:** Principalmente insectos voladores.



## **Mosquero negro (*Sayornis nigricans*)**

**Identificación:** Mide de 14 a 15 cm. Cabeza y espalda en gris-café. Pecho gris pálido.

**Distribución:** De Alaska al centro de México. Migratorio de invierno desde la Península de Baja California a Chiapas, excepto la costa del Pacífico, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Zonas áridas o semiáridas de todo el país.

**Hábitat:** Áreas de matorral. Percha en las puntas de hierbas altas y en ramas de bajo nivel en árboles y arbustos

**Alimentación:** Principalmente insectos voladores.



Carlos Lara

## Tirano gritón (*Tyrannus vociferans*)

**Identificación:** Mide entre 20 y 23 cm. Vientre amarillo y cola negra; cabeza y pecho gris oscuro.

**Distribución:** Anida desde el suroeste de EU hasta el sur de México; inverna en la costa oeste y sur de México.

**Hábitat:** Áreas abiertas secas, bosques abiertos, ciudades, fincas. Nidos en los árboles.

**Alimentación:** Captura insectos voladores en el aire.



Maria José Pérez Crespo

## Vireo reyezuelo (*Vireo huttoni*)

**Identificación:** Anillo ocular incompleto, interrumpido por una mancha negra arriba del ojo. Color café oliva con dos barras anchas y blancas en el ala. Mide de 10 a 12 cm.

**Distribución:** En las montañas de los estados fronterizos del norte hasta el sur de Baja California y después se extiende hacia todo el país hasta Chiapas.

**Hábitat:** Bosques y arbustos adyacentes, prefieren los encinos.

**Alimentación:** Insectos.



## **Chara pecho gris (*Aphelocoma ultramarina*)**

**Identificación:** Mide de 30 a 32 cm. Es azul mate de arriba con un brillo gris café en la espalda; las partes inferiores son gris claro con un tinte café opaco en el pecho.

**Distribución:** Ampliamente distribuidos en las montañas de los estados del norte, excepto Baja California, al sur hasta las tierras altas de Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz.

**Hábitat:** Encinares abiertos, bosques de pino-encino, juníperos y matorrales.

**Alimentación:** Omnívoros.



## Sastrecillo (*Psaltriparus minimus*)

**Identificación:** Mide de 10 a 11 cm. Tiene la espalda gris, las partes inferiores claras, y unas características mejillas cafés o negras. Pico truncado y cola larga.

**Distribución:** Desde el noroeste de Baja California a las montañas de los estados del norte del país, y hacia el sur a través de la planicie central hasta Oaxaca y las montañas de Chiapas.

**Hábitat:** Arbustos en bosque de encino, chaparrales, bosques mixtos, piñoneros y juníperos.

**Alimentación:** Insectos, semillas y bayas.



## Saltapared tepetatero (*Thryomanes bewickii*)

**Identificación:** Pequeño, de entre 12 y 14 cm. Es café grisáceo con las partes inferiores muy claras y una línea o ceja blanquecina. Cola relativamente larga y oscura con blanco en las plumas externas.

**Distribución:** Desde el sur de los EU hasta Baja California, y el noreste de Sonora y Nuevo León hasta el centro de México y Oaxaca.

**Hábitat:** Arbustos, sotobosque, juníperos, encinos, jardines y parques.

**Alimentación:** Insectos y arañas.



## Chivirín Saltapared (*Troglodytes aedon*)

**Identificación:** Ave pequeña y rechoncha de entre 12 y 14 cm. Es de color gris y no tiene ceja superciliar.

**Distribución:** De amplia distribución, desde Baja California, centro de México hasta el Istmo de Tehuantepec.

**Hábitat:** Arbustos, bosques abiertos, matorrales, ciudades y jardines

**Alimentación:** Insectos y arañas.



## **Reyezuelo rubí (*Regulus calendula*)**

**Identificación:** Mide de 10 a 12 cm. Tiene un incompleto anillo ocular blanco. Es pequeña, gris oliva de arriba con dos barras claras en el ala. El macho tiene un parche escarlata en la corona. Cola truncada.

**Distribución:** En zonas áridas o semiáridas de todo el país.

**Hábitat:** Bosque de coníferas; y en invierno en tierras boscosas y arbustos.

**Alimentación:** Insectos, sus huevos y larvas.



## Perlita azul gris (*Polioptila caerulea*)

**Identificación:** Mide hasta 11 cm. Es de color gris arriba con el vientre blanquecino, cola larga y negra con los lados blancos. Anillo ocular angosto. El macho tiene una línea negra cruzándole la frente.

**Distribución:** Residente ampliamente distribuido en la región noroeste del país. Inverna en todas partes.

**Hábitat:** Bosque de coníferas, juníperos, matorrales, tierras boscosas y arbustos.

**Alimentación:** Insectos, sus huevos y larvas.



## Primavera (*Turdus migratorius*)

**Identificación:** Espalda gris y pecho rojo ladrillo. Mide de 22 a 27 cm. El macho tiene la cabeza y cola negruzcas, y en la hembra son grises. Pico amarillo.

**Distribución:** Anida en tierras altas del sur hasta Oaxaca, oeste y centro de Veracruz. En invierno llega hasta Baja California y es raro en la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Ciudades, prados, ranchos, bosques abiertos a lados de arroyos, acahuales.

**Alimentación:** Principalmente insectos voladores.



Carlos Lara

## Mirlo dorso rufo (*Turdus rufopalliatus*)

**Identificación:** Mide hasta 23 cm. Tiene las partes inferiores canela extenso; la cabeza y cola grisáceas, pero con un tinte rojizo en la espalda. Garganta rayada.

**Distribución:** Vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hacia el sur hasta el Istmo de Tehuantepec. También en partes de centro del país.

**Hábitat:** Copas de los árboles en fructificación de bosques deciduos, matorrales densos, parques y jardines.

**Alimentación:** Insectos, gusanos, caracoles, bayas.



Greg Lavaty

## Mirlo pardo (*Turdus grayi*)

**Identificación:** Mide de 22 a 25 cm. Es café claro de arriba, marrón opaco en el pecho, y leonado claro o canela-ante en el vientre. Garganta rayada con color café.

**Distribución:** Vertiente del Golfo desde Nuevo León, Tamaulipas al sur y este hasta la Península de Yucatán. También desde Guerrero hasta Chiapas.

**Hábitat:** Montañas altas, bosques de niebla, encinos y bosques abiertos.

**Alimentación:** Insectos, gusanos, caracoles, bayas.



## Cuitlacoche (*Toxostoma curvirostre*)

**Identificación:** Manchas indistintas en el pecho y barras angostas en el ala. Ojo color naranja o rojizo. Pico negro. Mide de 24 a 29 cm.

**Distribución:** En zonas áridas o semiáridas de todo el país.

**Hábitat:** Desiertos, matorrales áridos, límites de bosques con arbustos.

**Alimentación:** Insectos y frutas.



Carlos Lara

## Estornino (*Sturnus vulgaris*)

**Identificación:** Mide de 19 a 21 cm. Apariencia triangular cuando vuela. Plumaje oscuro con visos verdes y púrpura brillante. En invierno su color se ve densamente moteado de blanco. Pico amarillo.

**Distribución:** Recientemente a invadido México en varias zonas, incluyendo Guanajuato, Distrito Federal, sur de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán.

**Hábitat:** Graneros, ranchos, zonas abiertas, campos, ciudades y jardines.

**Alimentación:** Omnívoros, insectos, bayas y semillas.



## Chinito (*Bombycilla cedrorum*)

**Identificación:** Cresta alargada, café y con puntas de la cola amarilla. Antifaz negro. Mide de 16 a 20 cm.

**Distribución:** En zonas áridas o semiáridas de todo el país.

**Hábitat:** Bosques abiertos, árboles en fructificación, huertos; en invierno es irregular.

**Alimentación:** Frutos e insectos.



Carlos Lara

## Capulinero gris (*Ptilogonyx cinereus*)

**Identificación:** Ave delgada con cresta gris, y un llamativo dibujo en blanco y negro en su larga cola. Los flancos de la cola son amarillos. La hembra es parecida al macho pero café.

**Distribución:** Montañas altas desde Sinaloa, Chihuahua, centro de Nuevo de Nuevo León y sureste de Tamaulipas al sur hasta Chiapas.

**Hábitat:** Bosques abiertos en zonas de pino-encino y copas de los árboles solitarios.

**Alimentación:** Bayas, insectos y muérdagos.



## **Chipe de coronilla (*Vermivora ruficapilla*)**

**Identificación:** Mide de 11 a 12 cm. Tiene arillo blanco en el ojo, y la garganta y flancos son amarillos. Cabeza gris, contrastando con la espalda verde oliva. Los machos tienen un parche castaño pálido en la corona.

**Distribución:** Ampliamente distribuido en México durante la migración y el invierno, excepto en Baja California y la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Ecotonos y arbustos.

**Alimentación:** Insectos.



Carlos Lara

## Chipe negrogris (*Dendroica nigrescens*)

**Identificación:** Macho gris de arriba, blanco de abajo, con la garganta, mejillas y corona negras. Tiene una pequeña mancha amarilla anterior al ojo. La hembra no tiene garganta negra. Mide de 11 a 12 cm.

**Distribución:** Anida al norte de Baja California, noreste de Sonora. Migra e inverna en el oeste y altiplanicie central hacia el sur hasta Oaxaca.

**Hábitat:** Laderas de encino, piñones, juníperos, bosques abiertos mixtos.

**Alimentación:** Principalmente insectos.



Maria José Pérez Crespo

## **Chipe coronado (*Dendroica coronata*)**

**Identificación:** Macho azul grisáceo de arriba y un parche negro notorio en el pecho en forma de V invertida. Tiene garganta, corona y flancos amarillos. Hembra café con dos barras blancas en el ala. Adultos y jóvenes en invierno son café de arriba, blanquecino de abajo, rayado y con la garganta blanca y rabadilla amarilla.

**Distribución:** Anida en las montañas altas hacia el sur hasta el norte de Baja California y en la Sierra Madre Occidental desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Durango. Inverna en todo el país, excepto la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Bosques de coníferas, bosques abiertos, arbustos, matorrales, jardines y playas.

**Alimentación:** Principalmente insectos.



Carlos Lara

## Chipe negro-amarillo (*Dendroica townsendi*)

**Identificación:** Macho con mejillas y corona negras y vivos amarillos en la cabeza. Mide de 10 a 12 cm. La hembra tiene garganta muy amarilla, no negra; y un parche oscuro en la mejilla sobre el rostro amarillo.

**Distribución:** Migratorio en Baja California e inverna desde las tierras altas del noreste de Sinaloa y centro de Nuevo León hasta el sur de Chiapas.

**Hábitat:** Bosques Abies y pino; en invierno también en encinos, laureles y madroños.

**Alimentación:** Insectos.



## **Chipe garganta naranja (*Dendroica fusca*)**

**Identificación:** Macho con garganta color negro y blanco, y la cabeza naranja intenso. Hembra más clara pero con naranja en la garganta. Mide de 11 a 14 cm.

**Distribución:** Migratorio por el este y sur de México, incluyendo la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Bosques de coníferas y acahuales de selvas tropicales

**Alimentación:** Insectos.



Greg Lavaty

## **Chipe corona naranja (*Vermivora celata*)**

**Identificación:** Verde oliva de arriba, amarillo verdoso abajo, pecho finamente rayado. La corona naranja rara vez se puede observar. Sexos parecidos. Mide hasta 12 cm.

**Distribución:** Ampliamente distribuido en el país en época de migraciones y visitante invernal, excepto en la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Árboles dispersos, matorrales y sotobosque.

**Alimentación:** Insectos.



## Chipe corona negra (*Wilsonia pusilla*)

**Identificación:** Macho con gorra negra y redonda. La hembra puede tenerla, pero los inmaduros no. Color oliva de arriba, amarillo brillante de abajo, sin rayas o barras en el ala.

**Distribución:** Migratorio ampliamente distribuido en México, excepto la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Matorrales a lo largo de arroyos arbolados, marañas de ramas húmedas, arbustos bajos, sauces, alisos y bosques tropicales.

**Alimentación:** Insectos.



Greg Lavaty

## Chipe trepador (*Mniotilla varia*)

**Identificación:** Macho con rayas blanco y negro a lo largo del dorso; la hembra tiene blanco abajo. Miden hasta 14 cm.

**Distribución:** Migratorio y visitante de invierno ampliamente distribuido, más común en la región del este.

**Hábitat:** Bosques, arboledas y sotobosque.

**Alimentación:** Insectos.



## Semillero de collar (*Sporophila torqueola*)

**Identificación:** Mide de 10 a 12 cm. Macho con collar blanco completo o semi completo, rabadilla leonada o blanquecina, con capucha negruzca, pecho completamente negro, pico robusto o redondo. Hembra café clara. Anillo ocular y barras color ante en las alas.

**Distribución:** Vertiente del Pacífico y tierras altas del centro de México hasta la Península de Yucatán.

**Hábitat:** Campos de malezas, pastos altos, matorrales a lo largo de caminos.

**Alimentación:** Semillas, Insectos y frutos pequeños.



## Toquí pardo (*Pipilo fuscus*)

**Identificación:** Mide de 19 a 21 cm. Café grisácea con cola oscura y larga. Cola rojizo-pálida, y garganta delimitada por manchas oscuras. La corona puede ser ligeramente rojiza.

**Distribución:** Desiertos, laderas áridas y tierras altas desde los estados norteños al sur hasta el sur de Baja California, Oaxaca, oeste y centro de México hasta Veracruz.

**Hábitat:** Áreas arbustivas y pedregosas, bosques abiertos, mezquite y campos de cultivo.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



## Rascador manchado (*Pipilo maculatus*)

**Identificación:** Mide de 18 a 21 cm. Tiene ojos rojos. Machos con cabeza, partes dorsales y la parte superior del pecho color negro pardas, con algunas manchas claras en al espalda, alas y cola. Los flancos son de color canela y el pecho es blanco. La hembra tiene el mismo patrón, pero es menos oscura en las partes superiores.

**Distribución:** Oeste de Norteamérica, México y Guatemala.

**Hábitat:** Áreas arbustivas, bosques abiertos, chaparrales, jardines.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



## Gorrión ceja blanca (*Spizella passerina*)

**Identificación:** Pecho grisáceo y gorra rojiza, con una línea negra a través del ojo y una línea blanca encima. Mide de 12 a 14 cm.

**Distribución:** Migratoria, se reproduce desde el norte de Baja California, hacia los estados del noroeste a través del centro del país hasta Chiapas.

**Hábitat:** Bosques abiertos, coníferas, granjas, huertas y campos de cultivo.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



Carlos Lara

## Gorrión cantor (*Melospiza melodia*)

**Identificación:** Cuerpo con un rayado grueso del pecho que confluye hacia una mancha ventral central grande

**Distribución:** Se reproduce en los estados del norte del país, hacia las tierras altas de Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

**Hábitat:** Arbustos densos, pantanos, jardines y vegetación a lo largo de caminos.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



## Picogrueso tigrillo (*Pheucticus melanocephalus*)

**Identificación:** Macho con pecho café y cabeza negra, alas contrastadas en blanco y negro, pico grande y pálido. La hembra es parduzca y rayada, pecho café claro y un rayado ligero en los costados. Mide de 16 a 19 cm.

**Distribución:** Desde el norte de México hasta el sur de Oaxaca. Migra hasta las tierras bajas del Pacífico.

**Hábitat:** Bosques de pino encino, bosques mixtos, chaparral alto, piñones, huertas, jardines y vegetación ribereña.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



## Picogrueso azul (*Passerina caerulea*)

**Identificación:** Hembra parduzca brillante, más clara ventralmente con dos barras parduzcas en el ala, rabadilla con tinte azul. Machos color azul opaco. Picos gruesos. Mide de 15 a 19 cm.

**Distribución:** Se reproduce en los estados del norte del país y a través de todo el país, excepto la Península de Yucatán. Inverna en los estados norteños hacia el sur de Veracruz.

**Hábitat:** Campos de malezas y arbustos, sauces, vegetación densa en ríos.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



## Zanate (*Quiscalus mexicanus*)

**Identificación:** Color negro e iridiscente, con cola amplia en forma de abanico, ojo banco o amarillo en ambos sexos. La hembra es de color café y mucho más pequeña. El macho mide hasta 42 cm y la hembra 32 cm.

**Distribución:** Se reproduce en los estados del norte del país, hacia las tierras altas de Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

**Hábitat:** Vegetación secundaria, arbustos densos, campos de cultivo, jardines, manglares, playas.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



Maria José Pérez Crespo

## Tordo ojo rojo (*Molothrus aeneus*)

**Identificación:** Mide hasta 22 cm. Machos con ojos rojos, cuerpo oscuro. La hembra es más pequeña, de color negruzco pálido.

**Distribución:** Ampliamente distribuido desde los estados norteños hasta Chiapas y la Península de Yucatán; ausente en Baja California.

**Hábitat:** Zonas de cultivo, arbustos, campos semiabiertos.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



## Golondrina tijereta (*Hirundo rustica*)

**Identificación:** Mide de 14 a 19 cm. Es azul-negro de arriba, canela ante de abajo, con la garganta más oscura y la cola muy horquillada.

**Distribución:** Anida al noroeste de Baja California y desde el norte de Sonora y Chihuahua hacia el sur en las tierras altas hasta Michoacán, Puebla y Veracruz. Migratorio ampliamente distribuido.

**Hábitat:** Tierras abiertas o con pocos árboles, campos de cultivo, pantanos, lagos, cerca de caseríos.

**Alimentación:** Insectos que caza en vuelo.



Maria José Pérez Crespo

## Bolsero dorso rayado (*Icterus pustulatus*)

**Identificación:** Mide hasta 20 cm. Tiene espalda rayada y blanco en las alas. Machos color amarillo naranja, con la cabeza casi rojiza. La hembra es más opaca, la espalda olivácea, pero rayada. El inmaduro se parece a la hembra pero no tiene la garganta negra.

**Distribución:** En la ladera del Pacífico, tierras bajas y colinas desde los estados norteños hasta el sur del país llegando a Chiapas.

**Hábitat:** Terrenos secos, ecotonos de bosques y arbustos en zonas áridas y semi áridas.

**Alimentación:** Insectos, pequeños frutos, semillas.



Carlos Lara

## Bolsero norteño ojirayado (*Icterus bullockii*)

**Identificación:** Macho con corona negra, las rayas en los ojos y un gran parche blanco en las alas. Es de color naranja-amarillo brillante y negro. La hembra es gris oliva y más amarillenta en la cola, con dos barras blancas en el ala.

**Distribución:** Se reproduce en el noroeste de México, desde Sonora al este hasta el norte de Durango y Coahuila. Ampliamente distribuido en migración e invierno, excepto en la costa este y la Península de Yucatán

**Hábitat:** Vegetación ribereña, bosques abiertos, jardines y campos de cultivo.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



Carlos Lara

## Bolsero castaño (*Icterus spurius*)

**Identificación:** Macho café oscuro. Cabeza, cuello, espalda, alas y cola negros. La hembra e inmaduros son verde oliva de arriba, y verde amarillo de abajo. Mide de 15 a 18 cm.

**Distribución:** Se reproduce en los estados del norte del país, hacia las tierras altas de Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

**Hábitat:** Vegetación secundaria, ecotonos boscosos, arbustos, jardines y campos de cultivo.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



Greg Lavaty

## Bolsero tunero (*Icterus parisorum*)

**Identificación:** Mide de 18 a 22 cm. Macho de color amarillo limón, con la cabeza, espalda, alas y cola negras. Hembra amarilla-verdosa en la parte de abajo, pero con garganta negra.

**Distribución:** Tierras altas de los estados del oeste y la parte central desde la frontera norte al sur hasta Oaxaca.

**Hábitat:** Zonas boscosas y arbustivas secas de montañas áridas y semi áridas; yucas, encinares en laderas y bosques piñoneros.

**Alimentación:** Semillas, insectos y frutos pequeños.



Carlos Lara

## Dominico (*Carduelis psaltria*)

**Identificación:** Pequeño, de 9 a 10 cm. Gorra negra con espalda negra verdosa, partes inferiores amarillo brillante y partes irregulares blancas en el ala. Hembra más pequeña.

**Distribución:** Se encuentra ampliamente distribuido en todo el país.

**Hábitat:** Vegetación arbustiva abierta, bosques abiertos, vegetación ribereña, jardines.

**Alimentación:** Semillas, insectos, flores, brotes y frutos pequeños.



## Jilguero encapuchado (*Carduelis notata*)

**Identificación:** Mide hasta 12 cm. Cabeza y garganta negras; partes inferiores amarillo brillante, con parches del mismo color en ala y cola. La hembra es más opaca y puede no tener capucha.

**Distribución:** Desde las montañas del sur de Sonora, sur de Chihuahua, San Luis Potosí hasta Chiapas.

**Hábitat:** Tierras altas en zonas de pino-encino, ecotonos.

**Alimentación:** Semillas, insectos, flores, brotes y frutos pequeños.



## Gorrión mexicano (*Carpodacus mexicanus*)

**Identificación:** Macho parduzco y con la garganta y corona rojo brillante, al igual que la rabadilla. Hembra de color castaño grisáceo de arriba, rayada con castaño de abajo. Picos relativamente gruesos. Miden hasta 12 cm.

**Distribución:** Se distribuye prácticamente en todo el país.

**Hábitat:** Cosmopolita, bosques abiertos, desiertos, ciudades.

**Alimentación:** Semillas, flores, brotes y frutos pequeños.



Carlos Lara

## Gorrión casero (*Passer domesticus*)

**Identificación:** Macho con la parte superior de la cabeza de color rojizo, garganta negra y mejillas blancas. Hembras e inmaduros sin garganta negra, cabeza parduzca. Miden de 14 a 16 cm.

**Distribución:** Residente en ciudades y áreas rurales en todo el país.

**Hábitat:** Ciudades y zonas de cultivo.

**Alimentación:** Semillas e insectos.

# ÍNDICE

Marque los cuadros para mantener el seguimiento de cuales especies ha visto en el Jardín Botánico

<input type="checkbox"/> Bolsero castaño .....	50
<input type="checkbox"/> Bolsero dorso rayado .....	48
<input type="checkbox"/> Bolsero norteño ojirayado .....	49
<input type="checkbox"/> Bolsero tunero .....	51
<input type="checkbox"/> Capulinero gris .....	29
<input type="checkbox"/> Cardenalito .....	12
<input type="checkbox"/> Carpintero bellotero .....	9
<input type="checkbox"/> Carpintero de pechera .....	8
<input type="checkbox"/> Carpintero mexicano .....	10
<input type="checkbox"/> Chara pecho gris .....	17
<input type="checkbox"/> Chinito .....	28
<input type="checkbox"/> Chipe corona naranja .....	35
<input type="checkbox"/> Chipe corona negra .....	36
<input type="checkbox"/> Chipe coronado .....	32
<input type="checkbox"/> Chipe de coronilla .....	30
<input type="checkbox"/> Chipe garganta naranja .....	34
<input type="checkbox"/> Chipe negro amarillo .....	33
<input type="checkbox"/> Chipe negro gris .....	31
<input type="checkbox"/> Chipe trepador .....	37
<input type="checkbox"/> Chivirín Saltapared .....	20
<input type="checkbox"/> Chorlo tildío .....	2
<input type="checkbox"/> Colibrí oreja blanca .....	6
<input type="checkbox"/> Colibrí berilo.....	7
<input type="checkbox"/> Cuitlacoche .....	26
<input type="checkbox"/> Dominico .....	52
<input type="checkbox"/> Estornino .....	27
<input type="checkbox"/> Garza ganadera .....	1

□ Golondrina tijereta .....	47
□ Gorrión cantor .....	42
□ Gorrión casero .....	55
□ Gorrión ceja blanca .....	41
□ Gorrión mexicano .....	54
□ Jilguero encapuchado .....	53
□ Mirlo dorso rufo .....	24
□ Mirlo pardo .....	25
□ Mosquero lampiño .....	13
□ Mosquero negro .....	14
□ Paloma ala blanca .....	4
□ Perlita azul gris .....	22
□ Píbi mayor .....	11
□ Picogordo tigrillo .....	43
□ Picogrueso azul .....	44
□ Playero alzacolita.....	3
□ Primavera .....	23
□ Rascador manchado .....	40
□ Reyezuelo rubí .....	21
□ Saltapared tepetatero .....	19
□ Sastrecillo .....	18
□ Semillero de collar .....	38
□ Tirano gritón .....	15
□ Toquí pardo .....	39
□ Tordo ojo rojo .....	46
□ Tórtola cola larga .....	5
□ Vireo reyezuelo .....	16
□ Zanate .....	45



# COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA



**SCOUTS**  
MEXICO®

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO, A.C.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA



DOCTORADO EN CIENCIAS  
NATURALES



maestría en  
ciencias  
biológicas

Universidad Autónoma de Tlaxcala

