

Parcial 1: Señales y Sistemas.

1. La distancia media entre 2 señales periódicas $x_1(t) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$ y $x_2(t) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$; se puede expresar a partir de la potencia media de la diferencia entre ellas:

$$d^2(x_1, x_2) = \overline{P_{x_1 - x_2}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T |x_1(t) - x_2(t)|^2 dt$$

Sea $x_1(t)$ y $x_2(t)$ 2 señales definidas como:

$$x_1(t) = Ae^{-jn\omega_0 t}$$

$$x_2(t) = Be^{jm\omega_0 t}$$

con $\omega_0 = 2\pi/T$, $T, A, B \in \mathbb{R}^+$ y $n, m \in \mathbb{Z}$. Determine la distancia entre las 2 señales. Compruebe sus resultados con Python.

$$\overline{P_{x_1 - x_2}} = \frac{1}{T} \int_T |x_1(t) - x_2(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \left(\int_T (x_1(t) - x_2(t))(x_1(t) - x_2(t))^* dt \right)$$

$$= \frac{1}{T} \left(\int_T (x_1(t) - x_2(t))(x_1^*(t) - x_2^*(t)) dt \right)$$

$$= \frac{1}{T} \left(\int_T x_1(t)x_1^*(t) dt - \int_T x_1(t)x_2^*(t) dt - \int_T x_2(t)x_1^*(t) dt + \int_T x_2(t)x_2^*(t) dt \right)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{T} \int_T |x_1(t)|^2 dt}_{\overline{P_{x_1}}} - \underbrace{\frac{2}{T} \int_T x_1(t)x_2^*(t) dt}_{C_{12}} + \underbrace{\frac{1}{T} \int_T |x_2(t)|^2 dt}_{\overline{P_{x_2}}}$$

$$\overline{P_{x_1}} = \frac{1}{T} \int_T x_1(t)x_1^*(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T Ae^{-jn\omega_0 t} (Ae^{jn\omega_0 t}) dt$$

$$= \frac{A^2}{T} \int_0^T \frac{e^{j(n-m)\omega_0 t}}{1} dt = \frac{A^2}{T} \int_0^T dt = \frac{A^2}{T} t \Big|_0^T = \frac{A^2}{T} (T) = A^2$$

$$\overline{P_{x_2}} = \frac{1}{T} \int_T x_2(t)x_2^*(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T Be^{jm\omega_0 t} (Be^{-jm\omega_0 t}) dt$$

$$= \frac{B^2}{T} \int_0^T \frac{e^{j(m-m)\omega_0 t}}{1} dt = \frac{B^2}{T} \int_0^T dt = \frac{B^2}{T} t \Big|_0^T = \frac{B^2}{T} (T) = B^2$$

$$G_{12} = -\frac{2}{T} \int_T x_1(t) x_2^*(t) dt = -\frac{2}{T} \int_0^T (Ae^{-jn\omega_0 t})(B e^{-jm\omega_0 t}) dt$$

$$= -\frac{2AB}{T} \int_0^T e^{-jn\omega_0 t - jm\omega_0 t} dt = -\frac{2AB}{T} \int_0^T e^{-j(n+m)\omega_0 t} dt$$

→ Si $n+m=0$, $n=-m$:

$$G_{12} = -\frac{2AB}{T} \int_0^T \underbrace{e^{-j(n+m)\omega_0 t}}_1 dt = -\frac{2AB}{T} \int_0^T dt = -\frac{2AB}{T} t \Big|_0^T = -\frac{2AB}{T} T = -2AB$$

→ Si $n+m \neq 0$, $n \neq -m$; $n+m = k \in \mathbb{Z}$:

$$G_{12} = -\frac{2AB}{T} \int_0^T e^{-jk\omega_0 t} dt = -\frac{2AB}{T} \left(\frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \right) \Big|_0^T$$

$$= \frac{2AB}{jk\omega_0 T} (e^{-jk\omega_0 T} - e^{-jk\omega_0 \cdot 0}) = \frac{2AB}{jk\omega_0 T} (\cos(k\omega_0 T) - j\sin(k\omega_0 T) - 1) = \frac{2AB}{jk\omega_0 T} (\cos(k\omega_0 T) - 1 - j\sin(k\omega_0 T))$$

$$= \frac{2AB}{jk\omega_0 T} (1 - 1) = 0$$

$$\text{NOTA: } d^2 = \overline{p_{x1-x2}} \rightarrow d = \sqrt{\overline{p_{x1-x2}}}$$

$$\sqrt{p_{x1-x2}} = \begin{cases} \sqrt{A^2 - 2AB + B^2} & n=m \\ \sqrt{A^2 + B^2} & n \neq m \end{cases} \quad p_{x1-x2} = \overline{p_{x1}} + G_{12} + \overline{p_{x2}}$$

2. Encuentre la señal en tiempo discreto al utilizar un conversor analógico digital con frecuencia de muestreo de **5 kHz** y **4 bits** de capacidad de representación, aplicado a la señal continua:

$$x(t) = 3\cos(1000\pi t) + 5\sin(3000\pi t) + 10\cos(11000\pi t)$$

Realizar la simulación del proceso de discretización (incluyendo al menos 3 períodos de $x(t)$). En caso de que la discretización no sea apropiada, diseñe e implemente un conversor adecuado para la señal estudiada.

$$F_s = 5 \text{ kHz} \quad \text{Etadad} = 2^{\# \text{ bits}} = 2^4 = 16 \text{ niveles de cuantización.}$$

$$t = nT_s \rightarrow F_s = \frac{1}{T_s}; \quad F = \frac{1}{T}; \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$A\cos(\omega n) = A\cos(2\pi f n) \rightarrow \omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{T_s}{T} = \frac{F}{F_s}$$

$$A\sin(\omega n) = A\sin(2\pi f n) \rightarrow \omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{T_s}{T} = \frac{F}{F_s}$$

Para $x_1(t) = 3\cos(1000\pi t)$

$$\omega_1 = 1000\pi \rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{1000\pi} = \frac{1}{500} \rightarrow F_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{1/500} = 500 \text{ Hz}$$

$$x_1[n] = A\cos\left(2\pi n \frac{F_1}{F_s}\right) = 3\cos\left(2\pi n \frac{500}{5000}\right) = 3\cos\left(\frac{n\pi}{5}\right)$$

Para $x_2(t) \rightarrow 5\sin(3000\pi t)$

$$\omega_2 = 3000\pi \rightarrow T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2} = \frac{2\pi}{3000\pi} = \frac{1}{1500} \rightarrow F_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{1/1500} = 1500 \text{ Hz}$$

$$x_2[n] = A\sin\left(2\pi n \frac{F_2}{F_s}\right) = 5\sin\left(2\pi n \frac{1500}{5000}\right) = 5\sin\left(\frac{3n\pi}{5}\right)$$

Para $x_3(t) \rightarrow 10\cos(11000\pi t)$

$$\omega_3 = 11000\pi \rightarrow T_3 = \frac{2\pi}{\omega_3} = \frac{1}{5500} \rightarrow F_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{1/5500} = 5500 \text{ Hz}$$

$$x_3[n] = A\cos\left(2\pi n \frac{F_3}{F_s}\right) = 10\cos\left(2\pi n \frac{5500}{5000}\right) = 10\cos\left(\frac{11n\pi}{5}\right)$$

$$x[n] = 3\cos\left(\frac{n\pi}{5}\right) + 5\sin\left(\frac{3n\pi}{5}\right) + 10\cos\left(\frac{11n\pi}{5}\right)$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{1000\pi}{3000\pi} = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{3000\pi}{11000\pi} = \frac{3}{11} \in \mathbb{Q}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{1000\pi}{11000\pi} = \frac{1}{11} \in \mathbb{Q}$$

\therefore la señal es
quasi-periódica

NO cumple Nyquist.

$$\text{Si } F_s \geq 2 F_{\max} \rightarrow 2 F_{\max} = 2(5500 \text{ Hz}) = 11000 \text{ Hz} \text{ pero } F_s = 5000 \text{ Hz}$$

$$\text{Comparando con las originales} \rightarrow -\pi \leq \omega < \pi$$

(copia o aliasing)

$$\omega_1 = \frac{1}{5}\pi \text{ cumple}, \omega_2 = \frac{3}{5}\pi \text{ cumple}, \omega_3 = \frac{11}{5}\pi \text{ no cumple } > \pi$$

$$\omega_{3\text{ original}} = \frac{11}{5}\pi - 2\pi = \frac{1}{5}\pi \text{ ahora sí cumple.}$$

Se supone una frecuencia de muestreo más grande

$$F_s = 3F_{\max} = 3(5500 \text{ Hz}) = 16500 \text{ Hz} \rightarrow T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{16500}$$

$$\text{Para } x_1(t) = 3 \cos(1000\pi t)$$

$$x_1[n] = 3 \cos\left(2\pi n \frac{500}{16500}\right) = 3 \cos\left(\frac{2n\pi}{33}\right) \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{33} \approx 0.06\pi$$

$$\text{Para } x_2(t) = 5 \sin(3000\pi t)$$

$$x_2[n] = 5 \sin\left(2\pi n \frac{1500}{16500}\right) = 5 \sin\left(\frac{2n\pi}{11}\right) \quad \omega_2 = \frac{2\pi}{11} \approx 0.18\pi$$

$$\text{Para } x_3(t) = 10 \cos(11000\pi t)$$

$$x_3[n] = 10 \cos\left(2\pi n \frac{5500}{16500}\right) = 10 \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \quad \omega_3 = \frac{2\pi}{3} \approx 0.67\pi$$

$-\pi \leq \omega_1, \omega_2, \omega_3 < \pi \rightarrow$ las 3 frecuencias digitales están en las originales.

$$x[n] = 3 \cos\left(\frac{2n\pi}{33}\right) + 5 \sin\left(\frac{2n\pi}{11}\right) + 10 \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right)$$

$$\omega_1 = 1000\pi$$

$$\omega_2 = 3000\pi$$

$$\omega_3 = 11000\pi$$

Hallamos el periodo T para graficar las señales:

$$T = \frac{r2\pi}{\omega_1} = \frac{l2\pi}{\omega_2} = \frac{k2\pi}{\omega_3} \rightarrow T = \frac{r2\pi}{1000\pi} = \frac{l2\pi}{3000\pi} = \frac{k2\pi}{11000\pi}$$

$$T = \frac{r}{500} = \frac{l}{1500} = \frac{k}{5500} \rightarrow 16500T = 33r = 11l = 3k$$

$$\text{MCM}\{33, 11, 3\} = 33 \rightarrow r=1, l=3, k=11$$

$$16500T = 33 \rightarrow T = \frac{33}{16500} = \frac{1}{500}$$

3. Sea $x''(t)$ la segunda derivada de la señal $x(t)$, donde $t \in [t_i, t_f]$. Demuestre que los coeficientes de la serie exponencial de Fourier se pueden calcular según:

$$c_n = \frac{1}{(t_f - t_i) n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt; \quad n \in \mathbb{Z}.$$

¿Cómo se pueden calcular los coeficientes a_n y b_n desde $x''(t)$ en la serie trigonométrica de Fourier?

$$\text{Sabemos que } x(t) = \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$\rightarrow x'(t) = \frac{d}{dt} \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_n c_n \frac{d}{dt} e^{jn\omega_0 t} \rightarrow \frac{d}{dt} e^{jn\omega_0 t} = jn\omega_0 e^{jn\omega_0 t}$$

$$\rightarrow x''(t) = \frac{d}{dt} x'(t) = \frac{d}{dt} \sum_n c_n \frac{d}{dt} e^{jn\omega_0 t} = \sum_n c_n \frac{d^2}{dt^2} e^{jn\omega_0 t}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} e^{jn\omega_0 t} = \frac{d}{dt} jn\omega_0 e^{jn\omega_0 t} = (jn\omega_0)^2 e^{jn\omega_0 t} = j^2 n^2 \omega_0^2 e^{jn\omega_0 t} = -n^2 \omega_0^2 e^{jn\omega_0 t}$$

$$x''(t) = \sum_n \underbrace{-C_n n^2 \omega_0^2}_{\tilde{C}_n} e^{jn\omega_0 t} = \sum_n \tilde{C}_n e^{jn\omega_0 t}; \text{ con } \tilde{C}_n = -C_n n^2 \omega_0^2$$

$$\text{Si } C_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \text{ y } \tilde{C}_n = \frac{1}{T} \int_T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$\text{Se reemplaza el } \tilde{C}_n \rightarrow C_n n^2 \omega_0^2 = \frac{1}{T} \int_T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

$$C_n = \frac{1}{-(t_f - t_i) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$C_n = \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) [\cos(n\omega_0 t) - j \sin(n\omega_0 t)] dt$$

$$= \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt - j \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$\text{Sabemos que } a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt; \quad b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt.$$

$$\text{y que } a_n = 2 \operatorname{Re}\{C_n\}; \quad b_n = -2 \operatorname{Im}\{C_n\}$$

$$\rightarrow a_n = 2 \operatorname{Re}\{C_n\} = 2 \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$\rightarrow b_n = -2 \operatorname{Im}\{C_n\} = -2 \frac{1}{(t_i - t_f) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$\text{O tambi3n con } x(t) = \sum_n a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$x(t) = \sum_n a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$x'(t) = \sum_n -a_n \sin(n\omega_0 t) n\omega_0 + b_n \cos(n\omega_0 t) n\omega_0$$

$$x''(t) = \sum_n -a_n \cos(n\omega_0 t) (n\omega_0)^2 - b_n \sin(n\omega_0 t) (n\omega_0)^2$$

$$= \sum_n \underbrace{-a_n n^2 \omega_0^2}_{\tilde{a}_n} \cos(n\omega_0 t) - \underbrace{b_n n^2 \omega_0^2}_{\tilde{b}_n} \sin(n\omega_0 t)$$


$$a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt \rightarrow \tilde{a}_n = \frac{2}{T} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt.$$

$$-a_n n^2 \omega_0^2 = \frac{2}{T} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt \rightarrow a_n = \frac{2}{-(t_f - t_i) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt.$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt \rightarrow \tilde{b}_n = \frac{2}{T} \int_T x'(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$-b_n n^2 \omega_0^2 = \frac{2}{T} \int_T x''(t) \sin(n\omega_0 t) dt \rightarrow b_n = \frac{2}{-(t_2 - t_1) n^2 \omega_0^2} \int_{t_1 - t_1}^{t_2 - t_1} x''(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

4. Encuentre el espectro de Fourier, su parte real, imaginaria, magnitud, fase y el error relativo para $n \in \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5\}$, a partir de $x''(t)$ para la señal $x(t)$ en la figura. Compruebe el espectro obtenido con la estimación a partir de $x(t)$. Presente las simulaciones de Python respectivas.



$$m_1 = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{A - 0}{-d_1 - (-d_2)} = \frac{A}{d_2 - d_1}$$


$$m_2 = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{A - 0}{d_1 - 0} = \frac{A}{d_1}$$

$$x_1(t) = m_1 x_1 + b_1 \quad x_2(t) = m_2 x_2 + b_2$$


$$\rightarrow b_1 = x_1(t) - m_1 x_1 \quad \rightarrow b_2 = x_2(t) - m_2 x_2$$

$$b_1 = 0 - A(-d_2) \quad b_2 = 0 - A(0)$$

$$b_1 = \frac{Ad_2}{d_2 - d_1} \quad b_2 = 0$$



$$x(t) = \begin{cases} 0, & d_2 \leq |t| \leq T/2 \\ \frac{At}{d_2 - d_1} + \frac{Ad_2}{d_2 - d_1} = \frac{At + Ad_2}{d_2 - d_1}, & d_2 \leq |t| \leq d_1 \\ \frac{At}{d_1}, & 0 \leq |t| \leq d_1 \end{cases}$$



$x''(t) = 0$ en cada tramo y en los puntos donde hay cambios tiende a $\pm \infty$ y estos cambios los podemos representar como $m_k \delta(t + t_k)$ donde m_k es la diferencia de la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda y t_k donde ocurre el salto (cambio instantáneo).

$$x''(t) = \frac{m_1}{d_2 - d_1} \delta(t + d_2) + \frac{-m_2 - m_1}{d_2 - d_1} \delta(t + d_1) + \frac{2m_2}{d_2 - d_1} \delta(t + 0) + \frac{-m_1 - m_2}{d_2 - d_1} \delta(t - d_1) + \frac{m_1}{d_2 - d_1} \delta(t - d_2)$$

$$x''(t) = m_1 [\delta(t + d_2) - \delta(t - d_2)] - (m_1 + m_2) [\delta(t + d_1) + \delta(t - d_1)] + 2m_2 \delta(t + 0)$$

$$\text{Sabemos que } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t + T) dt = 1$$

$$C_n = \frac{1}{(t_2 - t_1) n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad T = t_2 - t_1 = \frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2}\right) = T; \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{1}{T n^2 \omega_0^2} \int_{-T/2}^{T/2} \left[\frac{A}{d_2 - d_1} (d(t+d_2) + d(t-d_1)) - \left(\frac{A}{d_1} + \frac{A}{d_2 - d_1} \right) (d(t+d_1) + d(t-d_1)) + \frac{2A}{d_1} d(t) \right] e^{-jn\omega_0 t} dt$$

→ Como $x(t)$ con simetría par $\sin(\theta) = 0$

$$= \frac{1}{T n^2 \omega_0^2} \left[\int_{-T/2}^{T/2} \frac{A}{d_2 - d_1} d(t+d_2) \cos(n\omega_0 t) dt + \int_{-T/2}^{T/2} \frac{A}{d_2 - d_1} d(t-d_1) \cos(n\omega_0 t) dt - \int_{-T/2}^{T/2} A \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2 - d_1} \right) d(t+d_1) \cos(n\omega_0 t) dt - \int_{-T/2}^{T/2} A \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2 - d_1} \right) d(t-d_1) \cos(n\omega_0 t) dt + \int_{-T/2}^{T/2} \frac{2A}{d_1} d(t) \cos(n\omega_0 t) dt \right]$$

Usamos $\rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t \pm t_0) dt = x(\mp t_0) \quad \boxed{\cos(x) = \cos(-x)}$

$$C_n = \frac{A}{T n^2 \omega_0^2} \left(\frac{A}{d_2 - d_1} \cos(n\omega_0(-d_2)) + \frac{A}{d_2 - d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \frac{d_2 - d_1 + d_1}{d_1(d_2 - d_1)} \cos(n\omega_0(-d_1)) - \frac{d_2 - d_1 + d_1}{d_1(d_2 - d_1)} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{2}{d_1} \cos(n\omega_0 \cdot 0) \right)$$

$$= \frac{A}{(t_2 - t_1) n^2 \omega_0^2} \left(\frac{2}{d_2 - d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \frac{2d_2}{d_1(d_2 - d_1)} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{2}{d_1} \right)$$

$$= \frac{A}{\left(\frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2}\right)\right) n^2 \frac{2\pi^2}{T^2}} \left(\frac{1}{d_2 - d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \frac{d_2}{d_1(d_2 - d_1)} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{1}{d_1} \right)$$

$$= \frac{-AT}{2n^2 \pi^2} \left(\frac{1}{d_2 - d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \frac{1}{d_1(d_2 - d_1)} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{1}{d_1} \right) \rightarrow \text{Re}\{C_n\}$$

$$|C_n| = \sqrt{\text{Re}^2\{C_n\} + 0} = \text{Re}\{C_n\}$$

$$\theta_{C_n} = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}\{C_n\}}{\text{Re}\{C_n\}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{0}{\text{Re}\{C_n\}} \right) = 0$$

$$E_C(f) = \left(1 - \sum |C_n|^2 \frac{P_n}{P_s} \right) \cdot 100 [\%] \quad P_n = \frac{1}{T} E_n = \frac{1}{T} \int_T |e^{-jn\omega_0 t}|^2 dt = 1$$

Confirmamos con $x(t)$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt; \quad T = t_f - t_i = \frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2}\right) = T, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$C_n = \frac{1}{T} \left(\int_{-T/2}^{-d_2} 0 \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{-d_2}^{-d_1} \frac{A}{d_2 - d_1} (t + d_2) e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{-d_1}^0 -\frac{A}{d_1} e^{-jn\omega_0 t} dt \right. \\ \left. + \int_0^{d_1} \frac{A}{d_1} e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{d_1}^{d_2} -\frac{A}{d_2 - d_1} (t + d_2) e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{d_2}^{T/2} 0 e^{-jn\omega_0 t} dt \right)$$

$$C_n = \frac{1}{T} \left(\frac{A}{d_2 - d_1} \int_{-d_2}^{-d_1} (t + d_2) e^{-jn\omega_0 t} dt - \frac{A}{d_1} \int_{-d_1}^0 t e^{-jn\omega_0 t} dt + \frac{A}{d_1} \int_0^{d_1} t e^{-jn\omega_0 t} dt \right. \\ \left. - \frac{A}{d_2 - d_1} \int_{d_1}^{d_2} (t + d_2) e^{-jn\omega_0 t} dt \right)$$

$$C_n = \frac{1}{T} \left(\frac{A}{d_2 - d_1} \left(\int_{-d_2}^{-d_1} t e^{-jn\omega_0 t} dt + d_2 \int_{-d_2}^{-d_1} e^{-jn\omega_0 t} dt \right) - \frac{A}{d_1} \int_{-d_1}^0 t e^{-jn\omega_0 t} dt \right. \\ \left. + \frac{A}{d_1} \int_0^{d_1} t e^{-jn\omega_0 t} dt - \frac{A}{d_2 - d_1} \left(\int_{d_1}^{d_2} t e^{-jn\omega_0 t} dt + d_2 \int_{d_1}^{d_2} e^{-jn\omega_0 t} dt \right) \right)$$

Hecho en calculadora:

$$I_1 = e^{jn\omega_0 d_1} \left(\frac{d_1}{jn\omega_0} - \frac{1}{n^2\omega_0^2} \right) + e^{jn\omega_0 d_2} \left(\frac{1}{n^2\omega_0^2} - \frac{d_2}{jn\omega_0} \right)$$

$$I_2 = \frac{d_2}{jn\omega_0} (e^{jn\omega_0 d_2} - e^{jn\omega_0 d_1})$$

$$I_3 = -d_1 \frac{e^{jn\omega_0 d_1}}{jn\omega_0} - \left(\frac{1}{n^2\omega_0^2} - \frac{e^{jn\omega_0 d_1}}{n^2\omega_0^2} \right)$$

$$I_4 = -d_1 \frac{e^{-jn\omega_0 d_1}}{jn\omega_0} \left(\frac{e^{-jn\omega_0 d_1}}{n^2\omega_0^2} - \frac{1}{n^2\omega_0^2} \right)$$

$$I_5 = \left(d_1 \frac{e^{-jn\omega_0 d_1}}{jn\omega_0} - d_2 \frac{e^{-jn\omega_0 d_2}}{jn\omega_0} \right) - \left(\frac{e^{-jn\omega_0 d_2}}{n^2\omega_0^2} - \frac{e^{-jn\omega_0 d_1}}{n^2\omega_0^2} \right)$$

$$I_6 = d_2 \frac{e^{-jn\omega_0 d_1}}{jn\omega_0} - d_2 \frac{e^{-jn\omega_0 d_2}}{jn\omega_0}$$

$$\begin{aligned}
 U_n = \frac{1}{T} & \left(\frac{d_1 A e^{j n \omega_0 d_1}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} - \frac{d_2 A e^{j n \omega_0 d_2}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} - \frac{A e^{j n \omega_0 d_1}}{n^2 \omega_0^2 (d_2 - d_1)} + \frac{A e^{j n \omega_0 d_2}}{n^2 \omega_0^2 (d_2 - d_1)} + \right. \\
 & + \frac{d_2 A e^{j n \omega_0 d_2}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} + \frac{A e^{j n \omega_0 d_1}}{j n \omega_0} + \frac{A}{d_1 n^2 \omega_0^2} - \frac{A e^{j n \omega_0 d_1}}{d_1 n^2 \omega_0^2} - \frac{A e^{-j n \omega_0 d_1}}{j n \omega_0} - \\
 & - \frac{A e^{-j n \omega_0 d_2}}{d_1 n^2 \omega_0^2} + \frac{A}{d_1 n^2 \omega_0^2} - \frac{d_1 A e^{-j n \omega_0 d_1}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} + \frac{d_2 A e^{-j n \omega_0 d_2}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} + \\
 & + \frac{A e^{-j n \omega_0 d_2}}{n^2 \omega_0^2 (d_2 - d_1)} - \frac{A e^{-j n \omega_0 d_1}}{n^2 \omega_0^2 (d_2 - d_1)} - \frac{d_2 A e^{-j n \omega_0 d_1}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} + \frac{d_2 A e^{j n \omega_0 d_2}}{j n \omega_0 (d_2 - d_1)} \Big)
 \end{aligned}$$

Recordando $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$.

$$\begin{aligned}
 U_n = \frac{1}{T} & \left(\frac{2A \sin(n \omega_0 d_1)}{n \omega_0} \left(\frac{d_1}{d_2 - d_1} + 1 \right) + \frac{2A \cos(n \omega_0 d_2)}{n \omega_0 (d_2 - d_1)} \left(\frac{d_2}{j} + \frac{1}{n \omega_0} \right) - \right. \\
 & - \frac{2A \cos(n \omega_0 d_2)}{n \omega_0 (d_2 - d_1)} \left(\frac{d_2}{j} + \frac{1}{n \omega_0} \right) - \frac{2A \cos(n \omega_0 d_1)}{n \omega_0} \left(\frac{1}{d_1 n \omega_0} + \frac{d_2}{d_2 - d_1} \right) - \\
 & \left. - \frac{2d_2 A}{n \omega_0 (d_2 - d_1)} \sin(n \omega_0 d_2) + \frac{2A}{d_1 n^2 \omega_0^2} \right)
 \end{aligned}$$

señal par \rightarrow Se integra de 0 a $d_2 \rightarrow x(t) = x(-t)$

$$P_x = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} |x(t)|^2 dt \rightarrow \text{De } d_2 \text{ a } T/2 = 0$$

$$= \frac{2}{T} \int_0^{d_2} |x(t)|^2 dt = \frac{2}{T} \left[\int_0^{d_1} \left(\frac{A}{d_1} t \right)^2 dt + \int_{d_1}^{d_2} \left(-\frac{A}{d_2-d_1} (t+d_2) \right)^2 dt \right]$$

$$= \frac{2}{T} \left[\frac{A^2}{d_1^2} \int_0^{d_1} t^2 dt - \frac{A^2}{(d_2-d_1)^2} \int_{d_1}^{d_2} (t-d_2)^2 dt \right]$$

$$= \frac{2}{T} \left[\frac{A^2}{d_1^2} \frac{t^3}{3} \Big|_0^{d_1} - \frac{A^2}{(d_2-d_1)^2} \int_{d_1}^{d_2} (t^2 + 2td_2 + d_2^2) dt \right]$$

$$= \frac{2}{T} \left[\frac{A^2}{d_1^2} \left(\frac{d_1^3}{3} - 0 \right) - \frac{A^2}{(d_2-d_1)^2} \left(\frac{t^3}{3} + \frac{2t^2 d_2}{2} + d_2^2 t \right) \Big|_{d_1}^{d_2} \right]$$

$$= \frac{2A^2}{T} \left[\frac{d_1}{3} - \frac{1}{(d_2-d_1)^2} \left(\frac{d_2^3}{3} + \frac{2d_2^2 d_2}{2} + d_2^2 d_2 - \frac{d_1^3}{3} - \frac{2d_1^2 d_2}{2} + d_2^2 d_1 \right) \right]$$

$$= \frac{2A^2}{T} \left[\frac{d_1}{3} - \frac{1}{(d_2-d_1)^2} \left(\frac{d_2^3}{3} + \frac{2d_2^2 d_2}{2} + d_2^2 d_2 - \frac{d_1^3}{3} - \frac{2d_1^2 d_2}{2} + d_2^2 d_1 \right) \right]$$

$$= \frac{2A^2 d_1}{3T} + \frac{2A^2}{3T(d_2-d_1)^2} (3d_2^3 - (d_1+d_2)^3)$$

$$|G_n|^2 = \left| \left(-\frac{AT}{2n^2\pi^2} \left(\frac{1}{d_2-d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2-d_1} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{1}{d_1} \right) \right) \right)^2 \right|$$

$$= \left(-\frac{AT}{2n^2\pi^2} \left(\frac{1}{d_2-d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2-d_1} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{1}{d_1} \right) \right) \right)^2$$

$$e_1(l.l.) = \left(1 - \sum_n \left(-\frac{AT}{2n^2\pi^2} \left(\frac{1}{d_2-d_1} \cos(n\omega_0 d_2) - \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2-d_1} \cos(n\omega_0 d_1) + \frac{1}{d_1} \right) \right) \right)^2 \right. \\ \left. \frac{2A^2 d_1}{3T} + \frac{2A^2}{3T(d_2-d_1)^2} (3d_2^3 - (d_1+d_2)^3) \right)$$