

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Área Académica Ingeniería en Computadores
CE-3201: Análisis Numérico para Ingeniería



Manual Funtras

Integrantes

Josué Araya García
Jonathan Guzmán Araya
Mariano Muñoz Masís
Daniel Prieto Sibaja

Cartago, Costa Rica
27 Marzo, 2021

Índice

1. Introducción	3
1.1. ¿Qué es Funtras?	3
2. Requisitos e Instalación	3
2.1. Requisitos	4
2.2. Instalación	4
3. Funciones implementadas en Funtras	4
3.1. Inverso multiplicativo a^{-1}	4
3.1.1. Formulación matemática	4
3.1.2. Valores iniciales	4
3.1.3. Condición de parada	4
3.1.4. Ejemplos numérico	5
3.2. Exponencial de Euler e^x	5
3.2.1. Formulación matemática	5
3.2.2. Condición de parada	5
3.2.3. Ejemplo numérico	5
3.3. Seno $\sin(x)$	5
3.3.1. Formulación matemática	5
3.3.2. Condición de parada	5
3.3.3. Ejemplo numérico	6
3.4. Coseno $\cos(x)$	6
3.4.1. Formulación matemática	6
3.4.2. Condición de parada	6
3.4.3. Ejemplo numérico	6
3.5. Tangente $\tan(x)$	6
3.5.1. Formulación matemática	6
3.5.2. Ejemplo numérico	6
3.6. Logaritmo natural $\ln(x)$	6
3.6.1. Formulación matemática	7
3.6.2. Condición de parada	7
3.6.3. Ejemplo numérico	7
3.7. Logaritmo $\log_a(x)$	7
3.7.1. Formulación matemática	7
3.7.2. Ejemplo numérico	7
3.8. Exponencial a^x	7
3.8.1. Formulación matemática	7
3.8.2. Valores iniciales	7
3.8.3. Condición de parada	7
3.8.4. Ejemplo numérico	7
3.9. Seno hiperbólico $\sinh(x)$	7
3.9.1. Formulación matemática	8
3.9.2. Condición de parada	8
3.9.3. Ejemplo numérico	8
3.10. Coseno hiperbólico $\cosh(x)$	8
3.10.1. Formulación matemática	8
3.10.2. Condición de parada	8
3.10.3. Ejemplo numérico	8

3.11. Tangente hiperbólico $\tanh(x)$	8
3.11.1. Formulación matemática	8
3.11.2. Ejemplo numérico	9
3.12. Raíz cuadrada \sqrt{x}	9
3.12.1. Formulación matemática	9
3.12.2. Valore inicial	9
3.12.3. Condición de parada	9
3.12.4. Ejemplo numérico	9
3.13. Raíz $\sqrt[n]{x}$	9
3.13.1. Formulación matemática	10
3.13.2. Valores iniciales	10
3.13.3. Condición de parada	10
3.13.4. Ejemplo numérico	10
3.14. Arcoseno $\sin^{-1}(x)$	10
3.14.1. Formulación matemática	10
3.14.2. Condición de parada	10
3.14.3. Ejemplo numérico	10
3.15. Arcotangente $\tan^{-1}(x)$	10
3.15.1. Formulación matemática	10
3.15.2. Condición de parada	10
3.15.3. Ejemplo numérico	10

1. Introducción

En las matemáticas existen diversos tipos de funciones como lo pueden ser:

- Algebraicas
- Trascendentes

Para este desarrollo nos enfocaremos en las funciones trascendentes, estas son las funciones que no satisfacen una ecuación polinomial cuyos coeficientes sean a su vez polinomios; esto contrasta con las funciones algebraicas, las cuales satisfacen dicha ecuación.

1.1. ¿Qué es Funtras?

Funtras es una biblioteca de funciones trascendentes desarrolladas en el lenguaje C^{++} con el objetivo de aproximar dichas funciones mediante el uso de métodos iterativos utilizando únicamente operaciones de suma, resta, multiplicación y potencia con una cantidad de iteraciones máximas de 2500 y una tolerancia de 10^{-8} .

2. Requisitos e Instalación

En esta sección se abarcarán los requisitos mínimos para su ejecución así como una breve guía de instalación de la misma.

2.1. Requisitos

El desarrollo y las pruebas de esta biblioteca se realizaron en el SO Windows 10, por lo tanto como requisitos se tiene:

- Sistema operativo Windows 10
- MinGW
- CLion

2.2. Instalación

3. Funciones implementadas en Funtras

A continuación se detallan las funciones implementadas en la biblioteca funtras.

3.1. Inverso multiplicativo a^{-1}

Esta función calcula el inverso multiplicativo, recíproco o inverso de un número x real positivo, el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

$$\text{varM1}(a)$$

3.1.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante el método iterativo que se describe a continuación.

$$x_{k+1} = x_k(2 - a \cdot x_k) \quad (1)$$

3.1.2. Valores iniciales

El valor de x_0 esta dado por:

$$x_0 = \begin{cases} eps^{15} & si \ 80! < a \leq 100! \\ eps^{11} & si \ 60! < a \leq 80! \\ eps^8 & si \ 40! < a \leq 60! \\ eps^4 & si \ 20! < a \leq 40! \\ eps^2 & si \ 0! < a \leq 20! \end{cases}$$

donde eps es una constante ya definida con valor de:

$$eps = 2,2204x10^{-16} \quad (2)$$

3.1.3. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$\left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| \quad (3)$$

Cuando la tolerancia dada sea mayor que esta, entonces devuelve el resultado obtenido.

3.1.4. Ejemplos numérico

3.2. Exponencial de Euler e^x

Esta función calcula el exponencial de e elevado a un número natural x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

$\exp_t(x)$

3.2.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k \frac{a^n}{n!} \quad (4)$$

3.2.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (5)$$

3.2.3. Ejemplo numérico

3.3. Seno $\sin(x)$

Esta función calcula el *seno* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

$\sin_t(x)$

3.3.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k (-1)^n \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (6)$$

3.3.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (7)$$

3.3.3. Ejemplo numérico

3.4. Coseno $\cos(x)$

Esta función calcula el *coseno* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

cos_t(x)

3.4.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k (-1)^n \frac{a^{2n}}{(2n)!} \quad (8)$$

3.4.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (9)$$

3.4.3. Ejemplo numérico

3.5. Tangente $\tan(x)$

Esta función calcula la *tangente* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

tan_t(x)

3.5.1. Formulación matemática

La función tangente se puede componer a partir de otras como lo son *seno* y *coseno*, es por ello que el calculo de la misma se realiza mediante la siguiente ecuación:

$$\tan(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)^{-1} \quad (10)$$

3.5.2. Ejemplo numérico

3.6. Logaritmo natural $\ln(x)$

Esta función calcula el *logaritmonatural* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

ln_t(x)

3.6.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \frac{2(a-1)}{a+1} \sum_{n=0}^k \frac{1}{2n+1} \left(\frac{a-1}{a+1} \right)^{2n} \quad (11)$$

3.6.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (12)$$

3.6.3. Ejemplo numérico

3.7. Logaritmo $\log_a(x)$

Esta función calcula el *logaritmo* de base a a un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

log_t(x)

3.7.1. Formulación matemática

La función logaritmo se puede componer a partir de otra como *logaritmonatural*, es por ello que el calculo de la misma se realiza mediante la siguiente ecuación:

$$\log_a(x) = \ln(x) \cdot (\ln(a))^{-1} \quad (13)$$

3.7.2. Ejemplo numérico

3.8. Exponencial a^x

Esta función calcula el exponencial de un número a elevado a un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

power_t(x)

3.8.1. Formulación matemática

3.8.2. Valores iniciales

3.8.3. Condición de parada

3.8.4. Ejemplo numérico

3.9. Seno hiperbólico $\sinh(x)$

Esta función calcula el *senohiperbólico* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

sinh_t(x)

3.9.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (14)$$

3.9.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (15)$$

3.9.3. Ejemplo numérico

3.10. Coseno hiperbólico $\cosh(x)$

Esta función calcula el *cosenohiperblico* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

cosh_t(x)

3.10.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k \frac{a^{2n}}{(2n)!} \quad (16)$$

3.10.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (17)$$

3.10.3. Ejemplo numérico

3.11. Tangente hiperbólico $\tanh(x)$

Esta función calcula la *tangentehiperblica* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

tanh_t(x)

3.11.1. Formulación matemática

La función tangente hiperbólico se puede componer a partir de otras como lo son *senohiperblico* y *cosenohiperblico*, es por ello que el calculo de la misma se realiza mediante la siguiente ecuación:

$$\tanh(x) = \sinh(x) \cdot \cosh(x)^{-1} \quad (18)$$

3.11.2. Ejemplo numérico

3.12. Raíz cuadrada \sqrt{x}

Esta función calcula la *razcuadrada* de un número x mediante el método de Newton-Raphson, el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

sqrt_t(x)

3.12.1. Formulación matemática

El método de Newton-Raphson se define como:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad x_0 = \alpha \quad (19)$$

Donde para encontrar la p-ésima raíz de a:

$$\sqrt[p]{a} \quad (20)$$

El cero de la función está dado por:

$$g(x) = x^p - a, \quad x_0 = \frac{a}{2} \quad (21)$$

Por lo que resulta en la siguiente iteración:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{a}{2} \\ x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - a}{2 \cdot x_k} \end{cases}$$

3.12.2. Valore inicial

El valor inicial está dado por: $x_0 = \frac{a}{2}$.

3.12.3. Condición de parada

3.12.4. Ejemplo numérico

3.13. Raíz $\sqrt[a]{x}$

Esta función calcula la *raza – sima* de un número x mediante el método de Newton-Raphson, el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

root_t(x)

3.13.1. Formulación matemática

3.13.2. Valores iniciales

3.13.3. Condición de parada

3.13.4. Ejemplo numérico

3.14. Arcoseno $\sin^{-1}(x)$

Esta función calcula el *arcoseno* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

$\text{asin_t}(x)$

3.14.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k \frac{2n!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} a^{2n+1} \quad (22)$$

3.14.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (23)$$

3.14.3. Ejemplo numérico

3.15. Arcotangente $\tan^{-1}(x)$

Esta función calcula el *arcotangente* de un número x , el uso de la misma se realiza de la siguiente manera:

$\text{atan_t}(x)$

3.15.1. Formulación matemática

El cálculo se realiza mediante la sumatoria que se describe a continuación.

$$S_k(a) = \sum_{n=0}^k (-1)^n \frac{a^{2n+1}}{2n+1} \quad (24)$$

3.15.2. Condición de parada

La condición de parada de la iteración está dada por:

$$|S_{k+1}(a) - S_k(a)| < tol \quad (25)$$

3.15.3. Ejemplo numérico