

introdução aos sistemas dinâmicos

edos de primeira ordem separáveis

7.

o problema que nos é colocado apresenta-se de uma forma diferente, mas na realidade não é muito distinto do exercício anterior. estamos perante uma equação diferencial e somos subtilmente convidados a escrever a sua solução em termos da constante x_0 , para depois fazermos a substituição referida no enunciado. vejamos então como devemos proceder:

$$x'(t) = 3x^2 = f(t)g(x), \text{ com } f(t) = 3 \text{ e } g(x) = x^2$$

logo, trata-se de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem separável

vamos procurar saber se a equação diferencial admite soluções de tipo constante:

$$g(x) = x^2 = 0 \longrightarrow x = 0 \longrightarrow x(t) = 0, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$x'(t) = \frac{dx}{dt} = 3x^2 \longrightarrow \frac{1}{x^2} dx = 3 dt \longrightarrow \int \frac{1}{x^2} dx = \int 3 dt$$

consultando uma tabela de primitivas, podemos escrever a solução formal da equação diferencial:

$$-\frac{1}{x} = 3t + C, \text{ com } C \in \mathbb{R}$$

de seguida, vamos procurar a solução explícita da equação diferencial, multiplicando ambos os lados da igualdade por -1 e invertendo:

$$x = -\frac{1}{3t + C}$$

uma vez que a igualdade acima não é válida para $t = -C/3$, somos levados a escrever que a equação diferencial tem duas famílias de soluções:

$$x(t) = -\frac{1}{3t + C}, \quad C \in \mathbb{R}, \quad t < -C/3$$

$$x(t) = -\frac{1}{3t + C}, \quad C \in \mathbb{R}, \quad t > -C/3$$

resumindo, encontrámos as seguintes soluções da equação diferencial:

$$x(t) = 0, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$x(t) = -\frac{1}{3t + C}, \quad C \in \mathbb{R}, \quad t > -C/3$$

$$x(t) = -\frac{1}{3t + C}, \quad C \in \mathbb{R}, \quad t < -C/3$$

de seguida, vamos tentar substituir a constante C sem qualquer significado, pelo valor que a solução toma no instante inicial. para tal, temos que

$$x(0) = x_o = -\frac{1}{0+C} = -\frac{1}{C}, \quad C \neq 0 \quad \rightarrow \quad C = -1/x_o$$

então, temos que:

1. se $x_o > 0$, então a família de soluções da equação diferencial é dada por

$$x(t) = -\frac{1}{3t - 1/x_o}, \quad t > -1/(3x_o)$$

2. se $x_o < 0$, então a família de soluções da equação diferencial é dada por

$$x(t) = -\frac{1}{3t - 1/x_o}, \quad t < -1/(3x_o)$$

nota. uma vez mais, temos que a escolha $C = 0$ não é compatível com a ideia de substituirmos C por $x_o = x(0)$.

a partir da condição inicial dada no enunciado, $x(0) = -1$, temos que a solução da equação diferencial que nos interessa é dada por

$$x(t) = -\frac{1}{3t + 1}, \quad t < 1/3$$

assim, para determinar o valor da solução no instante $t = 0.192$, teremos apenas que substituir verificar que o valor de t indicado pertence ao domínio da expressão anterior e, em caso afirmativo, substituir, ou seja, $0.192 < 1/3$, pelo que

$$x(0.192) = -\frac{1}{3 \times 0.192 + 1} = -0.0783699$$