

# Métodos Numéricos

## Integração Numérica

Teresa Monteiro

Departamento de Produção e Sistemas

Escola de Engenharia

Universidade do Minho

tm@dps.uminho.pt

Calcular aproximações ao seguinte integral:

$$I = \int_a^b f(x)dx \quad \text{com } a \text{ e } b \text{ finitos}$$

## Porquê?

- $f(x)$  é impossível ou difícil de integrar analiticamente
- $f(x)$  é conhecida através de uma tabela de valores

## Solução

Aproximação da função  $f(x)$  por outra função cujo integral é mais fácil de calcular, como por exemplo polinómios interpoladores de  $f(x)$

- Introdução
- Fórmulas simples de Newton-Cotes
- Fórmulas compostas
- Aplicação a intervalos de amplitude variável
- Exercícios de aplicação

# Fórmulas simples de Newton-Cotes

O polinómio  $p_n(x)$  de grau  $\leq n$  que interpola a função  $f(x)$  nos  $n + 1$  pontos  $x_0, x_1, \dots, x_n$ :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

( $L_i$  são os polinómios de Lagrange associados a estes nós)

# Fórmulas simples de Newton-Cotes

Regra de integração ou fórmula de quadratura:

$$\begin{aligned} I &\approx \int_a^b p_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) dx = \\ &= \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \end{aligned}$$

O cálculo exato do integral  $I$  é substituído pelo somatório ponderado de valores da função  $f(x)$ , **cujos pesos são os coeficientes**  $A_i$

Consoante o número de pontos e a sua localização, surgirão as várias fórmulas de integração

Só serão estudadas as fórmulas do **Trapézio**, **Simpson** e dos **Três Oitavos**.


# Regra do retângulo

$$n = 0 \Rightarrow 1 \text{ ponto} : x_0 = a, L_0(x) = 1$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f(a)$$

com erro

$$e_R = \frac{(b-a)^2}{2} f'(\eta), \eta \in [a, b]$$




# Regra do ponto médio

$$n = 0 \Rightarrow 1 \text{ ponto} : x_0 = \frac{a+b}{2}, L_0(x) = 1$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

com erro

$$e_M = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta), \eta \in [a, b]$$



# Fórmula simples do Trapézio

Se  $n = 1$ ,  $x_0 = a$ ,  $x_1 = b$  em

$$I \approx \int_a^b p_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) dx =$$

$$\sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

surge a **Fórmula simples do Trapézio**:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)]$$

com erro de truncatura


$$|E_T| = I - \int_a^b p_n(x) dx = \left| -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi) \right|, \quad \xi \in [a, b]$$

Deve ser usada para um único intervalo ( $n = 1$ ), ou seja dois pontos

Se a função a integrar  $f(x)$  for um polinómio de grau 1 o erro de truncatura é zero.



# Interpretação geométrica (Trapézio)



# Fórmula simples de Simpson

Se  $n = 2$ ,  $x_0 = a$ ,  $x_1 = \frac{a+b}{2}$  e  $x_2 = b$  em

$$\begin{aligned} I &\approx \int_a^b p_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) dx = \\ &= \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \\ &= A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) \end{aligned}$$

surge a **Fórmula simples de Simpson**:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{6} \left[ f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

com erro de truncatura


$$|E_S| = I - \int_a^b p_n(x) dx = \left| -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(iv)}(\xi) \right|, \quad \xi \in [a, b]$$

# Fórmula simples de Simpson

Deve ser usada para um par de intervalos de igual amplitude ( $n = 2$ ), ou seja para três pontos igualmente distanciados

Se a função a integrar  $f(x)$  for um polinómio de grau inferior ou igual a 3 o erro de truncatura é zero

# Interpretação geométrica (Simpson)



# Fórmula simples dos Três oitavos

Se  $n = 3$ ,  $x_0 = a$ ,  $x_1 = \frac{2a+b}{3}$ ,  $x_2 = \frac{a+2b}{3}$  e  $x_3 = b$  em

$$\begin{aligned} I &\approx \int_a^b p_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) dx = \\ &= \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \\ &= A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) \end{aligned}$$

surge a **Fórmula dos Três oitavos**:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{8} \left[ f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right]$$

com erro de truncatura


$$|E_{\frac{3}{8}}| = I - \int_a^b p_n(x) dx = \left| -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(iv)}(\xi) \right|, \quad \xi \in [a, b]$$

# Fórmula dos Três oitavos

Deve ser usada para um terno de intervalos de igual amplitude ( $n = 3$ ), ou seja para quatro pontos igualmente espaçados

Se a função a integrar  $f(x)$  for um polinómio de grau inferior ou igual a 3 o erro de truncatura é zero

# Interpretação geométrica (Três oitavos)



# Fórmulas compostas

Todas as fórmulas dependem de uma potência de  $(b - a)$ , comprimento do intervalo

Se  $(b - a)$  for reduzido também o erro o será!!!

Divide-se  $[a, b]$  em  $n$  subintervalos de amplitude  $\frac{b - a}{n}$  e aplica-se a cada subintervalo  $[x_{i-1}, x_i]$ , com  $i = 1, \dots, n$  e  $a = x_0, b = x_n$ , a fórmula simples

A contribuição da aplicação da fórmula simples a cada subintervalo origina a **fórmula composta**.



## Fórmula composta do Trapézio

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f_i + f_{i+1}]$$

**Fórmula composta do Trapézio :**

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-2} + 2f_{n-1} + f_n]$$

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & 1 & & 1 & & & & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & & \vdots & & & & & \\ & & & & & & & \vdots & & & & \\ & & & & & & & & 1 & & 1 & \\ & & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & & & 1 \\ \hline \Sigma & 1 & 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{array}$$

# Erro da Fórmula composta do Trapézio

O erro de truncatura da fórmula composta obtém-se somando os erros de truncatura das fórmulas simples aplicadas a cada um dos  $n$  subintervalos:

$$|E_T(h)| = \left| - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(x_{i+1} - x_i)^3}{12} f''(\xi_i) \right| = \left| - \frac{h^2}{12} \frac{(b-a)}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\xi_i) \right|$$

em que  $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ .

$$|E_T| = \left| - \frac{h^2}{12} (b-a) f''(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

Pode ser utilizada para qualquer número de subintervalos

## Fórmula composta de Simpson

**Fórmula composta de Simpson:**

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \cdots + 4f_{n-3} + 2f_{n-2} + 4f_{n-1} + f_n]$$

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & 1 & 4 & 1 & & & & & & & \\
 & & & 1 & 4 & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & 4 & 1 & & & & \\
 & & & & & & \vdots & & & & \\
 & & & & & & & 1 & 4 & 1 & \\
 & & & & & & & & 1 & 4 & 1 \\
 & & & & & & & & & 1 & 4 & 1 \\
 \hline
 \Sigma & 1 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & \dots & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 1
 \end{array}$$

$$|E_S| = | -\frac{h^4}{180}(b-a)f^{(iv)}(\eta)|, \eta \in [a, b]$$

A fórmula composta de Simpson só pode ser aplicada a um **número par** de subintervalos iguais.

## Fórmula composta dos Três oitavos

## Fórmula composta dos Três oitavos

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(3h)}{8}[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + \cdots + 2f_{n-3} + 3f_{n-2} + 3f_{n-1} + f_n]$$

$$\begin{array}{ccccccccccccccccccc}
& & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & & & & & & & \\
& & & & & & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & \\
& & & & & & & & & & & & & & 1 & & & \\
& & & & & & & & & & & & & & & & \vdots & \\
& & & & & & & & & & & & & & & & \vdots & \\
& & & & & & & & & & & & & & 1 & & 3 & \\
& & & & & & & & & & & & & & & & 3 & \\
& & & & & & & & & & & & & & 1 & & & \\
& & & & & & & & & & & & & 1 & & 3 & & \\
& & & & & & & & & & & & & & & 3 & & \\
& & & & & & & & & & & & & & 1 & & & \\
& & & & & & & & & & & & & 1 & & 3 & & \\
& & & & & & & & & & & & & & & 3 & & \\
& & & & & & & & & & & & & & & & 3 & \\
& & & & & & & & & & & & & & & & & 1 \\
\hline
\Sigma & 1 & 3 & 3 & 2 & 3 & 3 & 2 & \dots & & \dots & 2 & 3 & 3 & 2 & 3 & 3 & 1
\end{array}$$

$$|E_{\frac{3}{8}}| = |-\frac{h^4}{80}(b-a)f^{(iv)}(\xi)|, \quad \xi \in [a, b]$$


A fórmula composta dos Três oitavos só pode ser aplicada a um número **múltiplo de três** de subintervalos iguais.

# Aplicação a intervalos com amplitudes diferentes

O que acontece quando os pontos do intervalo  $[a, b]$  não estão todos igualmente espaçados?

É possível **agrupar** subintervalos com amplitudes iguais e aplicar em cada grupo uma fórmula de integração.

Por exemplo:



$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_{x_0}^{x_{10}} f(x)dx = \int_{x_0}^{x_4} f(x)dx + \int_{x_4}^{x_5} f(x)dx + \int_{x_5}^{x_7} f(x)dx + \int_{x_7}^{x_{10}} f(x)dx \\ &\approx \underbrace{S(h_1)}_{n=4} + \underbrace{T(h_2)}_{n=1} + \underbrace{S(h_3)}_{n=2} + \underbrace{3/8(h_4)}_{n=3} \end{aligned}$$

# Aplicação a intervalos com amplitudes diferentes

Os erros de truncatura dependem da amplitude do intervalo onde são usadas as respectivas fórmulas, do valor de  $h$ , dum coeficiente e também do valor de derivadas.

## Trapézio

$$|E_T| = \left| -\frac{h^2}{12}(b-a)f''(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

## Simpson

$$|E_S| = \left| -\frac{h^4}{180}(b-a)f^{(iv)}(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

## Três oitavos

$$|E_{\frac{3}{8}}| = \left| -\frac{h^4}{80}(b-a)f^{(iv)}(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

# Aplicação a intervalos com amplitudes diferentes

A escolha da melhor fórmula deve ter em conta dois aspetos:

- a especificidade quanto ao  $n^o$  de subintervalos
- o valor do erro

Análise da especificidade quanto ao  $n^o$  de subintervalos:

Trapézio simples  $\rightarrow$  1 subintervalo

Simpson simples  $\rightarrow$  2 subintervalos

Três oitavos simples  $\rightarrow$  3 subintervalos

Composta de Simpson  $\rightarrow$   $n^o$  de subintervalos múltiplo de 2

Comp. dos Três oitavos  $\rightarrow$   $n^o$  de subintervalos múltiplo de 3

Composta do Trapézio  $\rightarrow$  nos outros casos

$$|E_T| = \left| -\frac{h^2}{12}(b-a)f''(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

$$|E_S| = \left| -\frac{h^4}{180}(b-a)f^{(iv)}(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

$$|E_{\frac{3}{8}}| = \left| -\frac{h^4}{80}(b-a)f^{(iv)}(\eta) \right|, \quad \eta \in [a, b]$$

### Análise do valor do erro:

- A fórmula do trapézio depende de  $f''$ , de  $h^2$  e de  $\frac{1}{12}$
- A fórmula de Simpson depende de  $f^{iv}$ , de  $h^4$  e de  $\frac{1}{180}$
- A fórmula dos  $\frac{3}{8}$  depende de  $f^{iv}$ , de  $h^4$  e de  $\frac{1}{80}$



# Pequeno exemplo

Considere o seguinte integral

$$\int_0^{32} f(x)dx$$

Sabendo que  $f''(x) = f^{iv}(x)$  no intervalo de integração e conhecendo  $f(0)$ ,  $f(4)$ ,  $f(8)$ ,  $f(12)$ ,  $f(16)$ ,  $f(20)$ ,  $f(24)$ ,  $f(28)$  e  $f(32)$  qual a melhor fórmula a utilizar?

O n<sup>o</sup> de subintervalos é 8 (poderá ser usada Simpson ou Trapézio) **MAS**  $h = 4$ . Se compararmos os erros e considerando  $f'' = f^{iv} = A$ :

$$|E_T| = \left| -\frac{4^2}{12}(32 - 0)A \right| = 42.(6)A$$

$$|E_S| = \left| -\frac{4^4}{180}(32 - 0)A \right| = 45.5(1)A$$

## Quando $f(x)$ é conhecida e é dado o erro

Um pára-quedista, com uma massa de  $68.1kg$ , salta de um balão de ar quente estacionário. A distância percorrida, em *metros*, ao fim de  $10$  *segundos* é dada por

$$d = \frac{gm}{c} \int_0^{10} \left(1 - e^{-(c/m)t}\right) dt$$

em que  $g = 9.8m/s^2$  é a constante gravitacional,  $c = 12.5kg/s$  é o coeficiente de atrito e  $m$  é a massa do pára-quedista. Calcule  $d$ , usando a fórmula composta do Trapézio, de tal forma que o erro de truncatura seja inferior a  $0.20$ .

Este é um exercício em que é fornecido o erro e indicada a fórmula a usar.

A partir do erro da fórmula composta do Trapézio :

$$|E_T| = \left| -\frac{h^2}{12}(10-0)f''(\eta) \right|, \eta \in [0, 10] \leq 0.20$$

tem de determinar-se o valor do espaçamento  $h$ .

É necessária a expressão da segunda derivada de  $f(t)$  (a expressão analítica de  $f(t)$  é conhecida):

$$f''(t) = -0.0337e^{-0.1836t}$$

e majorar o seu módulo no intervalo  $[0, 10]$

$$|f''(0)| = 0.0337e^0 = 0.0337$$

$$|f''(10)| = 0.0337e^{-0.1836 \times 10} = 0.0053736$$

No intervalo  $[0, 10]$  o módulo da segunda derivada é uma função decrescente, atingindo o seu máximo em  $t = 0$ . Então,

$$|E_T| = \left| -\frac{h^2}{12} \times 10 \times 0.0337 \right| \leq 0.20 \Leftrightarrow h \leq 2.6687$$

Em termos do número de subintervalos:

$$h = \frac{b-a}{n} \leq 2.6687 \Leftrightarrow \frac{10}{n} \leq 2.6687 \Leftrightarrow n \geq 3.7471$$

Seja  $n = 4$ , ou seja,  $h = \frac{10-0}{4} = 2.5$

$t_i$	0	2.5	5	7.5	10
$f_i$	0	0.3681	0.6007	0.7477	0.8405

Aplicando a fórmula composta do Trapézio tem-se:

$$\int_0^{10} (1 - e^{-(c/m)t}) dt \approx$$

$$\approx \frac{2.5}{2} [0 + 2 \times (0.3681 + 0.6007 + 0.7477) + 0.8405] = 5.3419$$

$$d \approx \frac{9.8 \times 68.1}{12.5} \times 5.3419 = 285.2062$$

# Quando a função $f(x)$ é apresentada em tabela

Um fluido atravessa a secção de um tubo com uma velocidade  $v(r)$ , sendo  $r$  a distância radial ao centro da secção. Determine a quantidade  $Q$  de fluido que atravessa esta secção por unidade de tempo, dada por:

$$Q = 2\pi \int_0^{r_0} r v(r) dr$$

em que  $r_0 = 4.5$  é o raio da secção circular do tubo, usando os valores da tabela:

$r$	0	0.5	1	1.5	2	3	3.5	4	$r_0$
$v(r)$	3	2.9499	2.8942	2.8312	2.7584	2.5643	2.4199	2.1918	0

Use 4 casas decimais nos cálculos.

Estime também o erro de truncatura cometido no intervalo  $[2, 3]$ .

Primeiro, há que identificar o que se quer integrar:  $r v(r)$ , acrescenta-se uma linha à tabela dada:

$r$	0	0.5	1	1.5	2	3	3.5	4	4.5
$v(r)$	3	2.9499	2.8942	2.8312	2.7584	2.5643	2.4199	2.1918	0
$r v(r)$	0	1.4750	2.8942	4.2468	5.5168	7.6929	8.4697	8.7672	0

Em seguida agrupam-se os intervalos com o mesmo espaçamento:

$$\int_0^{4.5} r v(r) dr = \int_0^2 r v(r) dr + \int_2^3 r v(r) dr + \int_3^{4.5} r v(r) dr$$

- $[0, 2]$  -  $\int_0^2 r v(r) dr$  (4 subintervalos,  $h = 0.5$ ) - fórmula composta de Simpson:

$$\int_0^2 r v(r) dr \approx \frac{2 \times 0.5}{6} [0 + 4 \times 1.4750 + 2 \times 2.8942 + 4 \times 4.2468 + 5.5168]$$

- $[2, 3]$  -  $\int_2^3 r v(r) dr$  (1 subintervalo,  $h = 1$ ) - fórmula simples do Trapézio:

$$\int_2^3 r v(r) dr \approx \frac{1}{2} [5.5168 + 7.6929] = 6.6049$$

- $[3, 4.5]$  -  $\int_3^{4.5} r v(r) dr$  (3 subintervalos com  $h = 0.5$ ) - fórmula simples dos Três Oitavos:

$$\int_3^{4.5} r v(r) dr \approx \frac{3 \times 0.5}{8} [7.6929 + 3 \times 8.4697 + 3 \times 8.7672 + 0] = 11.138$$



$$\int_0^{4.5} r v(r) dr \approx 5.6987 + 6.6049 + 11.1382 = 23.4418$$

$$Q \approx 2 \times \pi \times 23.4418 = 147.2825$$

# Estimação do erro de truncatura

Para estimar o erro cometido no intervalo  $[2, 3]$ :

$$|E_T| = \left| -\frac{(3-2)^3}{12} f''(\xi) \right|, \quad \xi \in [2, 3]$$

Como não é conhecida a expressão analítica da função a integrar, neste caso  $\int_2^3 v(r) dr$ , vai estimar-se o valor da segunda derivada a partir da **tabela das diferenças divididas**.

Para se chegar às diferenças divididas de ordem 2 são necessários pelo menos 3 pontos. O ponto a adicionar deverá ser o mais próximo de  $[2, 3]$  - como existem 2 pontos à mesma distância (1.5 e 3.5) constrói-se a tabela com os quatro pontos e escolhe-se a diferença dividida de segunda ordem ( $dd_2$ ) de maior módulo

# Estimação do erro de truncatura

$x$	$f(x)$	$dd_1$	$dd_2$
1.5	4.2468	2.54	
2	5.5168	2.1761	-0.2426
3	7.6929	1.5536	-0.415
3.5	8.4697		

A estimativa do erro será então:

$$|E_T| \leq \left| -\frac{(3-2)^3}{12} \times (-0.415) \times 2! \right| = 0.0692$$

NOTA: não esquecer que a estimativa da derivada de ordem  $n$  é obtida através do produto da diferença dividida de ordem  $n$  por  $n!$ .