

# Topología elemental

Mario Calvarro Marines, Juan Diego Barrado Daganzo  
e Iker Muñoz Jiménez



# Índice general

---

<b>I Topología general</b>	<b>1</b>
<b>1. Espacios topológicos</b>	<b>3</b>
1.1. Conjuntos abiertos . . . . .	3
1.2. Conjuntos cerrados . . . . .	6
1.3. Bases . . . . .	10
1.4. Topología relativa . . . . .	12
<b>2. Aplicaciones continuas</b>	<b>15</b>
2.1. Continuidad . . . . .	15
2.2. Continuidad y subespacios . . . . .	17
2.3. Homeomorfismos . . . . .	19
<b>3. Construcciones</b>	<b>23</b>
3.1. Imágenes inversas . . . . .	23
3.1.1. Caracterización de la imagen inversa . . . . .	24
3.1.2. Inmersiones . . . . .	25
3.2. Imágenes directas . . . . .	26
3.2.1. Caracterización de la imagen directa . . . . .	27
3.2.2. Identificaciones . . . . .	28
3.2.3. Espacio Cociente . . . . .	29
3.3. Productos finitos . . . . .	32
3.4. Sumas finitas . . . . .	36
3.5. Espacios proyectivos reales . . . . .	38
3.5.1. Geometría lineal . . . . .	38

3.5.2. Topología de espacio proyectivos . . . . .	39
<b>4. Separación</b>	<b>45</b>
4.1. Concepto . . . . .	45
4.2. Tabla de comportamiento . . . . .	47
<b>5. Numerabilidad</b>	<b>49</b>
5.1. Axiomas . . . . .	49
5.1.1. I Axioma . . . . .	49
5.1.2. II Axioma . . . . .	50
5.1.3. Separable . . . . .	51
5.1.4. Lindelöf . . . . .	51
5.2. Tabla de comportamiento . . . . .	52
5.3. Sucesiones . . . . .	53
<b>6. Compacidad</b>	<b>55</b>
6.1. Concepto y mantras . . . . .	55
6.2. Tabla de comportamiento . . . . .	58
<b>7. Compacidad local</b>	<b>59</b>
7.1. Compacidad local y mantras . . . . .	60
7.2. Tabla de comportamiento . . . . .	61
7.3. Compactificación por un punto . . . . .	62
<b>8. Conexión</b>	<b>65</b>
8.1. Concepto y mantras . . . . .	65
8.2. Tabla de comportamiento . . . . .	68
<b>9. Componentes conexas y conexión local</b>	<b>69</b>
9.1. Componentes . . . . .	69
9.2. Conexión local . . . . .	70
9.3. Tabla de comportamiento . . . . .	71
<b>10. Conexión por caminos</b>	<b>73</b>
10.1. Conexión por caminos . . . . .	74

10.2. Mantras . . . . .	74
10.3. Tabla de comportamiento . . . . .	75
<b>11. Componentes conexas por caminos y conexión local por caminos</b>	<b>77</b>
11.1. Componentes conexas por caminos . . . . .	77
11.2. Conexión local por caminos . . . . .	77
11.3. Tabla de comportamiento . . . . .	78
11.4. Relaciones entre las propiedades de conexión . . . . .	78
<b>II Topología algebraica</b>	<b>79</b>
<b>12. Homotopía</b>	<b>81</b>
12.1. Conceptos fundamentales . . . . .	81
12.2. Concepto relativo . . . . .	82
12.3. Contractibilidad . . . . .	82
<b>13. Homotopía de caminos</b>	<b>85</b>
13.1. El concepto básico . . . . .	85
13.2. Simple-conexión . . . . .	85
13.3. Esferas $\mathbb{S}^n$ , $n \geq 2$ . . . . .	86
<b>14. El grupo fundamental</b>	<b>89</b>
14.1. Operaciones con caminos . . . . .	89
14.2. El grupo fundamental . . . . .	90
14.3. Functorialidad . . . . .	91
<b>15. Retractos</b>	<b>93</b>
15.1. Retractos y deformaciones . . . . .	93
15.2. Cocientes . . . . .	94
15.3. Agujeros . . . . .	95
<b>16. Recubridores</b>	<b>97</b>
16.1. El problema de elevación . . . . .	97
16.2. Unicidad de elevación . . . . .	98

16.3. Lema de elevación . . . . .	98
<b>17. Cálculos mediante recubridores</b>	<b>101</b>
17.1. Espacios proyectivos reales . . . . .	101
17.2. La circunferencia . . . . .	102
<b>18. Aplicaciones en dimensión 2</b>	<b>105</b>
18.1. Teorema fundamental del Álgebra . . . . .	105
18.2. Teorema del punto fijo de Brouwer . . . . .	105
18.3. Teorema de la esfera de Brouwer . . . . .	106
<b>19. Más aplicaciones por el mismo precio</b>	<b>109</b>
19.1. Borsuk-Ulam . . . . .	109
19.2. Invarianza del dominio . . . . .	110
19.3. Divarianza del borde y de la dimensión . . . . .	111
<b>20. Superficies</b>	<b>113</b>
20.1. Concepto . . . . .	113
20.2. Sumas conexas . . . . .	113
20.3. Cocientes . . . . .	115
<b>21. Clasificación de superficies</b>	<b>117</b>
21.1. El teorema . . . . .	117
21.2. La relación fundamental . . . . .	118
21.3. Grupos fundamentales con un agujero . . . . .	119
<b>22. Grande finale</b>	<b>121</b>

# **Parte I**

## **Topología general**



# ESPACIOS TOPOLOGICOS

---

La primera parte de este manual pretende hacer un estudio formal de la definición de la estructura de espacio topológico. Uno de los objetivos de esta noción es, por ejemplo, desvincular los conceptos topológicos como son abiertos, cerrados, fronteras, etc. de las propiedades métricas en  $\mathbb{R}^n$ . Fundamentalmente, esto servirá para poder estudiar características como continuidad, convergencia, conexión... en espacios más enrevesados y, como añadido, estudiar estas propiedades en espacios ya conocidos, pero con una estructura asociada distinta.

## CONJUNTOS ABIERTOS

Al igual que en el Álgebra Lineal la parte más básica y fundamental eran los vectores, vamos a ver que en la topología las piezas claves son los abiertos. Estos nos permiten dar forma y definir el resto de nociones del capítulo. Además, la familia de abiertos en un conjunto caracteriza y diferencia las topologías con las que pueda ser equipado este.

### Definición (Espacio Topológico)

Sea  $X$  un conjunto de elementos que denotaremos por **puntos** y  $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$  una colección de subconjuntos que denotaremos **abiertos**, decimos que  $\mathcal{T}$  es una **topología** de  $X$  si y sólo si:

1.  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
2.  $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$  donde  $U_i \in \mathcal{T}$
3.  $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$  donde  $U_i \in \mathcal{T}$

y, ese caso, la dupla  $(X, \mathcal{T})$  se denomina **espacio topológico**.

---

Ejemplo:

1. **Topología trivial:**

La topología es  $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$  para cualquier conjunto  $X$  sobre el que se equipe. Es la topología con menos abiertos posibles y esto hace que esté contenida en cualquier otra topología.

2. **Topología discreta:**

La topología es  $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$  para cualquier conjunto  $X$  sobre el que se equipe. Es la topología con más<sup>1</sup> abiertos posibles y esto hace que cualquier otra esté contenida en ella.

3. **Topología usual:**

Si al conjunto  $\mathbb{R}^n$  le equipamos la topología en las que los abiertos son los conjuntos formados por unión de bolas euclídeas, obtenemos la topología habitual que utilizamos en  $\mathbb{R}^n$ .

---

<sup>1</sup>Porque si los puntos  $\{x\} \in X$  son abiertos, entonces cualquier conjunto  $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$  es abierto.

4. Cualquier distancia  $d(x, y)$  define una topología a través de sus bolas abiertas, igual que definíamos la usual en  $\mathbb{R}^n$ , de hecho, se puede demostrar sin mayor dificultad (tal y como se ve en el dibujo) que todas las normas  $p$  en  $\mathbb{R}^n$  definen bolas que contienen y están contenidas en las restantes. En consecuencia, si la definición de abierto usual se hacía a través de bolas redondas y hemos visto que estas contienen a bolas cuadradas o romboidales, también se tiene que es abierto cuadrado o romboidal y el recíproco por los contenidos en ambos lados.



Figura 1.1: El dibujo representa distintas topologías generadas por distintas normas, pero todas equivalentes.

Es decir, cambiar de norma igual cambia la noción de distancia en  $\mathbb{R}^n$ , ¡pero no la topología asociada! Sigue siendo la topología usual de  $\mathbb{R}^n$ .

##### 5. Topología del punto:

La topología es  $\mathcal{T}_a := \{U \subset X : a \in U\} \cup \{\emptyset\}$  para un  $a \in X$  fijado previamente. Lo curioso de esta topología es que todos los abiertos son los conjuntos que contienen a  $a \in X$ , es decir, que la topología queda caracterizada como  $\mathcal{T}_a := \{\{a, W\} : \text{donde } W \subset X\}$ .

##### Definición (Entorno)

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $x \in X$  un punto del mismo, definimos un **entorno<sup>2</sup> del punto**  $x$  como un conjunto  $V^x$  que contiene un abierto  $U$  que contiene al punto:

$$V^x := V \subset X : \exists U \subset V \text{ donde } x \in U$$




Figura 1.2: Definición de entornos

##### Proposición (Caracterización de abierto)

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $W \subset X$  un subconjunto de puntos, este es abierto si y sólo si es entorno de todos sus puntos.

<sup>2</sup>Cuando el abierto que contiene al punto es el propio entorno o, dicho de otra manera, el entorno de  $x$  es un abierto de la topología, decimos que es un entorno *abierto* de  $x$ .

### Demostración:

La implicación de izquierda a derecha es trivial, pues todo conjunto se contiene a sí mismo y, como el conjunto es abierto, contiene a un abierto que contiene al punto, es decir, es entorno de cualquiera de sus puntos.

Para probar el recíproco, si un subconjunto  $W \subset X$  es entorno de todos sus puntos, entonces para cada  $x$  del conjunto existe un abierto  $U^x \subset W$  que contiene a  $x$ . Por tanto, podemos expresar  $W$  como unión arbitraria de todos estos abiertos, es decir,  $W = \bigcup_{x \in W} U^x$  y, por ser topología, la unión arbitraria de abiertos es abierta.

### **Proposición**

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $V_1^x, V_2^x$  dos entornos de un punto  $x \in X$ , entonces la intersección  $V^x := V_1^x \cap V_2^x$  es entorno de  $x$ .

### Demostración:

Por definición de entornos, existen dos abiertos  $U_1^x \subset V_1^x$  y  $U_2^x \subset V_2^x$  que contienen a  $x$ . Por la definición de topología, la intersección finita  $U^x := U_1^x \cap U_2^x$  es un abierto de la topología y vemos que  $U^x \subset V^x$ , luego  $V^x$  contiene a un abierto que contiene al punto, es decir, es entorno.

### **Definición (Punto interior)**

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $A \subset X$  un subconjunto de puntos, decimos que un punto  $x \in X$  es **punto interior de  $A$**  si y sólo si  $A$  es entorno de  $x$ .

$$x \in \text{Int}_X(A) \Leftrightarrow \exists U \overset{\text{ab.}}{\subset} A : x \in U$$

Al conjunto de puntos interiores, que denotamos por  $\text{A}^\circ$  o  $\text{Int}(A)$ , lo llamamos **interior de  $A$** .




Figura 1.3: Definición de interior de un conjunto.

### **Proposición**

Sea  $A \subset X$  un subconjunto de puntos, entonces:

- $\text{A}^\circ$  es el mayor abierto en  $A$  o, lo que es lo mismo,  $\text{A}^\circ = \bigcup_{U \subset A} U$ .
- $A$  abierto si y sólo si todos sus puntos son interiores, es decir,  $A = \text{A}^\circ$

### Demostración:

1. Si  $x \in \text{A}^\circ$ , entonces  $\exists U \subset A : x \in U \Rightarrow x \in \bigcup_{U \subset A} U$ , pero es que si  $x \in U$  para algún  $U \subset A$ , por definición es interior de  $A$ , luego  $x \in \text{A}^\circ$ .

Como  $\text{A}^\circ$  es unión de abiertos, la definición de topología nos asegura que será un abierto y además es el más grande de todos porque cualquier otro está contenido en él por ser la unión de todos los abiertos.

2. El contenido  $\overset{\circ}{A} \subset A$  se tiene siempre, puesto que  $x \in \overset{\circ}{A} \Leftrightarrow \exists U \subset A : x \in U \subset A \Rightarrow x \in A$  (dicho de otra forma, los puntos interiores de  $A$  son aquellos para los cuales  $A$  es entorno y como un entorno contiene al punto se tiene trivialmente).

De esta manera, si  $A$  es abierto, como  $\overset{\circ}{A}$  es el mayor abierto de  $A$ , tiene que ser  $\overset{\circ}{A} = A$  y si  $\overset{\circ}{A} = A$ , como  $\overset{\circ}{A}$  es abierto, pues lo es  $A$ .

#### Ejemplo:

1. Si consideramos un espacio topológico  $(X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$ , vemos que cualquier subconjunto  $A \subsetneq X$  puede contener únicamente a  $\emptyset$  como abierto, luego su interior es el vacío  $\overset{\circ}{A} = \emptyset$ .
2. Si consideramos  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\text{usual}})$  algunos de los interiores comunes son  $\text{Int}(B[a, \varepsilon]) = B(a, \varepsilon)$ ,  $\overset{\circ}{\mathbb{Q}^n} = \emptyset$  y  $\overset{\circ}{\mathbb{Z}^n} = \emptyset$ .
3. Si consideramos la topología del punto  $\mathcal{T}_a$ , entonces  $\overset{\circ}{\{a\}} = \{a\}$  y, en general, ocurre lo mismo para cualquier conjunto que contenga a  $a$  (porque son abiertos). Sin embargo, cualquier  $x \neq a$  verifica que  $\overset{\circ}{\{x\}} = \emptyset$ .

#### **Corolario**

1.  $A \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ .
2.  $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} = \text{Int}(A \cap B)$ .

#### Demostración:

1. La relación  $A \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset A \subset B$  implica que, como  $\overset{\circ}{A}$  es abierto, contenido en  $B$ , y  $\overset{\circ}{B}$  es la unión de todos los abiertos de  $B$ ,  $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ .
2. En primer lugar, como  $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$  es intersección de abiertos, entonces es abierto y está contenido en  $A \cap B$ , luego por ser  $\text{Int}(A \cap B) = \bigcup_{U \in A \cap B} U$  sabemos que  $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \subset \text{Int}(A \cap B)$ .

Recíprocamente, si  $x \in \text{Int}(A \cap B)$  existe un abierto  $U \in A \cap B$  tal que  $x \in U$ . Por ser de la intersección, en particular también es abierto de cada conjunto, luego  $x \in \overset{\circ}{A}$  y  $x \in \overset{\circ}{B}$ , es decir,  $x \in \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ .

## CONJUNTOS CERRADOS

Los conjuntos cerrados por definición están íntimamente relacionados con los conjuntos abiertos. Revisten gran importancia por la relación que tienen con dos conjuntos de puntos importantes: la acumulación y la adherencia. Estas dos últimas nociones permiten caracterizar conceptos como la convergencia de sucesiones o la densidad de un conjunto.

---

#### **Definición (Conjunto cerrado)**

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $F \subset X$  un subconjunto de puntos, decimos que es un **conjunto cerrado** si y sólo si su complementario es un abierto, es decir,  $U = X \setminus F$  es abierto.

---

#### Observación:

En muchas ocasiones el lenguaje natural confunde las definiciones precisas que se dan en matemáticas. Este caso es un ejemplo de ello: uno podría pensar que la definición de cerrado desprende el hecho de que un cerrado es un “no abierto”. Sin embargo, podemos encontrar multitud de conjuntos que no ni abiertos ni cerrados



Figura 1.4: Ejemplo de conjunto que no es ni abierto ni cerrado.

e incluso otros que son abiertos y cerrados simultáneamente, como el vacío y el total.

### Proposición

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y denotando por  $\mathcal{F}$  al conjunto de cerrados del espacio, entonces:

1.  $\emptyset, X \in \mathcal{F}$ .
2.  $\bigcap_{i \in I} F_i \in \mathcal{F}$  donde  $F_i \in \mathcal{F}$ .
3.  $\bigcup_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$  donde  $F_i \in \mathcal{F}$ .

Demostración:

- Trivial, porque el uno es el complementario del otro y ambos son abiertos.
- Porque el complementario de la intersección  $X \setminus (\bigcap_{i \in I} F_i) = \bigcup_{i \in I} (X \setminus F_i) = \bigcup_{i \in I} U_i$  es abierto.
- Porque el complementario de la unión  $X \setminus (\bigcup_{i=0}^n F_i) = \bigcap_{i=0}^n (X \setminus F_i) = \bigcap_{i=0}^n U_i$  es abierto.

Ejemplo:

#### 1. Topología trivial:

En este caso, como  $\emptyset$  y  $X$  son los únicos abiertos, únicamente pueden ser cerrados sus complementarios, es decir, ellos mismos.

#### 2. Topología usual:

Habitualmente los conjuntos que conocemos como cerrados son aquellos que pueden ser escritos en términos de bolas cerradas  $B[a, \varepsilon] : \|x - a\| \leq \varepsilon$ .

3. Si tenemos dos topologías  $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ , entonces cualquier cerrado de  $\mathcal{T}_1$  es cerrado de  $\mathcal{T}_2$ , pues es cerrado por ser el complementario de un abierto y los abiertos de  $\mathcal{T}_1$  también lo son en  $\mathcal{T}_2$ .

### Definición (Adherencia)

Sea  $A \subset X$  y  $x \in X$  un punto, decimos que es **adherente a A** si y sólo si todos sus entornos  $V^x$  intersecan con  $A$ , esto es:

$$\text{Adh}_X(A) = \overline{A} := \{x \in X : \forall V^x \cap A \neq \emptyset\} \supset A$$

Al conjunto de puntos adherentes a  $A$  lo llamamos **adherencia** de  $A$ .

Observación:

La propia definición nos sugiere ciertas equivalencias útiles que se obtienen escribiendo de forma distinta lo que hemos definido:

- $X \setminus \overline{A} = \text{Int}(X \setminus A)$

$$x \in X \setminus \overline{A} \Leftrightarrow x \notin \overline{A} \Leftrightarrow \exists U^x \cap A = \emptyset \Leftrightarrow \exists U^x \subset X \setminus A \Leftrightarrow x \in \text{Int}(X \setminus A)$$

- $X \setminus \overset{\circ}{B} = \overline{X \setminus B}$

$$x \notin \overset{\circ}{B} \Leftrightarrow \nexists U^x \subset B \Leftrightarrow \forall U^x \cap (X \setminus B) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in \overline{X \setminus B}$$

### Proposición

Sea  $A \subset X$  un subconjunto de puntos y denotando por  $\overline{A}$  a su adherencia, entonces:

- $\overline{A}$  es el menor cerrado que contiene a  $A$  o, lo que es lo mismo,  $\overline{A} = \bigcap_{F \supset A} F$  donde los  $F$  son cerrados.
- El conjunto  $A$  es cerrado si y sólo si coincide con su adherencia, es decir,  $\overline{A} = A$ .
- $B \subset A \Rightarrow \overline{B} \subset \overline{A}$ .
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .

Demostración:

- Recordando que  $\overset{\circ}{B} = \bigcup_{U \subset B} U$ :

$$\overline{A} = X \setminus \text{Int}(X \setminus A) = X \setminus \left( \bigcup_{U \subset X \setminus A} U \right) \stackrel{F=X \setminus U}{=} X \setminus \left( \bigcup_{F \supset A} (X \setminus F) \right) = \bigcap_{F \supset A} F$$

- Se deduce inmediatamente de la primera, pues si el conjunto es cerrado él mismo debe ser el menor cerrado que lo contiene.
- Si  $B \subset A \Rightarrow$

$$B \subset A \subset \overline{A} \Rightarrow \overline{B} \subset \overline{A}$$

por el primer apartado.

- Veamos el doble contenido:

$$\begin{cases} \overline{A \cup B} \supset A \cup B \supset A, B \Rightarrow \overline{A \cup B} \supset \overline{A}, \overline{B} \Rightarrow \overline{A \cup B} \supset \overline{A} \cup \overline{B} \\ A \cup B \subset \overline{A} \cup \overline{B} \Rightarrow \overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B} \end{cases} \Rightarrow \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Ejemplo:

1. Si consideramos  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\text{usual}})$  algunas adherencias comunes son  $\overline{B(a, \varepsilon)} = B[a, \varepsilon]$  y  $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$ .
2. Sea  $a \in X$  y  $(X, \mathcal{T}_a)$  ⇒

- $\overline{\{a\}} = X$

Demostración:

Sea  $x \in X$ ,  $\forall U^x \subset X : U^x \supset \{a, x\} \ni a \Rightarrow x \in \overline{\{a\}}$

- $\forall x \neq a, \overline{\{x\}} = \{x\}$

Demostración:

Sea  $y \neq x \Rightarrow U^y = \{a, y\} \cap \{x\} = \emptyset$

### Definición (Acumulación)

Sea  $A \subset X$  un subconjunto de puntos y  $x \in A$  un punto del mismo, decimos que  $x$  es:

- **punto aislado de  $A$**  si y sólo si existe algún entorno que sólo interseca con  $A$  en el propio punto, es decir:

$$\exists V^x \subset X : V^x \cap A = \{x\}$$

- **punto de acumulación de  $A$**  si y sólo si en cualquier entorno del punto encontramos puntos de  $A$  que no sean el propio punto, es decir:

$$\forall V^x \subset X : V^x \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$$

#### Observación:

La definición anterior para puntos aislados hace evidente el hecho de que los puntos aislados solo pueden ser de  $A$ . Por contra, los puntos de acumulación no tienen por qué serlo y, de hecho, su definición en términos de entornos prescinde de ellos mismos para analizar su intersección con  $A$ . De esta manera, obtenemos el siguiente resultado:

$$\overline{A} = \underbrace{\{ \text{puntos aislados} \}}_{\subset A} \sqcup \underbrace{\{ \text{puntos de acumulación} \}}_{\supset \overline{A} \setminus A}$$

Además, nótese que si uno es punto de  $A$  sólo tiene dos posibilidades: ser aislado o ser de acumulación. Por tanto, podemos reescribir lo anterior como:

$$\overline{A} = A \cup A'$$

#### **Definición (Frontera)**

Sea  $A \subset X$  un subconjunto de puntos y  $x \in A$  un punto del mismo, decimos que  $x$  es un **punto frontera de  $A$**  si y sólo si es adherente<sup>3</sup> a  $A$  y a su complementario  $X \setminus A$

$$\text{Fr}(A) := \overline{A} \cap \overline{X \setminus A} = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$$

al conjunto de puntos de la frontera de  $A$  lo llamamos **frontera de  $A$** .

#### Ejemplo:

1. En  $\mathbb{R}$ , con la topología usual  $\mathcal{T}_u$ , todos los puntos de  $\mathbb{Z}$  son aislados. Por tanto, la frontera de los enteros es  $\text{Fr}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ .
2. En  $\mathbb{R}^n$ , con la topología usual  $\mathcal{T}_u$ , la frontera de las bolas  $\text{Fr}(B(a, \varepsilon)) = \text{Fr}(B[a, \varepsilon]) = S[a, \varepsilon] : \|x - a\| = \varepsilon$  son los discos exteriores de las mismas.
3. En la topología  $\mathcal{T}_{\text{discreta}}$ , sobre cualquier conjunto que se equipe, todos los puntos son aislados y, en consecuencia, todas las fronteras, vacías.
4. En la topología del punto,  $\mathcal{T}_a$ , sobre un punto  $a \in X$  concreto vemos que:

$$\begin{cases} \text{Fr}(\{a\}) = \overline{\{a\}} \setminus \{\overset{\circ}{a}\} = X \setminus \{a\} \\ x \neq a \Rightarrow \text{Fr}(\{x\}) = \overline{\{x\}} \setminus \{\overset{\circ}{x}\} = \{x\} \end{cases}$$

#### **Definición (Densidad)**

Sea  $X$  un conjunto de puntos y  $A \subset X$  un subconjunto suyo, decimos que  $A$  es **denso en  $X$**  si y sólo si  $\overline{A} = X$  o, dicho de otro modo, todo abierto no vacío corta a  $A$ .

#### Ejemplo:

1. En  $\mathbb{R}$ , con la topología usual  $\mathcal{T}_u$ , el conjunto de los números racionales  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .
2. En la topología del punto  $\mathcal{T}_a$ , el conjunto  $\{a\}$  es denso, pues cualquier abierto corta con él (lo contiene).

<sup>3</sup>Por las observaciones hechas sobre las adherencias, también podríamos caracterizar los puntos frontera como los que no son interior de  $X \setminus A$  ni de  $A$ .

# BASES

En general, probar una cierta propiedad para una topología hace necesario verificar dicha propiedad en todos los abiertos de la misma. Esto, ya de por sí complicado, puede serlo mucho más cuando la definición de abierto es compleja y poco intuitiva. Por esto, del mismo modo que en el Álgebra Lineal surgían las bases para trabajar con un espacio vectorial al completo observando únicamente un conjunto pequeño de vectores, en Topología tendremos las bases de entornos y de abiertos que jugaran un papel similar en los espacios topológicos.

## Definición (Base de entornos)

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $a \in X$  un punto, definimos una **base de entornos de  $a \in X$**  como una colección  $\mathcal{V}^a$  de entornos de  $a$  tales que cualquier otro entorno de  $a$  tenga que contener a alguno de los entornos de la colección  $\mathcal{V}^a$ , esto es:

$$\forall W^a, \exists V \in \mathcal{V}^a : V \subset W^a$$

### Observación:

La definición no ha hecho ninguna diferenciación especial en cuanto a si son cerrados, abiertos, etc. Precisamente esta “variedad” es la que permite que, escogiendo una base de entornos con las características adecuadas en cada caso, sea más sencillo estudiar la topología que tengamos entre manos.

Tal y como hemos comentado al inicio, comprobar propiedades en una base de entornos extenderá automáticamente dichas propiedades a cualquier entorno arbitrario, haciendo el estudio de estos conjuntos más sencillos en función de la topología y la base escogida.

## Proposición

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $\{V_i^a\}_{i \in I}$  una base de entornos de un punto  $a$ , esta se puede refinar a una base de entornos abiertos  $\{U_i^a\}_{i \in I}$ .

### Demostración:

Como todos los elementos de la colección son entornos, para todos existe algún abierto  $U_i^a$  que contiene al punto. A este conjunto de abiertos (más bien de entornos abiertos) es al que llamamos  $\{U_i^a\}_{i \in I}$ . Cualquier otro entorno del punto  $a$  contiene a un entorno  $V_i^a$  de la base de entornos inicial, pero como estos contienen un abierto de la colección última, entonces  $\{U_i^a\}_{i \in I}$  es una base de entornos de  $a$ .

### Observación:

Podemos empezar a ver la utilidad de la base de entornos cuando tenemos que demostrar, por ejemplo, que un punto pertenece a la adherencia de un conjunto:

$$a \in \overline{A} \stackrel{\text{def.}}{\iff} \forall W^a \text{ entorno} : W^a \cap A \neq \emptyset \Leftrightarrow \forall V^a \in \mathcal{V}^a : V^a \cap A \neq \emptyset$$

luego si escogemos una base de entornos  $\mathcal{V}^a$  adecuada sobre la que sea muy fácil demostrar el resultado, este quedará demostrado para cualquier entorno “raro” que podamos encontrarnos.

### Ejemplo:

1. Sea el espacio real usual,  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\text{usual}})$ , el espacio topológico a estudiar, entonces:

$$\begin{cases} \mathcal{B}^a = \{B(a, \varepsilon) : \varepsilon > 0\} \text{ base de entornos abiertos.} \\ \mathcal{V}^a = \{B[a, \varepsilon] : \varepsilon > 0\} \text{ base de entornos cerrados.} \end{cases}$$

2. Sea la topología del punto  $(a \in X, \mathcal{T}_a)$ , entonces:

$$\begin{cases} \mathcal{B}^a = \{\{a\}\} & x = a \\ \mathcal{B}^x = \{\{a, x\}\} & x \neq a \end{cases}$$

---

### Definición (Base de abiertos)

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $\mathcal{B} := \{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$  una colección de abiertos, decimos que es una **base de abiertos** de  $\mathcal{T}$  si y sólo si todo abierto de  $\mathcal{T}$  es unión de abiertos de  $\mathcal{B}$ .

---

### Proposición (Caracterización de base de abiertos)

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $\mathcal{B} := \{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$  una colección de abiertos, los siguientes enunciados son equivalentes:

1.  $\mathcal{B}$  es base de abiertos.
2.  $\forall x \in X, \mathcal{B}^x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$  es base de entornos de  $x$ .
3.  $\forall x \in U \overset{ab.}{\subset} X, \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset U$ .

Demostración:

La implicación 2.  $\Rightarrow$  3. es trivial, pues si  $U$  es abierto y contiene al punto  $x$  es un entorno del mismo, luego por 2. debe contener a alguna  $B \in \mathcal{B}$ . Por tanto, demostraremos 1.  $\Rightarrow$  2. y 3.  $\Rightarrow$  1. para completar las equivalencias.

- 1.  $\Rightarrow$  2.

Si  $V^x$  es entorno, entonces  $\exists U \subset V^x$  abierto que contiene al punto  $x$ . Como por 1. el conjunto  $B$  es base de abiertos,  $U = \bigcup_{B_i \in \mathcal{B}} B_i$  y como  $x \in U$ , entonces  $\exists B_i \ni x$ . De esta manera, tenemos  $B_i \subset U \subset V^x$ , es decir, que cualquier entorno debe contener algún elemento de la base que contenga al punto.

- 3.  $\Rightarrow$  1.

Por darse 3., escogido cualquier abierto  $U$  necesariamente contiene a una  $B^x \in \mathcal{B}$  para cada  $x \in U$ , es decir, que podemos escribir  $U = \bigcup_{x \in U} B^x$  unión de abiertos de  $\mathcal{B}$ .

Ejemplo:

1. Si tomamos la topología discreta,  $\mathcal{T}_{\text{discreta}}$ , entonces una base de abiertos sería  $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$ . Además, esta base es mínima pues cualquier otra base  $\mathcal{B}' := \{B_i\}_{i \in I}$  de abiertos cumpliría que  $\forall x \in X : \{x\} = \bigcup_{i \in I} B_i \Rightarrow \exists i \in I : B_i = \{x\}$ .
2. Si tomamos la topología del punto  $\mathcal{T}_a$ , entonces una base de abiertos es  $\mathcal{B} = \{\{a, x\} : x \in X\}$ .
3. Si tomamos la topología usual en  $\mathbb{R}^n$ ,  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\text{usual}})$ , entonces una base de abiertos es el conjunto de bolas abiertas  $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) : \varepsilon > 0 \text{ y } x \in \mathbb{R}^n\}$  porque recordemos que un abierto se caracterizaba en  $\mathbb{R}^n$  por el hecho de que todos sus puntos tenían una bola alrededor contenida en el conjunto, luego la unión de dichas bolas es el abierto inicial.

Sin embargo, la base de abiertos sigue siéndolo si escogemos otra norma en  $\mathbb{R}^n$  distinta de la euclídea, puesto que estas normas son equivalentes en  $\mathbb{R}^n$  (o, visto geométricamente, cada bola de una norma contiene otra más pequeña de otra norma distinta y viceversa) porque:

$$B(x, \varepsilon) = \bigcup_{i \in I} \square_i = \bigcup_{j \in J} \diamond_j$$




Figura 1.5: Bases alternativas en  $\mathbb{R}^n$

Observación: (Política general)

Como antes, a menudo basta considerar los abiertos de  $\mathcal{B}$ . Por ejemplo,

### Proposición

Sea  $A \subset X$  y  $\mathcal{B}$  una base de abierto de  $X \Rightarrow$

$$A \subset X \text{ denso} \Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{B}, B \cap A \neq \emptyset$$

### Proposición

Sea  $X$  un conjunto de puntos y  $\mathcal{B} := \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}(X)$  una colección de subconjuntos, esta colección define una topología  $\mathcal{T}$  única en  $X$  si y sólo si:

- $X = \bigcup_{i \in I} B_i$ .
- $\forall B_i, B_j \in \mathcal{B}$  y  $\forall x \in B_i \cap B_j$ ,  $\exists B_k \in \mathcal{B} : x \in B_k \subset B_i \cap B_j$ .



Figura 1.6: Caracterización de la topología dada una base

Demostración:

$\Rightarrow$ ) Trivial por las propiedades vistas sobre topología.

$\Leftarrow$ ) Veamos que se verifican las condiciones sobre la topología:

- **Unicidad:**  $\mathcal{T} = \{\bigcup_{i \in I} B_i : \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}\}$ .
- **Existencia:** Esa  $\mathcal{T}$  es efectivamente topología.
  - $\emptyset \in \mathcal{T}$ ,  $X = \bigcup_{i \in I} B_i \in \mathcal{T}$ .
  - Uniones:  $\bigcup_{j \in J} (\bigcup_{i \in I} B_i) = \bigcup_{j \in J} B_{ij} \in \mathcal{T}$ .
  - Intersecciones finitas:  $B_1, B_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow B_1 \cap B_2 = \bigcup_{x \in B_1 \cap B_2} B^x \in \mathcal{T}$ .

$$x \in \left( \bigcup_{i \in I} B_i \right) \cap \left( \bigcup_{k \in K} B_k \right) \Rightarrow x \in B_{i_0} \cap B_{k_0} \Rightarrow \exists B^x \in \mathcal{B} : x \in B^x \subset B_{i_0} \cap B_{k_0}$$

Por tanto, podemos decir que  $(\bigcup_i B_i) \cap (\bigcup_k B_k) = \bigcup_x B^x \in \mathcal{T}$  y se tiene el resultado.

## TOPOLOGÍA RELATIVA

De la misma manera que en Álgebra, una vez definida la estructura de espacio vectorial, estudiábamos como se comportaba esta estructura con los subconjuntos del conjunto inicial, tiene sentido preocuparnos por cómo cambia la topología cuando nos restringimos a un subconjunto de puntos del total. A esta topología “restringida” la conocemos como topología relativa y, a diferencia de lo que ocurría en espacios vectoriales, puede tener un comportamiento muy distinto a la topología ambiente de la que proviene.

### Definición (Topología Relativa)

Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico e  $Y \subset X$  un subconjunto de puntos, definimos la **topología relativa**<sup>4</sup> en  $Y$  como

$$\mathcal{T}|_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}$$

Además, decimos que  $(Y, \mathcal{T}|_Y)$  es un **subespacio** de  $(X, \mathcal{T})$  y que  $(X, \mathcal{T})$  es el **espacio ambiente**.

---



Figura 1.7: Definición de una topología relativa

Observación:

- Los cerrados de la topología relativa  $\mathcal{T}|_Y$  son la intersección  $F \cap Y$  de  $Y$  con cerrados  $F$  en  $\mathcal{T}$ .

Demuestra:

Sea  $F \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y \Rightarrow$

$$\begin{aligned} F = Y \setminus W : W \overset{\text{ab.}}{\subset} Y &\Rightarrow \exists U \overset{\text{ab.}}{\subset} X : Y \cap U = W \\ &\Rightarrow F = Y \setminus (Y \cap U) = Y \cap (X \setminus U) = Y \cap F_X : F_X \overset{\text{cerr.}}{\subset} X \end{aligned}$$

- Si tenemos una base  $\mathcal{V}^a$  de entornos en el espacio ambiente  $(X, \mathcal{T})$ , la base de entornos en el subespacio  $(Y, \mathcal{T}|_Y)$  se obtiene intersecando los elementos de la base ambiente con el subespacio, es decir,  $\mathcal{V}_Y^a := \mathcal{V}^a \cap Y := \{V^a \cap Y : V^a \in \mathcal{V}^a\}$ .
- Si tenemos una base  $\mathcal{B}$  de abiertos en el espacio ambiente  $(X, \mathcal{T})$ , la base de abiertos en el subespacio  $(Y, \mathcal{T}|_Y)$  se obtiene intersecando<sup>5</sup> los elementos de la base ambiente con el subespacio, es decir,  $\mathcal{B}_Y := \mathcal{B} \cap Y := \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$ .

Ejemplo:

- Si  $y$  es un punto aislado de  $Y$ , por la definición que hemos dado de la topología relativa, su topología relativa sería  $\mathcal{T}|_Y := \{U \cap \{y\}\} = \{y\}$ . Por tanto, es abierto en su topología.
- Retomando el ejemplo anterior, si todos los puntos de  $Y$  son aislados, hemos visto que todos son abiertos (pues cortar un abierto con ellos da ellos mismos) y, por tanto, la topología  $\mathcal{T}|_Y$  es la discreta. Por ejemplo, en  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ :




Figura 1.8: Enteros en los reales como subespacio discreto.

- Si tomamos la topología del punto relativa a  $X \setminus \{a\}$ ,  $\mathcal{T}_a|_{X \setminus \{a\}}$ , vemos que se trata de la discreta.

<sup>4</sup>La comprobación de que efectivamente se trata de una topología es completamente trivial.

<sup>5</sup>Esta idea suele ser general, las construcciones en los subespacios se hacen intersecando elementos del espacio ambiente con el subespacio.

Observación:

1. Los abiertos  $W$  de un subespacio abierto  $Y \overset{\text{ab.}}{\subset} X$  son abiertos en el espacio ambiente  $X$ .

$$W = U \cap Y : U, Y \overset{\text{ab.}}{\subset} X \Rightarrow W \overset{\text{ab.}}{\subset} X$$

2. Los cerrados  $F$  de un subespacio cerrado  $Y \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$  son cerrados en el espacio ambiente  $X$ .

$$F = C \cap Y : Y, C \overset{\text{cerr.}}{\subset} X \Rightarrow F \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$$

# APLICACIONES CONTINUAS

---

Una vez vista la estructura de espacio topológico, nos encaminamos a estudiar los morfismos entre estructuras de este tipo. El primer paso para realizar este estudio es una característica clave, no sólo para el Análisis, sino también para la Topología: la continuidad.

A partir de este capítulo, vamos a estudiar las buenas propiedades que adquieren las aplicaciones continuas por la forma en que transforman los abiertos entre espacios y relacionan las topologías de cada uno.

## CONTINUIDAD

Si hacemos memoria, recordaremos la famosa definición  $\varepsilon - \delta$  para la continuidad que nos dieron para  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ . Esta venía decir que una función  $f : X \rightarrow Y$  era continua en un punto  $x_0 \in X$  si y sólo si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : (\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon)$$

y podemos reescribir esto último como  $x \in B(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) \in B(f(x_0), \varepsilon)$  o también como  $f(B(x_0, \delta)) \subset B(f(x_0), \varepsilon)$ . Lo anterior sugiere que la definición más ajena a las propiedades métricas y topológicas de  $\mathbb{R}^n$  sería:

$$\forall B(f(x_0), \varepsilon), \exists B(x_0, \delta) \subset f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$$

Sin embargo, esta definición sólo es válida para los espacios con la topología usual, pues el concepto de bola puede ser (y significar) cosas muy distintas en función de la topología empleada (sin ir más lejos puede no ser un abierto). Por ello, la siguiente definición pretende desligar el concepto de continuidad de la topología usual de  $\mathbb{R}^n$  para que pueda ser aplicable a cualquier espacio topológico.

### Definición (Continuidad)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función entre espacios topológicos, decimos que es **continua en  $x_0 \in X$**  si y sólo si:

$$\forall V^{f(x_0)} : f^{-1}\left(V^{f(x_0)}\right) = V^{x_0}$$

es decir, la preimagen de cualquier entorno de  $f(x_0)$  es entorno de  $x_0$ .

---

### Proposición (Composición de continuidades)

Sean  $f : X \rightarrow Y$  y  $g : Y \rightarrow Z$  funciones continuas en  $x_0 \in X$  e  $y_0 \in Y$  tales que  $f(x_0) = y_0$ , entonces la composición  $h = g \circ f$  es una función continua en  $x_0$ .

Demostración:

Escojamos un entorno  $V^{h(x_0)}$  de la imagen por  $h$  de  $x_0$ , entonces

$$h^{-1}V^{h(x_0)} = f^{-1}g^{-1}V^{g(y_0)} = f^{-1}V^{y_0} = V^{x_0}$$

Ejemplo:

1. Sea  $f : X_{\text{discreta}} \rightarrow Y$ , entonces es continua sean cuales sean los conjuntos de partida y de llegada, pues todo es abierto y, en consecuencia, todo es entorno en  $\mathcal{T}_{\text{disc}}$ .
2. Sea  $f : X \rightarrow Y_{\text{trivial}}$ , entonces es continua sean cuales sean los conjuntos de partida y de llegada, pues como  $Y$  es el único abierto, entonces es el único entorno  $V^{f(x)}$  para cualquier  $f(x)$  y  $f^{-1}V^{f(x)} = f^{-1}Y = X$ , que es abierto.
3. Si una función  $f : X \rightarrow Y_{\text{discreta}}$  es continua, entonces  $f$  es localmente constante, pues como en la trivial los puntos son abiertos, entonces el punto  $\{f(x_0)\}$  es entorno  $V^{f(x_0)}$  de sí mismo. Por tanto, por la continuidad de  $f$ ,  $f^{-1}f(x_0) = V^{x_0}$ , luego  $f \equiv f(x_0)$  en ese entorno  $V^{x_0}$ .
4. Si una función  $f : X \rightarrow Y$  es localmente constante, entonces es continua, puesto que si es localmente constante para cualquier  $x_0 \in X$  existe un entorno  $U^{x_0} : f|_{U^{x_0}} \equiv f(x_0)$ . De este modo, cualquier entorno  $V^{f(x_0)}$  de la imagen  $f(x_0)$  cumple que  $f^{-1}V^{f(x_0)} \supset U^{x_0}$  y llamando  $V^{x_0} = f^{-1}V^{f(x_0)}$  entonces vemos que es entorno de  $x_0$ .

### Proposición (Caracterización de Continuidad)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función entre espacios topológicos, entonces son equivalentes:

1.  $f$  es continua.
2.  $\forall U \overset{\text{ab.}}{\subset} Y : f^{-1}(U) \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ .
3.  $\forall F \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y : f^{-1}(F) \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$ .
4.  $\forall A \subset Y : f^{-1}(\overset{\circ}{A}) \subset \text{Int}(f^{-1}(A))$ .
5.  $\forall A \subset X : f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ .

Demostración:

- 1.  $\Rightarrow$  2.

Escojamos un abierto cualquiera  $W \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$ . Por ser abierto, es entorno de todos sus puntos y, en particular, es entorno de las imágenes que puedan caer dentro de dicho abierto, es decir,  $\forall x \in f^{-1}(W) : W = V^{f(x)}$ . Por continuidad, las preimágenes de entornos de las imágenes son entornos de las preimágenes, luego  $\forall x \in f^{-1}W : f^{-1}W = V^x$  y, como es entorno de todos sus puntos, entonces  $f^{-1}W \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ .

- 2.  $\Rightarrow$  3.

Como lo que sabemos es que las preimágenes de abiertos son abiertas y los cerrados se definen en términos de abiertos, no nos queda otra estrategia que intentar demostrarlo pasando los cerrados a sus complementarios: los abiertos.

Escojamos un cerrado cualquiera  $C \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y$  de modo que conocemos que  $Y \setminus C \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$ . Como conocemos el resultado para abiertos, podemos decir que  $f^{-1}(Y \setminus C) \overset{\text{ab.}}{\subset} X$  y, conjuntivamente,  $X \setminus f^{-1}C = f^{-1}(Y \setminus C)$ , luego directamente tenemos que  $f^{-1}C \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ .

- 3.  $\Rightarrow$  5.

Como  $\overline{f(A)} \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y$  sabemos que  $f^{-1}\overline{f(A)} \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$ . Como  $A \subset f^{-1}f(A) \subset f^{-1}\overline{f(A)}$  y este último es cerrado en  $X$ , entonces  $\overline{A} \subset f^{-1}f(A)$  y, por tanto,  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ .

- 5.  $\Rightarrow$  4.

$$\begin{aligned} Y \setminus \overset{\circ}{A} &\Rightarrow \overline{Y \setminus A} \supset \overline{f(X \setminus f^{-1}A)} \stackrel{5)}{\supset} f\left(\overline{X \setminus f^{-1}(A)}\right) = f(X \setminus \text{Int}(f^{-1}A)) \Rightarrow \\ &X \setminus \text{Int}(f^{-1}A) \subset f^{-1}\left(Y \setminus \overset{\circ}{A}\right) = X \setminus f^{-1}\left(\overset{\circ}{A}\right) \Rightarrow f^{-1}\left(\overset{\circ}{A}\right) \subset \text{Int}(f^{-1}A). \end{aligned}$$

■  $4 \Rightarrow 1)$

$$V^{f(x)} \Rightarrow f(x) \in \text{Int}(V^{f(x)}) \Rightarrow x \in f^{-1}(\text{Int}(V^{f(x)})) \subset \text{Int}(f^{-1}V^{f(x)}) \Rightarrow \\ f^{-1}V^{f(x)} \text{ entorno de } x.$$

Observación:

La definición y posterior caracterización nos permiten recuperar las propiedades de continuidad a las que estamos habituados, como por ejemplo el quinto apartado del que se desprende que la imagen del límite es el límite de la imagen, pero también nos da la posibilidad de utilizar dicha continuidad con fines meramente topológicos, como por ejemplo  $\text{id} : (X, \mathcal{T}_1) \rightarrow (X, \mathcal{T}_2)$  es continua si y sólo si  $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$  (por 1).

## CONTINUIDAD Y SUBESPACIOS

En muchas ocasiones tiene interés estudiar el comportamiento de una función, no en el conjunto total, sino en un subconjunto de puntos concreto. Como hemos definido anteriormente los subespacios topológicos, tiene sentido querer ver cómo se comportan las aplicaciones y, sobre todo, la continuidad cuando trabajamos con estos subconjuntos.

### Proposición

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función continua y  $Z \subset X$  un subespacio topológico, entonces la restricción  $f|_Z : Z \rightarrow Y$  también es continua.

Demostración:

Aplicando la caracterización de continuidad a través de las preimágenes de abiertos, tenemos que:

$$\forall A \overset{\text{ab.}}{\subset} Y : (f|_Z)^{-1}(A) = Z \cap f^{-1}A \overset{\text{ab.}}{\subset} Z$$

donde este último conjunto es abierto por la definición de topología relativa.

Observación:

1. La aplicación inclusión  $Z \xrightarrow{j} X$  es continua.

Demostración:

Para cualquier abierto  $U \overset{\text{ab.}}{\subset} X$  la preimagen  $j^{-1}(U)$  corresponde a los puntos de  $U \cap Z$ , y este último conjunto es abierto en  $Z$  por definición.

2. La continuidad se hereda en la restricción a un subespacio, es decir, si consideramos la aplicación  $Z \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Y$ , entonces la continuidad de  $f$  implica<sup>1</sup> la continuidad de  $f|_Z$ .

Demostración:

Como  $f|_Z = f \circ j$  y ambas son continuas, por composición,  $f|_Z$  es continua.

3. La continuidad es una propiedad local, es decir, que si  $f|_{E^x}$  continua en  $x$ , entonces  $f$  continua en  $x$ .

Demostración:

La preimagen de cualquier entorno  $V^{f(x)}$  es  $(f|_E)^{-1}(V^{f(x)}) = W^x$  un entorno de  $x$  en  $E^x$ , pero tenemos que ver que lo es en  $X$  para poder afirmar que es continua. Como  $W^x \overset{\text{ent.}}{\subset} E^x \overset{\text{ent.}}{\subset} X$ , entonces  $W^x \overset{\text{ent.}}{\subset} X$ , ya que entorno de entorno es entorno.

---

<sup>1</sup>Pero el recíproco no es cierto, la continuidad en un subespacio no extiende la continuidad a todo el espacio.

Esta última afirmación es cierta porque:

$$\left. \begin{array}{l} W^x \underset{\text{ent.}}{\subset} E^x \Rightarrow \exists G \underset{\text{ab.}}{\subset} E^x \text{ tal que } G \subset W^x, G = A \cap E^x \subset X \\ E^x \underset{\text{ent.}}{\subset} X \Rightarrow \exists B \underset{\text{ab.}}{\subset} X \text{ tal que } B \subset E^x \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$x \in \underbrace{A \cap B}_{\substack{\text{ab.} \\ \subset X}} \subset \underbrace{A \cap E^x}_{=G} \subset W^x$$

4. Si  $f|_{U \underset{\text{ab.}}{\subset} X}$  es continua  $\Rightarrow f$  continua  $\forall x \in U$ .

5.  $x$  es aislado  $\Rightarrow f$  continua en  $x$ .

Demostración:

$x$  aislado  $\Leftrightarrow V^x = \{x\}$  es abierto de  $X$ .  $f|_{V^x} : \{x\} \rightarrow Y$ .

6.  $f : X \rightarrow Y \supset Z$  tal que  $f(X) \subset Z \subset Y$  (si no es así puede estar mal definido).

Entonces,  $f$  a  $Y$  es continua  $\Leftrightarrow f$  a  $Z$  es continua.

Demostración:

- $f$  cont. en  $Z \xrightarrow{j \circ f} f$  cont. en  $Y$ .
- $f$  cont. en  $Y \xrightarrow{?} f$  cont. en  $Z$ .

Sea  $U_z$  ab. en  $Z$ . Este será  $U_y \cap Z = U_z$  que cumple,  $f_z^{-1}(U_y \cap Z) \xrightarrow{f(X) \subset Z} f_y^{-1}(U_y)$  que es abierto en  $X$  (por ser  $f_y$  continua).

### Proposición (Criterios de continuidad por recubrimientos)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función entre espacios topológicos, si se da alguna de las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} X = \bigcup_{i \in I} U_i \text{ donde } U_i \underset{\text{ab.}}{\subset} X \\ \forall f|_{U_i} : U_i \rightarrow Y \text{ cont.} \end{cases} \quad \begin{cases} X = \bigcup_{i=0}^n F_i \text{ donde } F_i \underset{\text{cerr.}}{\subset} X \\ \forall f|_{F_i} : F_i \rightarrow Y \text{ cont.} \end{cases}$$

entonces la función  $f$  del inicio es continua.

Demostración:

- Escojamos un abierto cualquiera  $W \underset{\text{ab.}}{\subset} Y$  y veamos si su preimagen  $f^{-1}W$  es un abierto en  $X$ .

En primer lugar, por ser  $X = \bigcup_{i \in I} U_i$  podemos escribir que  $f^{-1}W = X \cap f^{-1}W = \bigcup_{i \in I} U_i \cap f^{-1}W = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap f^{-1}W) = \bigcup_{i \in I} (f|_{U_i})^{-1}W$ . Como  $(f|_{U_i})^{-1}W \underset{\substack{\text{ab.} \\ (\text{cont.})}}{\subset} U_i \underset{\text{ab.}}{\subset} X$ ,

entonces  $(f|_{U_i})^{-1}W \underset{\text{ab.}}{\subset} X$  y de esta manera podemos escribir  $f^{-1}W$  como unión de abiertos  $\bigcup_{i \in I} (f|_{U_i})^{-1}W$  de  $X$ , es decir, que  $f^{-1}W \underset{\text{ab.}}{\subset} X$ .

- Escojamos un cerrado cualquiera  $C \underset{\text{cerr.}}{\subset} Y$  y veamos si su preimagen  $f^{-1}C$  es cerrada en  $X$ .

En primer lugar, por ser  $X = \bigcup_{i=0}^n F_i$  podemos escribir que  $f^{-1}C = X \cap f^{-1}C = \bigcup_{i=0}^n F_i \cap f^{-1}C = \bigcup_{i=0}^n (F_i \cap f^{-1}C) = \bigcup_{i=0}^n (f|_{F_i})^{-1}C$ . Como  $(f|_{F_i})^{-1}C \underset{\substack{\text{cerr.} \\ (\text{cont.})}}{\subset} F_i \underset{\text{cerr.}}{\subset} X$ , entonces

$(f|_{F_i})^{-1}C \underset{\text{cerr.}}{\subset} X$  y de esta manera podemos escribir  $f^{-1}C$  como unión finita de cerrados  $\bigcup_{i=0}^n (f|_{F_i})^{-1}C$  de  $X$ , es decir, que  $f^{-1}C \underset{\text{cerr.}}{\subset} X$ .

# HOMEOMORFISMOS

Supongamos que tenemos una función  $f$  biyectiva y continua. Con las definiciones de continuidad anteriores hemos caracterizado la topología de las imágenes por  $f^{-1}$ , pero no sabemos nada de cómo se comporta la función  $f$  con respecto a abiertos, cerrados, etc. Nos gustaría poder destacar en qué condiciones una función establece una biyección entre abiertos de dos espacios, pues de esa forma existiría un “isomorfismo” entre ambas topologías a la hora de trabajar con ellas. Esta idea es precisamente la que hay detrás de la definición de homeomorfismo.

## Definición (Aplicaciones abiertas y cerradas)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función entre espacios topológicos, decimos que es:

- **abierta** si y sólo si las imágenes de abiertos son abiertos.
- **cerrada** si y sólo si las imágenes de cerrados son cerrados.

Observación:

La caracterización que dimos de la continuidad hacía referencia a las preimágenes de abiertos y cerrados, no a sus imágenes. De hecho, ni la continuidad implica que la aplicación sea abierta o cerrada, ni viceversa.

Ejemplo:

En la siguiente tabla podemos ver distintos ejemplos de funciones que verifican algunas de las condiciones que hemos definido, pero no otras simultáneamente:

Función	continua	abierta	cerrada
$Id : X_{\text{trivial}} \rightarrow X_{\text{discreta}}$	✗	✓	✓
$Id : X_{\text{discreta}} \rightarrow X_{\text{trivial}}$	✓	✗	✗
$j : [0, 1] \subset \mathbb{R}_u$	✓	✗	✓
$j : (0, 1) \subset \mathbb{R}_u$	✓	✓	✗

Cuadro 2.1: En la tabla anterior podemos ver ejemplos de funciones que son continuas, abiertas o cerradas de distintas formas.

## Proposición (Trivialidades esenciales)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función biyectiva, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1.  $f$  es abierta
2.  $f$  es cerrada
3.  $f^{-1}$  es continua.

Demostración:

- 1.  $\Rightarrow$  2.

Sea  $F \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$ , por la definición de cerrado su complementario  $X \setminus F$  es abierto en  $X$ . De esta manera, como  $f$  es abierta, entonces  $f(X \setminus F) \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$ . Por la biyectividad,  $f(X \setminus F) = Y \setminus f(F)$ , es decir, que  $f(F) \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y$ , lo que demuestra que  $f$  es cerrada.

- 2.  $\Rightarrow$  3.

Sea  $F \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$ , como  $f$  es cerrada,  $f(F) \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y$ . Pero  $f(F) = (f^{-1})^{-1}(F)$  por la biyectividad de  $f$ , luego hemos demostrado que  $f^{-1}$  continua porque las preimágenes de cerrados son cerrados.

■ 3.  $\Rightarrow$  1.

Sea  $U \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ , por la continuidad de  $f^{-1}$ , la preimagen  $(f^{-1})^{-1}(U) \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$ . Por tanto, como  $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ , hemos demostrado que  $f$  es abierta.

---

### Definición (Homeomorfismo)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una aplicación biyectiva, decimos que es un **homeomorfismo** si y sólo si  $f$  y  $f^{-1}$  son continuas o, equivalentemente, si  $f$  es continua y abierta o cerrada.

---

#### Observación:

La definición de homeomorfismo es importante porque no establece simples biyecciones entre conjuntos, establece biyecciones sobre topologías:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{T}_X &\rightarrow \mathcal{T}_Y \\ U &\mapsto f(U) \\ f^{-1}(W) &\leftrightarrow W \end{aligned}$$

Esto permite trabajar con los abiertos de un lado y trasladar el mismo trabajo a los del otro de forma canónica.

---

### Definición (Homeomorfismo Local)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función entre espacios topológicos, decimos que es un **homeomorfismo local en  $x_0 \in X$**  si y sólo si existen algunos entornos  $V^{x_0}$  y  $V^{f(x_0)}$  tales que la restricción  $f : V^{x_0} \rightarrow V^{f(x_0)}$  es un homeomorfismo.

---

#### Observación:

En general, cuando decimos que una aplicación  $f : X \rightarrow Y$  es un homeomorfismo local sin especificar en qué punto, estamos diciendo que es homeomorfismo local para cualquier punto  $x \in X$ .

#### Observación:

En la definición de homeomorfismo local anterior, podemos tomar  $V^{x_0}$  y  $V^{f(x_0)}$  como entornos abiertos.

#### Demostración:

Si  $f$  es homeomorfismo local, entonces  $\exists V^a \subset X$  y  $V^{f(a)} \subset Y$  tal que  $f : V^a \rightarrow V^{f(a)}$  es homeomorfismo y, por esta razón, sabemos que  $\exists U^a \overset{\text{ab.}}{\subset} V^a$  tal que  $f(U^a) \overset{\text{ab.}}{\subset} V^{f(a)}$ .

Además, como  $f(U^a)$  es abierto en  $V^{f(a)}$ , sabemos que  $f(U^a)$  es entorno<sup>2</sup> de  $f(a)$  en  $V^{f(a)}$ . Como tenemos la secuencia  $f(U^a) \overset{\text{ent.}}{\subset} V^{f(a)} \overset{\text{ent.}}{\subset} Y$ , sabemos que  $f(U^a) \overset{\text{ent.}}{\subset} Y$  de  $f(a)$  y, por tanto, podemos encontrar un abierto  $W \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$  tal que  $W \subset f(U^a)$ .

Por tanto, como se trata de un homeomorfismo local, existirá algún  $G \overset{\text{ab.}}{\subset} U^a$  de forma que  $f(G) = W$ . Pero como  $U^a$  es abierto global, entonces tenemos que  $G \overset{\text{ab.}}{\subset} X$  y hemos acabado, pues tenemos el homeomorfismo local definido en  $f : G \rightarrow W$ .

### Proposición (Restricción de homeomorfismos)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  un homeomorfismo, la restricción  $f : Z \rightarrow f(Z)$  a cualquier subespacio  $Z \subset X$  también es homeomorfismo.

---

<sup>2</sup>En este punto no podemos parar y decir que es abierto porque lo que sabemos es que  $f(U^a)$  es abierto en  $V^{f(a)}$ , pero no sabemos nada sobre si es abierto en  $Y$ , que es lo que necesitamos.

#### Demostración:

La restricción será biyectiva por serlo  $f$  y ser el conjunto de llegada  $f(Z)$ . Una biyección es homeomorfismo si tanto  $f$  como  $f^{-1}$  son continuas y como ya vimos que la restricción de una continua es continua, sabemos que la restricción de  $f$  y  $f^{-1}$  a  $Z$  y  $f(Z)$  son también continuas, es decir,  $f|_Z$  es homeomorfismo.

#### **Proposición (Composición de homeomorfismos)**

*Sean  $f : X \rightarrow Y$  y  $g : Y \rightarrow Z$  dos homeomorfismos, su composición  $h = f \circ g$  también es homeomorfismo.*

#### **Proposición**

*Sea  $f : X \rightarrow Y$  un homeomorfismo local, entonces es abierto.*

#### Demostración:

Hay dos formas de demostrarlo, la primera es intentando ver que para cualquier  $U \subset X$  ocurre que  $f(U)$  es entorno de las imágenes de todos los puntos de  $U$ .

Con este objetivo, sabemos que por ser  $f$  homeomorfismo local existe una restricción  $\exists f| : V^{x_0} \rightarrow V^{y_0}$  para cada punto  $x_0 \in U$  y usando la notación  $y_0 = f(x_0)$ . Como esta restricción es homeomorfismo,  $f(U \cap V^{x_0}) \subset V^{y_0}$  y, por tanto,  $f(U \cap V^{x_0})$  es entorno en  $Y$  de  $y_0$ . Al ocurrir esto para todos los puntos  $y$ , teniendo en cuenta que  $f(U \cap V^{x_0}) \subset f(U)$ , sabemos que  $f(U)$  es entorno de las imágenes de todos los puntos de  $U$ .

La otra forma de verlo es que, por ser homeomorfismo local, para cualquier punto  $x \in X$  existe un entorno abierto  $W^x \subset X$  de forma que  $f(W^x) \subset Y$  es abierto. De esta manera, y abusando de la notación, escribiendo  $W^x = W^x \cap U$ ,  $U$  puede expresarse como  $U = \bigcup_{x \in U} W^x$ . Por tanto,  $f(U) = f(\bigcup_{x \in U} W^x) = \bigcup_{x \in U} f(W^x)$  que es unión de abiertos, luego es abierto.

#### Ejemplo: (¡Importantes!)

##### **1. Proyección estereográfica:**

Sea  $\mathbb{S}^m$  y  $a \in \mathbb{S}^m \Rightarrow \mathbb{S}^m \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}^m$  homeomorfismo. ( $\mathbb{R}^m$  es en realidad un hiperplano de  $\mathbb{R}^{m+1}$  en el que se encuentra contenida la “esfera”)

##### **2. Proyección exponencial:**

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 : \theta \mapsto e^{2\pi i \theta} = (\cos 2\pi\theta, \sin 2\pi\theta)$  es homeomorfismo local, pero no es inyectiva al ser periódica.

##### **3. Proyección antipodal:**

$\mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\} \supset \mathbb{S}^m \rightarrow \mathbb{RP}^m : x \mapsto [x]$  es homeomorfismo local. Es 2-1 por llevar las antípodas al mismo  $[x]$ .

Podemos dividir  $\mathbb{S}^m$  tal que:  $\mathbb{S}^m = S_+ \cup S_- \cup E$  (ecuador). Llamando  $U_p$  a todas las rectas no contenidas en el plano ortogonal a la recta formada por el punto que se quita y su antípoda. Con esto tenemos  $U_p \simeq \mathbb{R}^m$ . Uniéndolo con el hiperplano del infinito  $H_p^\infty$  tenemos que los polos van a  $U_p$  y  $E$  a  $H_p^\infty$ . Esta correspondencia es homeomorfa por lo que se puede trasladar la topología.

Con esto, esta proyección será un recubrimiento doble de  $\mathbb{RP}^m$ ,  $m \geq 2$ .

##### **4. Lemniscata:**

$f : \mathbb{R} \rightarrow X \subset \mathbb{R}^2 : t \mapsto \left( \frac{t}{1+t^4}, \frac{t^3}{1+t^4} \right)$  es biyectiva y continua, pero NO homeomorfismo local.



Figura 2.1: Representación Lemniscata.

Engañosamente:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \exists (t - \varepsilon, t + \varepsilon) = I_\varepsilon : f| : I_\varepsilon \rightarrow f(I_\varepsilon)$$

es homeomorfismo.

En  $t = 0$ ,  $f(I_\varepsilon)$  NO es entorno de  $f(0) = (0, 0)$ , porque se tienen que tomar elementos de la rama “vertical”.

5. Las **coordenadas polares**  $(0, \rightarrow) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$  son homeomorfismo local con  $\theta_0 \in (\theta_0 - \pi, \theta_0 + \pi)$  hasta  $\mathbb{R}^2 \setminus L$  con  $L$  la recta entre  $O$  y  $\theta_0$ .

### Definición (Variedad Topológica)

Una **variedad topológica** de dimensión  $m$  es un espacio localmente homeomorfo a  $\mathbb{R}^m$ , es decir, que cada punto tiene un entorno abierto homeomorfo a una bola<sup>3</sup>  $B(0, \varepsilon) \subset \mathbb{R}^m$ .

Ejemplo:

Esferas, espacios proyectivos, toros...

<sup>3</sup>Luego, en el fondo, es homeomorfo a cualquier bola y, por ser éstas parte de una base de  $\mathbb{R}^m$ , es homeomorfo a todo  $\mathbb{R}^m$ .

# CONSTRUCCIONES

---

En este capítulo buscaremos topologías en base a unas aplicaciones con el objetivo de hacer a dichas aplicaciones continuas. Tras esto, daremos una caracterización de la topología construida. Por último, exploraremos las propiedades de las construcciones.

## IMÁGENES INVERSAS

El objetivo de esta construcción es crear una topología que, al ser equipada en el conjunto de partida, haga la aplicación  $f : (Y, ?) \rightarrow (X, \mathcal{T})$  continua. Recordemos que, para poder cumplir con la definición de continuidad, las preimágenes de abiertos deben ser abiertos, luego cuantos más abiertos “metamos” en dicha topología más “fácil” será que las imágenes inversas caigan en abiertos.

Con dicha observación lo que se nos viene a la cabeza es tomar como topología la discreta, sin embargo, esto carece de interés: lo que realmente nos gustaría es la topología con menos abiertos posibles que haga la función continua.

### Definición (Topología Imagen Inversa)

Sea  $f : Y \rightarrow (X, \mathcal{T})$  una aplicación, definimos la **topología de la imagen inversa** como la topología menos fina que podemos equipar a  $Y$  para que la aplicación  $f$  sea continua:

$$f^{-1}\mathcal{T} = \{f^{-1}U : U \in \mathcal{T}\}$$

donde los abiertos son exactamente las preimágenes de los abiertos la topología de llegada.

---

### Observación:

Tras la introducción de la sección, la topología de la definición parece la más razonable para ser candidata a menos fina posible, puesto que de ser topología (hay que probarlo) hemos “metido” los abiertos indispensables para la continuidad que son precisamente las imágenes inversas.

### Proposición

Sea  $f : (Y, f^{-1}\mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T})$  donde  $f^{-1}\mathcal{T}$  es la topología de la imagen inversa, entonces:

1.  $f^{-1}\mathcal{T}$  es topología.
2.  $f^{-1}\mathcal{T}$  es la menos fina posible.

### Demostración:

1. Las imágenes inversas funcionan muy bien con uniones, intersecciones, etc. Por tanto, la demostración de que es topología es trivial.

2. Consideremos cualquier otra topología  $\mathcal{T}'$  en  $Y$  que haga la función  $f$  continua. Si tomamos un abierto  $U \in f^{-1}\mathcal{T}$  en la topología inversa, entonces  $\exists V \in \mathcal{T} : f^{-1}V = U$ . Asimismo, como  $f$  también es continua en  $\mathcal{T}'$  sabemos que  $U = f^{-1}V$  también es abierto en  $\mathcal{T}'$ , es decir, todo abierto en  $f^{-1}\mathcal{T}$  es también abierto en  $\mathcal{T}'$  y, por tanto,  $f^{-1}\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ .

## Caracterización de la imagen inversa

En muchas ocasiones, tendremos diagramas con varias aplicaciones entre varios espacios topológicos. En estas situaciones, es de utilidad tener algún teorema para poder identificar unas topologías con otras, ya que entender y manejar bien unas puede tener buenas “traslaciones” en las otras. Es por ello que tiene gran utilidad el siguiente teorema de caracterización de la topología inversa en circunstancias como las descritas.

### **Teorema (Propiedad universal de las inmersiones)**

Sean  $g : (Z, \mathcal{T}'') \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$  y  $f : (Y, \mathcal{T}') \rightarrow (X, \mathcal{T})$  dos funciones entre espacios topológicos:

$$\begin{array}{ccc} (Y, \mathcal{T}') & \xrightarrow{f} & (X, \mathcal{T}) \\ g \uparrow & \nearrow f \circ g & \\ (Z, \mathcal{T}'') & & \end{array}$$

Figura 3.1: Ilustración de la composición propuesta

entonces  $\mathcal{T}' = f^{-1}\mathcal{T}$  si y sólo si:

$$\forall g : g \text{ cont.} \Leftrightarrow f \circ g \text{ cont.}$$

Demostración:

$$\Rightarrow) \mathcal{T}' = f^{-1}\mathcal{T} :$$

- $g \text{ cont.} \Rightarrow f \circ g \text{ cont.}$  es trivial por composición de continuas.
- $f \circ g \text{ cont.} \Rightarrow g \text{ cont.}$

Para probarlo, basta ver para cualquier abierto  $V \in \mathcal{T}'$ ,  $g^{-1}V$  es abierto en  $\mathcal{T}''$ . Por ser  $\mathcal{T}' = f^{-1}\mathcal{T}$ , entonces  $g^{-1}V = g^{-1}f^{-1}U$  para algún abierto  $U \in \mathcal{T}$ , pero es que precisamente  $g^{-1}f^{-1}U = (f \circ g)^{-1}U \in \mathcal{T}''$  por ser  $f \circ g$  continua.

$$\Leftarrow) \text{ Para demostrarla vamos a ver el doble contenido de } \mathcal{T}' \text{ en } f^{-1}\mathcal{T} \text{ y viceversa.}$$

Como la propiedad de caracterización se cumple para cualquier  $g$  que escogamos, podemos escoger como  $g$  la aplicación identidad. De esta manera,  $g \text{ cont.} \Leftrightarrow f \circ g \text{ cont.}$  implica que  $id \text{ cont.} \Leftrightarrow f \circ id = f \text{ cont.}$ , luego hemos demostrado que  $f$  es continua.

$$\begin{array}{ccc} (Y, \mathcal{T}') & \xrightarrow{f} & (X, \mathcal{T}) \\ id \uparrow & \nearrow f & \\ (Y, \mathcal{T}') & & \end{array}$$

Y como precisamente  $f^{-1}\mathcal{T}$  es la topología menos fina que posibilita la continuidad de  $f$ , sabemos que  $\mathcal{T}' \supset f^{-1}\mathcal{T}$ .

Si ahora utilizamos como  $g$  la identidad puramente conjuntista (las topologías no se conservan, pero los puntos van a ellos mismos), entonces:

$$\begin{array}{ccc} (Y, \mathcal{T}') & \xrightarrow{f} & (X, \mathcal{T}) \\ id \uparrow & \nearrow f \text{ cont.} & \\ (Y, f^{-1}\mathcal{T}) & & \end{array}$$

De nuevo, por la propiedad de caracterización sabemos que esta nueva “identidad” es una función continua. Por tanto, si tomamos  $U \in \mathcal{T}'$  sabemos que  $id^{-1}U \in f^{-1}\mathcal{T}$  y como es una identidad,  $U = f^{-1}U$  (como conjunto), es decir,  $U \in f^{-1}\mathcal{T}$ .

## Inmersiones

La construcción anterior cobra especial relevancia cuando la aplicación  $f : Y \rightarrow X$  que hemos hecho continua con la topología imagen inversa es inyectiva porque de alguna forma permite “sumergir” el espacio de salida en el de llegada.

### Definición (Inmersión)

Sea  $f : (Y, f^{-1}\mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T})$  una aplicación continua gracias a la topología de la imagen inversa, decimos que es una **inmersión** si y sólo si es inyectiva.

### Proposición (Caracterización de Inmersiones)

Sea  $f : (Y, \mathcal{T}') \rightarrow (X, \mathcal{T})$  una aplicación entre espacios topológicos, entonces:

$$f \text{ es inmersión} \Leftrightarrow f : (Y, \mathcal{T}') \xrightarrow{\text{homeo.}} (f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)})$$

Demostración:

$$\Rightarrow) \text{ Tenemos que } f : (Y, f^{-1}\mathcal{T}) \rightarrow (f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)}).$$

Como  $f$  es inmersión sabemos que es inyectiva, lo que sumado a que el espacio de llegada es  $f(Y)$ , nos permite saber que es sobreyectiva y, por tanto, biyectiva. De los requisitos para ver que es un homeomorfismo, nos quedaría confirmar que es continua y abierta :

- Continua:

Si escogemos un abierto cualquier  $U \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$ , por ser abierto de la topología relativa, sabemos que  $\exists W \in \mathcal{T} : U = f(Y) \cap W$  y entonces su imagen inversa

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(W \cap f(Y)) = Y \cap f^{-1}(W) = f^{-1}(W) \in f^{-1}\mathcal{T}$$

- Abierta:

Observamos que cualquier abierto  $U \in f^{-1}\mathcal{T}$  de la topología imagen inversa es preimagen de un abierto de la topología de llegada, es decir,  $\exists W \in \mathcal{T} : f^{-1}W = U$ . Por tanto, si calculamos la imagen de  $U$  por  $f$ , tenemos que:

$$fU = ff^{-1}W = W \cap f(Y) \stackrel{\text{ab.}}{\subset} f(Y)$$

es decir que  $fU$  es abierto en  $f(Y)$ .

$$\Leftarrow) \text{ Veamos por el doble contenido de } \mathcal{T}' = f^{-1}\mathcal{T}$$

- ⊂) Sea  $U \in \mathcal{T}'$ , como es homeomorfismo, es abierto, luego  $fU \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$ , es decir,  $\exists W \in \mathcal{T}'|_{f(Y)} : f^{-1}W = U$ , luego podemos decir que  $U \in f^{-1}\mathcal{T}$ .
- ⊃) Sea  $U \in f^{-1}\mathcal{T}$ , por definición,  $\exists W \in \mathcal{T}|_{f(Y)} : f^{-1}W = U$  y, como  $f$  es continua en  $\mathcal{T}'$ ,  $U = f^{-1}W \in \mathcal{T}'$ .

Observación:

Podemos extraer de la definición, pero sobre todo de la caracterización anterior de inmersión las siguientes conclusiones:

1. Si una función  $f : Y \rightarrow X$  es inyectiva, continua y abierta o cerrada, entonces es inmersión.

Demostración:

La caracterización de imagen inversa exige continuidad, biyectividad y apertura o cierre (es decir, que sea homeomorfismo) de la aplicación  $g : Y \rightarrow f(Y)$ .

Como  $f$  es inyectiva y coincide con  $g$  en la imagen  $f(Y)$ , ésta última también es inyectiva, luego por ser sobreyectiva es biyectiva. La continuidad también se extiende a  $g$  naturalmente y falta solo ver que es abierta o cerrada respectivamente. Si  $f$  lo es, entonces para cualquier abierto o cerrado  $W \subset Y$  su imagen  $f(W)$  será abierta o cerrada en  $X$ . Del mismo modo, para cualquier abierto o cerrado  $W \subset Y$  su imagen  $g(W)$  se puede escribir como  $g(W) = f(W) \cap f(Y)$  que es abierto o cerrado por ser un corte de un abierto o cerrado ambiente con el subespacio  $f(Y)$ .

2. Si  $f : Y \rightarrow X$  es una inmersión, entonces:

- es una aplicación abierta si y sólo si  $f(Y)$  es abierto en  $X$ .
- es una aplicación cerrada si y sólo si  $f(Y)$  es cerrado en  $X$ .

Demostración:

En ambos casos, la implicación de izquierda a derecha es trivial, luego sólo es necesaria la de derecha a izquierda:

- $\forall V = f^{-1}U \in f^{-1}\mathcal{T}, fV = \overbrace{U \cap f(Y)}^{\text{inter. abiertos}} \in \mathcal{T}$ .
- $\forall C \subset^{\text{cerr.}} f^{-1}\mathcal{T}, Y \setminus C = f^{-1}U \in f^{-1}\mathcal{T} \Rightarrow f(C) = \underbrace{(X \setminus U) \cap f(Y)}_{\text{inter. cerrados}} \subset^{\text{cerr.}} X$

3. Las inmersiones y la apertura o cierre de la aplicación no están relacionadas. Esto quiere decir que existen inmersiones que no son abiertas ni cerradas, que sólo son abiertas, que sólo son cerradas y ambas cosas simultáneamente.

Observación:

Las inmersiones son las que justifican la idea de considerar unos espacios como subespacios de otros. Las frases “el plano proyectivo real no es un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ ”, “la esfera no es un subespacio de  $\mathbb{R}^2$ ” o “el plano proyectivo real es un subespacio de  $\mathbb{R}^4$ ” se refieren a esto mismo: cuándo hay o no hay una inmersión del primer espacio en el segundo, es decir, un subespacio del segundo homeomorfo al primero.

## IMÁGENES DIRECTAS

El objetivo de esta construcción es crear una topología que, al ser equipada en el conjunto de llegada, haga la aplicación  $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, ?)$  continua. De nuevo, recordemos que, para poder cumplir con la definición de continuidad, las preimágenes de abiertos deben ser abiertos, luego cuantos menos abiertos “metamos” en dicha topología menos posibilidades habrá de que sus preimágenes no caigan en abiertos.

Con dicha observación, en este caso lo que se nos viene a la cabeza es tomar como topología la trivial, sin embargo, esto vuelve a carecer de interés: lo que realmente nos gustaría es la topología con más abiertos posibles que haga la función continua.

### Definición (Topología Imagen Directa)

Sea  $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow Y$  una aplicación, definimos la **topología de la imagen directa** como la topología más fina que podemos equipar a  $Y$  para que la aplicación  $f$  sea continua, que es la topología:

$$f\mathcal{T} = \{V \subset Y : f^{-1}V \in \mathcal{T}\}$$

donde los abiertos son exactamente aquellos cuyas preimágenes son abiertos de la topología de salida.

#### Observación:

Tras la introducción de la sección, de nuevo, parece que la topología de la definición es la más razonable para ser candidata a más fina posible, puesto que de ser topología (hay que probarlo) hemos “metido” todo lo que podemos meter como abierto conservando el requisito de la continuidad.

### Proposición

Sea  $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, f\mathcal{T})$  donde  $f\mathcal{T}$  es la topología de la imagen directa, entonces:

1.  $f\mathcal{T}$  es topología.
2.  $f\mathcal{T}$  es la más fina posible.

#### Demostración:

1. Trivial.
2. Consideremos cualquier otra topología  $\mathcal{T}'$  en  $Y$  tal que haga  $f$  continua. Si tomamos un abierto  $U \in \mathcal{T}'$ , como conserva la continuidad,  $f^{-1}U = W \in \mathcal{T}$ . Sin embargo, tal y como hemos definido  $f\mathcal{T}$ , sabemos que  $U \in f\mathcal{T}$  porque  $W \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ , luego  $\mathcal{T}' \subset f\mathcal{T}$ .

### Caracterización de la imagen directa

De nuevo, en las situaciones en las que haya diagramas con varias aplicaciones entre varios espacios topológicos, es de utilidad tener algún teorema para poder identificar unas topologías con otras, ya que entender y manejar bien unas pueden tener buenas “traslaciones” en las otras. Por ello, tiene gran utilidad el teorema de caracterización de la topología directa en circunstancias como las descritas.

### Teorema (Propiedad universal de las identificaciones)

Sean  $g : (Y, \mathcal{T}') \rightarrow (Z, \mathcal{T}'')$  y  $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$  dos funciones entre espacio topológicos

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}) & \xrightarrow{f} & (Y, \mathcal{T}') \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & (Z, \mathcal{T}'') \end{array}$$

Figura 3.2: Ilustración de la composición propuesta

entonces  $\mathcal{T}' = f\mathcal{T}$  si y sólo si:

$$\forall g, g \text{ cont.} \Leftrightarrow g \circ f \text{ cont.}$$

Demostración:

$\Rightarrow) \mathcal{T}' = f\mathcal{T} :$

- $g$  cont.  $\Rightarrow g \circ f$  cont. es trivial por composición de continuas.

- $g \circ f$  cont.  $\Rightarrow g$  cont.

Si escogemos un  $W \in \mathcal{T}''$  sabemos que  $f^{-1}(g^{-1}W) = (g \circ f)^{-1}W \in \mathcal{T}$  porque la aplicación  $g \circ f$  es continua. Sin embargo, que  $f^{-1}V \in \mathcal{T}$  implica que  $V \in \mathcal{T}'$  porque  $\mathcal{T}' = f\mathcal{T}$ , luego  $g^{-1}W \in \mathcal{T}'$ , es decir, es continua.

$\Leftarrow)$  Para demostrarla vamos a ver el doble contenido de  $\mathcal{T}' = f^{-1}\mathcal{T}$ .

Como la caracterización se cumple para cualquier  $g$ , en particular podemos seleccionar como  $g$  la identidad. Como la identidad es continua, por la caracterización,  $id \circ f = f$  es continua y, como  $f\mathcal{T}$  es la topología más fina que hace  $f$  continua, entonces  $\mathcal{T}' \subset f\mathcal{T}$ .

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}) & \xrightarrow{f} & (Y, \mathcal{T}') \\ g \circ f = f & \searrow & \downarrow id \\ & & (Y, \mathcal{T}') \end{array}$$

De la misma manera que antes, podemos seleccionar como  $g$  la identidad meramente conjuntista (donde cada punto va a sí mismo, pero no se conserva la topología porque son distintas la de salida y la de llegada).

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}) & \xrightarrow{f} & (Y, \mathcal{T}') \\ f \text{ cont.} & \searrow & \downarrow id \\ & & (Y, f\mathcal{T}) \end{array}$$

En este caso, como  $f$  va de  $(X, \mathcal{T})$  a  $(Y, f\mathcal{T})$  es continua por definición de  $f\mathcal{T}$  y, por la caracterización, sabemos que la “identidad” que hemos seleccionado también lo es. Esto quiere decir que  $\forall W \in f\mathcal{T}, id^{-1}W = W \in \mathcal{T}'$ , por tanto,  $f\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ .

Observación:

$f(X)$  es abierto y cerrado en  $f\mathcal{T}$  :  $\begin{cases} \forall y \in Y \setminus f(X), f^{-1}y = \emptyset \in \mathcal{T} \Rightarrow \{y\} \in f\mathcal{T} \\ f^{-1}f(X) = X \in \mathcal{T} \Rightarrow f(X) \in f\mathcal{T} \end{cases}$

## Identificaciones

La construcción anterior cobra especial relevancia cuando la aplicación  $f : Y \rightarrow X$  que hemos hecho continua con la topología imagen directa es sobreyectiva porque de alguna forma permite “identificar” el espacio de llegada en el de salida.

---

### Definición (Identificación)

Sea  $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$  una aplicación sobreyectiva, decimos que es una **identificación** si y sólo si  $\mathcal{T}' = f\mathcal{T}$ .

---

Observación:

1. Las identificaciones verifican  $V \overset{\text{ab.}}{\subset} Y \Leftrightarrow f^{-1}V \overset{\text{ab.}}{\subset} X$  y la continuidad  $V \overset{\text{ab.}}{\subset} Y \Rightarrow f^{-1}V \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ .

2. Si una función  $f : X \rightarrow Y$  es sobreyectiva, continua y abierta o cerrada, entonces es identificación.

Demostración:

Las hipótesis ya nos otorgan la continuidad y la sobreyectividad, hay que demostrar pues que  $f\mathcal{T}' = f\mathcal{T}$  utilizando que es abierta o cerrada.

■ Abierta:

Hay que ver que  $\forall V \subset Y : f^{-1}V \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ ,  $V \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$ . Por ser  $f$  sobreyectiva,  $f^{-1}V$  está bien definido y, por tanto, podemos escribir  $V = f(f^{-1}V)$ . Como  $f$  es abierta,  $\forall W \overset{\text{ab.}}{\subset} X : f(W) \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$  y como  $f^{-1}V$  es abierto por la continuidad de  $f$ , entonces  $V \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$ .

■ Cerrada:

$$f^{-1}V \overset{\text{ab.}}{\subset} X \overset{\text{cerr.}}{\Rightarrow} \underbrace{f(X \setminus f^{-1}(V))}_{\text{sobr. } Y \setminus V} \overset{\text{cerr.}}{\subset} Y \Rightarrow V \overset{\text{ab.}}{\subset} Y$$

3. Las identificaciones y la apertura o cierre de la aplicación no están relacionadas. Esto quiere decir que existen identificaciones que no son abiertas ni cerradas, que sólo son abiertas, que sólo son cerradas y ambas cosas simultáneamente.

## Espacio Cociente

Para entender los abiertos de una imagen directa es conveniente representarlos en el dominio. El concepto es conjuntista en realidad:

### Definición (Conjunto Saturado)

Sea  $A \subset X$  un subconjunto de puntos, decimos que es **saturado respecto de  $f$**  si y sólo si  $f^{-1}f(A) = A$ .

### Proposición (Caracterización de abiertos de $f\mathcal{T}$ )

Sea  $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, f\mathcal{T})$  donde  $f\mathcal{T}$  es la topología imagen directa, los abiertos de  $f\mathcal{T}$  son las imágenes de los abiertos saturados de  $\mathcal{T}$ , es decir:

$$f\mathcal{T} := \{fU \text{ donde } U \in \mathcal{T} \text{ y } f^{-1}fU = U\}$$

Demostración:

$\Rightarrow) V \in f\mathcal{T} \Rightarrow f^{-1}V \in \mathcal{T}$  y  $V \overset{f \text{ sobre}}{=} f^{-1}fV$ , es decir, que  $f^{-1}V$  es saturado.

$\Leftarrow) \text{ Sea } V \in Y : \exists U \in \mathcal{T}, \text{ saturado tal que: } fU = V$ . Debemos ver que  $f^{-1}V \in \mathcal{T}$ .

Como  $f^{-1}V = f^{-1}fU \overset{\text{sat.}}{=} U \in \mathcal{T}$  ya lo tenemos.

Observación:

Los abiertos no saturados de  $X$  pueden tener imágenes no abiertas de  $Y$ .

Ejemplo:

1. Consideremos la aplicación que transforma el intervalo  $[0, 1]$  en la circunferencia unidad de  $\mathbb{R}^2$  definida como:

$$\begin{aligned} f : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ t &\longmapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \end{aligned}$$

que geométricamente es:



Figura 3.3: La topología imagen directa es la usual en  $\mathbb{S}^1$

2. Tenemos:

$$f : R = [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow C \subset \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1 \\ (s, t) \mapsto (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s, t).$$

que geométricamente es:




Figura 3.4: Analizando los abiertos saturados y no saturados se concluye que la topología imagen directa es la usual en el tronco del cilindro.

### Definición (Relación de inyectividad)

Llamamos **relación de inyectividad** a aquella relación de equivalencia que viene dada por una función  $f$  tal que dos elementos están relacionados si comparten imagen:

$$x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$$

### Definición (Proyección canónica)

Llamamos **proyección canónica** respecto de una relación de equivalencia a la aplicación:

$$p : X \rightarrow X_{/\sim} \\ x \mapsto [x]$$

donde  $[x]$  es la clase de equivalencia de  $x$ .

Con esto vemos que dentro de las identificaciones tenemos el caso particular del cociente:

$$p : (X, \mathcal{T}) \rightarrow X_{/\sim}.$$

Con esto definimos:

### Definición (Topología cociente)

Llamamos **topología cociente** a:

$$\mathcal{T}_{/\sim} := \left\{ U \subset X_{/\sim} : p^{-1}(U) \in \mathcal{T} \right\}$$

que viene a ser la topología imagen directa por  $p$ .

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}) & \xrightarrow{f} & (Y, f(\mathcal{T})) \\ p \downarrow & \nearrow \bar{f} = f \circ p^{-1} & \downarrow \\ (X_{/\sim}, p(\mathcal{T})) & & [x] \end{array} \quad \begin{array}{ccc} x \longmapsto f(x) & & \\ \downarrow & \nearrow & \\ [x] & & \end{array}$$

Figura 3.5: Representación de la composición del cociente

Observación:

La relación de equivalencia que vamos a usar es la que viene dada por la relación de inyectividad respecto de  $f$ . Por esta razón,  $\bar{f}$  será una biyección.

Demostración:

Sea  $z \in Y$  como  $f$  es suprayectiva  $\exists x \in X : f(x) = z$ . A su vez,  $y \in [x] \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Rightarrow \bar{f}([x]) = z$ . Con esto,  $\bar{f}$  es sobreyectiva y bien definida.

Sean ahora  $[x], [y] \in X_{/\sim}$  tal que  $\bar{f}[x] = \bar{f}[y] \Rightarrow f(x) = f(y) \Rightarrow [x] = [y]$ . Por tanto, también es inyectiva.

### Proposición

1.  $\exists \bar{f} \Leftrightarrow x \sim y \Rightarrow f(x) \sim f(y)$
2.  $\exists \bar{f} : \bar{f} \text{ continua} \Leftrightarrow f \text{ continua.}$
3.  $\exists \bar{f} : \bar{f} \begin{cases} \text{sobre.} \\ \text{iny. 1-1} \end{cases} \Leftrightarrow f \begin{cases} \text{sobre.} \\ x \sim y \Leftrightarrow f(x) \sim f(y) \end{cases}$
4.  $\bar{f} \text{ homeomorfa} \Leftrightarrow f \text{ identificación.}$

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}) & \xrightarrow[\text{ident.}]{} & (Y, \mathcal{T}') \\ p \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ (X_{/\sim}, \bar{\mathcal{T}}) & & \end{array}$$

homeo.

Figura 3.6: Relación entre el cociente y una identificación.

Demostración:

1. Por la definición de  $\sim$  y de  $\bar{f}$ .
2. Sea  $\bar{f}$  continua. Tomemos  $U \in \mathcal{T}' \Rightarrow \bar{f}^{-1}U \in \bar{\mathcal{T}}$ . Como  $p$  es continua por definición de  $\bar{\mathcal{T}}$ ,  $f^{-1}U = p^{-1}\bar{f}^{-1}U \in \mathcal{T}$ . Por lo que  $f$  es continua.  
Sea ahora  $f$  continua. Tomemos  $U \in \mathcal{T}' \Rightarrow W = f^{-1}U \in \mathcal{T}$ . Al ser  $p$  sobreyectiva  $W = p^{-1}pW$ , es decir, que  $pW \in \bar{\mathcal{T}}$  (ya que  $p^{-1}(pW) \in \mathcal{T}$  y la definición de  $\bar{\mathcal{T}}$ ).
3. (Anterior observación) Si  $\bar{f}$  es inyectiva  $1-1 \Rightarrow \underbrace{\bar{f}[x] = \bar{f}[y]}_{\Leftrightarrow f(x) \sim f(y)} \Rightarrow \underbrace{[x] = [y]}_{\Leftrightarrow x \sim y}$

Política general:

Los cocientes son cómodos para definir espacios, las identificaciones son mejores para estudiar las propiedades que tenemos. Conviene pues tener triángulos como el anterior (3.6).

Se puede contemplar  $Y$  como un modelo del cociente. Es decir, utilizamos la identificación como “modelo teórico” y el cociente como “modelo geométrico”. Esto no siempre será posible ya que dependerá de ciertas propiedades geométricas que veremos.

Ejemplo: (Anteriores)

- Circunferencia y el cilindro como cocientes:

$$\begin{array}{ccc} [0, 1] & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2 \\ p \downarrow & \nearrow \text{cont.} & \downarrow \\ [0, 1] & \diagup \!\! \diagup & \\ & 0 \equiv 1 & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} [0, 1] \times [0, 1] & \longrightarrow & C \subset \mathbb{R}^3 \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ [0, 1] \times [0, 1] & \diagup \!\! \diagup & \\ & (0, t) \equiv (1, t) & \end{array}$$


Figura 3.7: En el primero tomamos un segmento de longitud 1 y “pegamos” los extremos, lo que nos da una figura equivalente a un circunferencia. En el segundo, tomamos un rectángulo de área 1 y “pegamos” el lado izquierdo con el derecho directamente.

Para la circunferencia tenemos:

$$X_{/\sim} = \{\{t\} : 0 < t < 1, \{0, 1\}\}$$

la biyección entre el cociente y la esfera se da por el punto (3) de la anterior proposición y la continuidad por (2). Por último, la identificación se da por el anterior ejemplo.

- Para representar cocientes se utilizan dibujos que indican las identificaciones en los espacios de partida:



## PRODUCTOS FINITOS

El objetivo de esta construcción es, dado un producto cartesiano  $Y := X_1 \times \cdots \times X_r$ , generar una topología que garantice la continuidad de las aplicaciones  $p_i : Y \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$  al ser equipada sobre

el mismo, es decir, que haga continuas las proyecciones sobre cada factor. Inmediatamente uno repara en que la discreta sobre  $Y$  cumple los requisitos. Sin embargo, el interés está en saber cuál es la topología menos fina que hace las  $p_i$  continuas.

Tal y como venimos haciendo en las construcciones anteriores, vamos a tratar de introducir lo mínimo indispensable para verificar la continuidad. En primer lugar, como las preimágenes de abiertos deben ser abiertos, entonces  $\forall U_i \in \mathcal{T}_i : p_i^{-1}U_i = X_1 \times \dots \times U_i \times \dots \times X_r$  debe ser un abierto. Como para que pueda ser topología la intersección finita de abiertos tiene que ser abierto, sabemos que  $\bigcap_{i=1}^r p_i^{-1}U_i = U_1 \times \dots \times U_r$  debe ser abierto, pero a diferencia de como venía ocurriendo en las construcciones anteriores no podemos decir aún que sea topología porque las uniones arbitrarias no funcionan bien (las uniones de productos no tienen por qué ser producto).

Sin embargo, se puede demostrar sin demasiada dificultad que el conjunto  $\{U_1 \times \dots \times U_r : U_i \in \mathcal{T}_i\}$  caracteriza una topología en  $Y$  de la que es base de abiertos y, de esta manera, ahora sí tenemos determinada de modo único la topología buscada.

### Definición (Topología Producto)

Sea  $Y := X_1 \times \dots \times X_n$  un producto cartesiano de espacios topológicos y  $p_i : Y \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$  las proyecciones sobre cada uno de sus factores, definimos la **topología producto**  $\prod_{i=1}^n \mathcal{T}_i$  como aquella determinada por la base de abiertos:

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times \dots \times U_r : U_i \in \mathcal{T}_i\}$$

### Ejemplo:

Si consideramos  $\mathcal{T}_u$  en  $\mathbb{R}^n$  es automático ver el resultado anterior. Una base de abiertos de la topología son las “bolas cuadradas” y estas son productos cartesianos de intervalos de  $\mathbb{R}$  con la  $\mathcal{T}_u$ .

### Teorema (Propiedad universal de la topología producto)

Sea  $g : (Z, \mathcal{T}'') \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$  y  $p_i : (Y, \mathcal{T}') \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$ :

$$\begin{array}{ccc} (Y, \mathcal{T}') & \xrightarrow{p_i} & (X_i, \mathcal{T}_i) \\ g = (g_1, \dots, g_r) \downarrow & \nearrow g_i = p_i \circ g & \\ (Z, \mathcal{T}'') & & \end{array}$$

Figura 3.8: Ilustración de la composición propuesta

entonces  $\mathcal{T}' = \prod_{i=1}^r \mathcal{T}_i$  si y sólo si:

$$g \text{ cont.} \Leftrightarrow \forall g_i \text{ cont.}$$

### Demostración:

$$\Rightarrow) \mathcal{T}' = \prod_{i=1}^r \mathcal{T}_i :$$

- $g$  cont. implica que  $g_i$  cont. porque  $g_i = p_i \circ g$  y  $p_i$  es continua si la topología es la producto.

- $g_i$  cont. implica que  $g_i^{-1}(U_i) = \overbrace{g_1^{-1}(U_1)}^{\in \mathcal{T}''} \cap \dots \cap \overbrace{g_r^{-1}(U_r)}^{\in \mathcal{T}''} \in \mathcal{T}''$  y como esto es una intersección finita de abiertos, es abierto.

$$\Leftarrow) \text{ Para demostrarlo, vamos a ver el doble contenido de } \mathcal{T}' = \prod_{i=1}^r \mathcal{T}_i :$$

Como la propiedad de caracterización se cumple para cualquier función  $g$  que escogamos, podemos elegir la identidad de modo que:

$$\begin{array}{ccc}
 (Y, \mathcal{T}') & \xrightarrow{p_i} & (X_i, \mathcal{T}_i) \\
 id \text{ cont.} \uparrow & \nearrow p_i \circ id = p_i & \\
 (Y, \mathcal{T}') & &
 \end{array}$$

La continuidad de  $id$  nos asegura la continuidad de  $g_i = p_i \circ id = p_i$ . Como tenemos que  $p_i$  es continua y  $\prod \mathcal{T}_i$  es la topología menos fina que verifica esto, entonces  $\prod \mathcal{T}_i \subset \mathcal{T}'$ .

Para ver el otro contenido, elegimos de nuevo la identidad, pero esta vez la identidad mera-mente conjuntista:

$$\begin{array}{ccc}
 (Y, \mathcal{T}') & \xrightarrow{p_i} & (X_i, \mathcal{T}_i) \\
 id \uparrow & \nearrow p_i \circ id = p_i \text{ cont.} & \\
 (Y, \prod \mathcal{T}_i) & &
 \end{array}$$

En este caso, sabemos que  $g_i = p_i \circ id = p_i$  es continua porque  $p_i$  lo es por construcción. Esto quiere decir que la identidad conjuntista  $id$  es continua, es decir,  $\forall U \in \mathcal{T}' : id^{-1}U = U \in \prod \mathcal{T}_i$ . Por tanto, tenemos que  $\mathcal{T}' \subset \prod \mathcal{T}_i$ .

### Ejemplo:

La  $\mathcal{T}_{\text{rad}}$  no es producto.

### Demostración:

Tomamos un abierto y veamos que no es producto.




Figura 3.9: La topología radial no es producto de topologías.




Figura 3.10: La topología radial no es producto de topologías.




Figura 3.11: La topología radial no es producto de topologías.

Supongamos que sí:  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \text{arco } \ni (0,0) \Rightarrow U_1 \times U_2 \subset U$  y  $(0,0) \in U_1 \times U_2 \subset \mathcal{T}_{\text{rad}}$ . Tomando  $x_1 \in U_1$  y vemos  $x = x_1 \cap r$  con  $r$  línea vertical por  $x_1$  con esto  $y_1 = x \cap l$  con  $l$  línea horizontal por  $x$  no pertenece a  $U$  (de lo contrario el producto  $y_1$  con  $x_1 = x$  pertenecería). Por tanto,  $I_k = [(0, y_k), (x_k, y_k)]$  no tiene ningún punto en  $U_1 \times U_2$ . Haciendo converger  $I_k$  hacia 0 para cualquier recta por 0 tendremos un  $I_k$  que tenga intersección con la recta, es decir, la recta tendrá un punto que no pertenezca al abierto y  $U$  no sería abierto ¡!

Con esto,  $\nexists x_k \rightarrow 0 \Rightarrow$  habrá un intervalo  $(0, \varepsilon)$  en el eje  $x$  que no pertenece a  $U_1$  y tendremos un “vacío” que de nuevo incumple que  $U$  es abierto.

### Proposición

1. Las proyecciones  $p_i : Y \rightarrow X_i$  sobre los factores del producto son aplicaciones abiertas.
2. La aplicación natural<sup>1</sup> que sumerge un factor en el producto

$$\begin{aligned}\alpha_j : X_j &\longrightarrow Y \\ x_j &\longmapsto (a_1, \dots, x_j, \dots, a_r)\end{aligned}$$

es una inmersión que llamamos aplicación parcial.

Demostración:

1. Nos vale con probarlo para una base:  $p_i(U_1 \times \dots \times U_r) = U_i$
2. Trivialmente es inyectiva y continua. Por último,  $X_i \rightarrow j(X_i)$  es homeomorfismo, es decir, es abierta porque:

$$\begin{cases} \alpha_j(X_j) = \{a_1\} \times \dots \times X_j \times \dots \times \{a_r\} \\ \alpha_j(U_j) = \{a_1\} \times \dots \times U_j \times \dots \times \{a_r\} = \alpha_j(X_j) \cap (X_1 \times \dots \times U_j \times \dots \times X_r) \end{cases}$$

que es abierto porque estamos restringiendo la topología producto a  $\{a_1\} \times \dots \times X_i \times \dots \times \{a_r\} = \alpha_j(X_j)$ .

---

<sup>1</sup>Obviamente, con los  $a_i$  fijados.

Ejemplo:

Ahora el ejemplo de  $\mathcal{T}_{\text{rad}}$  simplemente es porque si fuese producto, sus elementos deberían ser la usual y el producto de usuales es usual que es distinta de la radial.

Observación: (Política general)

En una topología producto todo “se genera en productos”.

Ejemplo:

- Bases de entornos:  $\mathcal{V}^a = \mathcal{V}^{a_1} \times \dots \times \mathcal{V}^{a_r} \stackrel{\text{mut}??}{=} \{V_1 \times \dots \times V_r : V_i \in \mathcal{V}^{a_i}\} (a \in Y).$
- Base de abiertos:  $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \times \dots \times \mathcal{B}_r = \{B_1 \times \dots \times B_r : B_i \in \mathcal{B}_i\}$  (esto repite la construcción de  $\prod_i \mathcal{T}_i$ )

## SUMAS FINITAS

El objetivo de esta construcción es, dada una unión<sup>2</sup>  $Y := X_1 + \dots + X_r := X_1 \times \{1\} \cup \dots \cup X_n \times \{n\}$ , generar una topología que garantice la continuidad de las aplicaciones  $j_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \rightarrow Y$  al ser equipada sobre el mismo, es decir, que haga continua la suma desde cada sumando. Inmediatamente uno repará en que la trivial sobre  $Y$  cumple los requisitos. Sin embargo, el interés está en saber cuál es la topología más fina que hace las  $j_i$  continuas.

De nuevo, vamos a tratar de introducir todo lo posible sin violar la condición de continuidad como abierto en la topología. En primer lugar, nos damos cuenta de que cualquier abierto  $U_i \in \mathcal{T}_i$  de una de las topologías concretas es preimagen  $j_i^{-1}(U_i \times \{i\})$ , luego si estos son abiertos respetan la definición de continuidad. Como son los únicos sobre los manejamos algo que podamos utilizar, la idea es proponer como base de la topología suma  $\mathcal{T}_1 + \dots + \mathcal{T}_n$  el conjunto  $B := \{U_1 \times \{1\}, \dots, U_n \times \{n\} : U_i \in \mathcal{T}_i\}$ .

### Definición (Topología Suma)

Sea  $Y := X_1 + \dots + X_r := X_1 \times \{1\} \cup \dots \cup X_n \times \{n\}$  la unión de espacios topológicos  $(X_i, \mathcal{T}_i)$  y  $j_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \rightarrow Y$  la inclusión de cada sumando en el total, definimos la **topología suma**  $\sum_{i=1}^k \mathcal{T}_i$  como aquella determinada por base de abiertos:

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times \{1\}, \dots, U_r \times \{r\} : U_i \in \mathcal{T}_i\}$$

Observación:

Por como se ha definido la topología, es trivial ver que cada sumando  $X_i \times \{i\}$  es abierto en la topología suma  $\sum_{i=1}^r \mathcal{T}_i$ . Pero es que además también son cerrados, pues su complementario  $Y \setminus (X_i \times \{i\}) = \bigcup_{j \neq i} (X_j \times \{j\})$  es unión de abiertos, es decir, abierto.

### Proposición

Con la anterior definición sabemos que

$$j_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \rightarrow (X_i \times \{i\}, \mathcal{T}|_{X_i \times \{i\}}), \forall i \in \{1, \dots, r\}$$

es inmersión abierta y cerrada.

Demostración:

Para probar que es inmersión hay que probar que la aplicación anterior es un homeomorfismo. Para empezar, por construcción, la aplicación es continua y además biyectiva, pues manda el conjunto a sí mismo conjuntistamente hablando. Ahora basta probar que es abierta y cerrada:

<sup>2</sup>Los índices  $i$  de las expresiones  $X_i \times \{i\}$  se utilizan para poder utilizar el mismo conjunto como dos sumandos distintos y diferenciarlos entre sí (pues de otra manera la unión de ambos sería solo uno de ellos).

- Abierta:  $j_i(U_i) = U_i \times \{i\} \in \mathcal{T}$
- Cerrada:  $Y \setminus j_i(U_i) = Y \setminus U_i$  que es cerrado en  $\sum \mathcal{T}_i$ .

### Teorema (Caracterización topología suma)

Sea  $g : (Y, \mathcal{T}') \rightarrow (Z, \mathcal{T}'')$  y  $j_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$ :

$$\begin{array}{ccc} (X_i, \mathcal{T}_i) & \xrightarrow{j_i} & (Y, \mathcal{T}') \\ g|_{X_i} = g \circ j_i & \searrow & \downarrow g \\ & & (Z, \mathcal{T}'') \end{array}$$

Figura 3.12: Ilustración de la composición propuesta

entonces  $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_1 + \dots + \mathcal{T}_r$  si y sólo si:

$$g \text{ cont.} \Leftrightarrow \forall g_i \text{ cont.}$$

### Demostración:

Análoga a las anteriores construcciones.

### Política general:

Localmente  $Y = X_1 + \dots + X_r$  es como sea cada  $X_i$ . Por ejemplo, las bases de entornos de  $Y$  son las de los sumandos. Globalmente, se trata cada sumando separadamente. Por ejemplo, las bases de abiertos de los sumandos se unen para dar una base de abiertos de  $Y$ . Olvidando el tecnicismo  $X_i \times \{i\} \equiv X_i$ :

$Y$  es unión disjunta de los sumandos  
Los sumando son subespacios abiertos y cerrados de  $Y$

Es un formalismo para hacer cómodamente otras construcciones. Por ejemplo, “pegar dos discos por sus bordes” sería:

$$\text{Disco } D \subset \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, \text{ borde } \partial D = \mathbb{S}^1 : x^2 + y^2 = 1$$

$$D_1 + D_2 / \sim \quad \overbrace{(p, 1)}^{\epsilon_{\partial D}} \sim (p, 2).$$




Figura 3.13: *Dos discos*

y más elaborado  $h : \partial D \xrightarrow{\text{homeo.}} \partial D$  con  $\overset{\in \partial D}{p} \sim h(p)$ .

Finalmente, hay otros conceptos de “suma” más significativos que veremos en algún ejemplo.

## ESPACIOS PROYECTIVOS REALES

### Geometría lineal

En primer lugar, veamos un repaso de lo visto en geometría lineal sobre espacios proyectivos.

#### **Definición (Espacio proyectivo real)**

Usando  $\sim$ , proporcionalidad:

$$\mathbb{R}P^n = \mathbb{P}^n = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim \Rightarrow \mathbb{P}^n = \{\text{rectas vectoriales de } \mathbb{R}^{n+1}\}$$

Que en coordenadas es:

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} &\rightarrow \mathbb{P}^n \\ (x_0, \dots, x_n) &\mapsto (x_0 : \dots : x_n). \end{aligned}$$

Observación:

Las ecuaciones serán de la forma:  $h \in \mathbb{R}[x_0, \dots, x_n]$  homogénea  $\Rightarrow \begin{cases} h(x) = 0 \\ h(x) \neq 0 \end{cases}$  está bien definido en  $\mathbb{P}^n$ . Sabemos que el grado de la ecuación homogénea  $h$  nos dará lugar a:

- Grado 1: Variedades proyectivas lineales.
- Grado 2: Cuádricas proyectivas.
- Grado arbitrario: Variedades proyectivas algebraicas.

### Definición (Cartas afines)

Sea  $H \subset \mathbb{P}^n$  un hiperplano proyectivo. Entonces, tenemos un hiperplano lineal  $\hat{H} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , con una forma lineal asociada  $h = 0$ , de la siguiente forma:

$$H = \hat{H} \setminus \{0\} / \sim$$

Decimos que  $H$  es **hiperplano del infinito** de la **carta afín**  $U = \mathbb{P}^n \setminus H$ .

---

### Proposición

La aplicación

$$\pi| : \underbrace{\{h = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}_{\text{Hiperplano afín}} \rightarrow \underbrace{\mathbb{P}^n \setminus H}_{\{h \neq 0\}} = U$$

es una biyección.

### Topología de espacio proyectivos

Para la topología en  $U$  usaremos la imagen directa de la usual en  $\{h = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$

### Proposición

Con la anterior suposición tenemos que la aplicación:

$$\pi| : \{h = 1\} \rightarrow U$$

es un homeomorfismo.

Demostración:

Ya sabemos que es biyección por lo que queda ver que es continua y abierta/cerrada. Continua lo será por tener  $U$  la topología imagen directa. Y abierta porque???

### Proposición

La siguiente definición es topología en  $\mathbb{P}^n$ :

$$W \text{ abierto si } W \cap U \text{ es abierto } \forall U \text{ carta afín.}$$

Demostración:

Ni idea

### Proposición (Topología en $\mathbb{P}^n$ )

- Cociente de la usual vía  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \xrightarrow{\pi} \mathbb{P}^n : (x_0, \dots, x_n) \mapsto (x_0 : \dots : x_n)$
- “Suma” de las definidas en las cartas afines:

$$W \text{ abierto si } W \cap U \text{ es abierto } \forall U \text{ carta afín.}$$

Estas dos topologías coinciden.

Demostración:

1.  $U$  es abierto en la topología cociente ya que  $\pi^{-1}U = \{h \neq 0\}$  es abierto usual.

2. La topología cociente en  $U$  coincide con la topología de carta afín:

$$\begin{array}{ccc}
 W \subset U : \pi^{-1}W = \text{cono sobre } \underbrace{(\pi^{-1}W) \cap \{h=1\}}_{=(\pi|_{\{h=1\}})^{-1}W} & & \text{para la top.} \\
 \xrightarrow{\text{para la top.}} & \downarrow & \leftarrow \text{de carta afín} \\
 \pi^{-1}W \stackrel{\text{ab.}}{\subset} \mathbb{R}^{n+1} \Leftrightarrow (\pi|_{\{h=1\}})^{-1}W \stackrel{\text{ab.}}{\subset} \{h=1\} & & \\
 \uparrow \quad \downarrow & & \uparrow \quad \downarrow \\
 W \text{ abierto} & & W \text{ abierto} \\
 \text{top. cociente} & & \text{top. carta} \\
 & & \text{afín}
 \end{array}$$

Figura 3.14: Equivalencia entre las topologías cociente y suma.

1. + 2.  $\Rightarrow$  La top. cociente está generada por las topologías de las cartas afines, que forman un recubrimiento abierto de  $\mathbb{P}^n$ .

### Proposición

En este caso, la  $\mathcal{T}_{\text{cociente}}$  tendrá como base:  $\left\{ \pi(B) \subset U : B \stackrel{\text{ab.}}{\subset} \{h=1\}, h \in \mathbb{P}[x_0, \dots, x_n] \right\}$  homogéneo de grado 1:  $G = \bigcup_U G \cap U$  abierto en  $\mathbb{P}^n$  y abierto en  $U$ .

Observación:

En  $U_1 \cap U_2$  la topología definida por  $\pi_1 =$  definida por  $\pi_2$ .

Observación:

De lo anterior deducimos:

1.  $U_1, U_2$  dos cartas afines  $\Rightarrow U_1 \cap U_2$  abiertos.

Demostración:

Cartas afines:  $U_i = \{h_1 \neq 0\} \left\{ \begin{array}{l} \pi| : \{h_1 = 1\} \rightarrow U_1 \text{ homeo.} \\ (\pi_1)^{-1}(U_1 \cap U_2) = \{h_1 = 1, h_2 \neq 0\} \stackrel{\text{ab.}}{\subset} \{h_1 = 1\} \end{array} \right.$

2. Las topologías de  $U_1$  y  $U_2$  coinciden en  $U_1 \cap U_2$ .

Demostración:

De nuevo conviene entenderlo con cartas:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}^{n+1} \supset \{h_1 = 1, h_2 \neq 0\} & \xrightarrow{\text{homeo. para } U_1} & x = y/h_1(y) \\
 \uparrow \text{homeo?} & \searrow & \uparrow \text{homeos usuales} \\
 \mathbb{R}^{n+1} \supset \{h_1 \neq 0, h_2 = 1\} & \xrightarrow{\text{homeo. para } U_2} & y = x/h_2(x)
 \end{array}$$

### Definición (Atlas afín canónico)

No se suelen utilizar todas las cartas afines:  $n+1$  distintas ya cubren  $\mathbb{P}^n$ . Típicamente  $\mathbb{P}^n = U_0 \cup \dots \cup U_n$  con:

$$U_i = \{x_i \neq 0\} \leftrightarrow \underbrace{\{x_i = 1\}}_{\equiv \mathbb{R}^n} : (x_0 : \dots : x_i : \dots : x_n) \mapsto \left( \frac{x_0}{x_i}, \dots, \underbrace{1}_{\mathbb{R}^n \rightarrow}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right), 0 \leq i \leq n$$

---

### Proposición (Cociente antipodal)

Toda recta de  $\mathbb{R}^{n+1}$  corta a  $\mathbb{S}^n : x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1$  en dos puntos antipodales, así que denotamos un “sub” cociente, que es también identificación.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \supset & \mathbb{S}^n \\ \downarrow & \swarrow \pi| & \\ \mathbb{R}^n & & \end{array}$$


Figura 3.15: *Cociente antipodal de  $\mathbb{S}^n$*

#### Demostración:

Como antes tenemos conos:  $\pi^{-1}W = \text{cono sobre } \underbrace{\mathbb{S}^n \cap \pi^{-1}W}_{=(\pi/\mathbb{S}^n)^{-1}W}$ .

#### Observación:

Las cartas afines tienen una representación muy conveniente:



$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}^n \setminus \{0\} & & \\
 \downarrow & \curvearrowleft & \curvearrowright \text{Homeomorfismo antipodal} \\
 \mathbb{P}^n & \supset U & \curvearrowright \text{Homeomorfismo} \\
 & & \curvearrowright S_+ \wedge S_- \\
 & & \curvearrowleft \text{Homeomorfismo local}
 \end{array}$$

$\forall x \in \mathbb{P}^n, \exists H \not\ni x \implies x \in U$

Figura 3.16: Representación cartas afines.

### Proposición (Cociente de un disco)

Consideremos un disco:

$$E = \{h = 0, x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1\} = \partial \begin{cases} \bar{S}_+ = \mathbb{S}^n \cap \{h \geq 0\} \text{ hemisferio cerrado.} \\ D^n = \{h = 0, x_0^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\} \text{ disco.} \end{cases}$$





Figura 3.17:  $\mathbb{R}^n$  se obtiene identificando puntos antipodales del borde de un disco.

Ejemplo:

$\mathbb{P}^2 \setminus D^2$  = banda de Möbius.



$$\begin{aligned}\mathbb{P}^2 &= M \cup (D_1 \cup D_2) / \sim_{\text{antipodal en el borde}} \\ &= M / \sim \cup D_1 + D_2 / \sim_{\text{(uniones disjuntas)}} \\ &\quad \uparrow \quad \uparrow \\ &\text{banda} \quad \text{disco} \\ &\text{de Möbius}\end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M / \sim = \text{banda de Möbius} \\ D_1 \cup D_2 / \sim = \dots = \dots = \dots = \dots = \text{disco} \end{array} \right.$$

$a = -a$ 
 $b = -b$ 
 $\alpha = -\alpha$



# SEPARACIÓN

---

## CONCEPTO

En este apartado vamos a estudiar la noción de separación en profundidad. Veremos que propiedades tienen los espacios que poseen esta característica y qué consecuencias tiene tenerla sobre el resto de la topología del mismo.

### Definición (Espacio Hausdorff o $T_2$ )

*Sea  $X$  un espacio topológico, decimos que es **Hausdorff** o  $T_2$  si y sólo si para todo par de puntos distintos  $x, y \in X$  existen algunos entornos de cada uno disjuntos entre sí.*

---

Hay otras formas de separación, más débiles o más fuertes, pero nos contentaremos con ésta al ser la más intuitiva.

### Proposición

*Sea  $X$  un espacio topológico, si es Hausdorff podemos encontrar dichos entornos abiertos y disjuntos.*

#### Demostración:

Para cada entorno  $V \subset^{\text{ent.}} X$ , por ser entorno, existe  $U \subset^{\text{ab.}} X$  y  $U \subset V$  que también es entorno. Escogiendo a esos dos abiertos (uno en cada entorno) siguen siendo disjuntos y cumplen la definición de  $T_2$ .

### Proposición

*Sea  $X$  un espacio topológico Hausdorff, entonces los puntos son cerrados.*

#### Demostración:

Para cualquier  $x \in X$  y cualquier  $y \in X \setminus \{x\}$ , por ser Hausdorff, existe un entorno abierto  $U^y \not\ni x$ . Por tanto, podemos escribir el complementario de  $\{x\}$  como la unión de todos esos entornos para los puntos que no son  $x$ , es decir,  $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} U^y$  y como el complementario es unión de abiertos,  $\{x\}$  es cerrado.

#### Observación:

1. Un espacio topológico con la topología de los complementarios finitos ( $X, \mathcal{T}_{\text{CF}}$ ) no es Hausdorff y, sin embargo, tiene puntos cerrados.

No es Hausdorff porque, si  $X$  es infinito, dos abiertos cualesquiera se cortan ya que si cogemos dos abiertos  $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\text{CF}}$ , como sus complementarios  $X \setminus U_1$  y  $X \setminus U_2$  son finitos y  $X$  es infinito, entonces siempre podremos encontrar un  $x \notin X \setminus U_1 \cup X \setminus U_2$ , es decir, que  $x \in U_1 \cap U_2$ .

2. Si una topología contiene a una topología Hausdorff, entonces también es Hausdorff.

Este es precisamente el caso de la radial  $\mathcal{T}_{\text{rad}}$  que contiene a la usual  $\mathcal{T}_u$ , que es Hausdorff. Que la usual es Hausdorff es sencillo, pues para dos puntos  $x$  e  $y$  distintos basta con escoger  $B(x, \varepsilon)$  y  $B(y, \varepsilon)$  que son disjuntos si tomamos  $\varepsilon < \frac{\|x-y\|}{2}$ . Ahora ver que la radial es Hausdorff es trivial, pues como los abiertos usuales son abiertos radiales podemos coger las mismas bolas como entornos.

3. En la topología del punto  $(X, \mathcal{T}_a)$  el punto clave  $a$  no es cerrado, lo que impide que sea Hausdorff.

Si el punto  $a$  fuera cerrado, el conjunto  $X \setminus \{a\}$  sería abierto, pero en esta topología la definición de abierto es contener al punto  $a$  y precisamente  $X \setminus \{a\}$  no lo contiene por definición.

### Proposición

*Sean  $f, g : X \rightarrow Y$  dos funciones continuas e  $Y$  un espacio topológico Hausdorff, entonces el conjunto de puntos donde coinciden:*

$$\{f = g\} = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$$

*es un conjunto cerrado.*

#### Demostración:

Para demostrar que nuestro conjunto es cerrado habrá que demostrar que el complementario es abierto, es decir, que si un punto cumple  $f(x) \neq g(x)$  entonces habrá un entorno suyo cuyos puntos también verificarán  $f(y) \neq g(y)$ . Con esto, tendremos que  $\{f \neq g\}$  es entorno de todos sus puntos y, por tanto, abierto.

Si  $f(x) \neq g(x)$ , entonces por ser  $T_2$ ,  $\exists V^{f(x)} \cap V^{g(x)} = \emptyset$ . Como la aplicación  $f$  es continua, entonces  $f^{-1}V^{f(x)}$  y  $g^{-1}V^{g(x)}$  son entornos de  $x$  y, por tanto, su intersección  $f^{-1}V^{f(x)} \cap g^{-1}V^{g(x)} = W^x$  es también entorno de  $x$  (y es no vacío porque  $x$  pertenece a él).

Si observamos ahora la intersección de  $W^x$  con el complementario  $\{f = g\}$ , entonces vemos que:

$$\forall y \in W^x \Rightarrow \begin{cases} f(y) \in V^{f(x)} & V^{f(x)} \cap V^{g(x)} = \emptyset \\ g(y) \in V^{g(x)} & f(y) \neq g(y) \end{cases}$$

es decir, que  $W^x \cap \{f = g\} = \emptyset$ , luego  $W^x \subset \{f \neq g\}$ .

### Corolario (Extensión por continuidad a la adherencia)

*Sean  $f, g : X \rightarrow Y$  dos funciones continuas,  $Y$  un espacio topológico Hausdorff y  $\{f = g\}$  es denso<sup>1</sup>, entonces  $f \equiv g$ .*

#### Demostración:

Si  $f$  y  $g$  coinciden en un subconjunto  $A$ , entonces  $\{f = g\} \supset A$  y como  $\{f = g\}$  es cerrado, entonces  $\{f = g\} \supset \overline{A}$ . Como  $A$  es denso, entonces  $\overline{A} = X$  y esto implica que  $\{f = g\} \supset X$ , es decir, que  $\{f = g\} = X$ .

#### Observación:

Este último resultado es importante, pues nos permite extender con continuidad (y de forma única) una función a su adherencia.

#### Ejemplo: (Importante)

Un caso importante en el que  $Y$  es Hausdorff es:

$$f : X \rightarrow Y = \mathbb{R}$$

---

<sup>1</sup>Esto quiere decir que existe un subconjunto  $A \subset X$  denso donde las funciones coinciden.

Observación:

$f : X \rightarrow Y$  continua con  $Y$  Hausdorff  $\Rightarrow f^{-1}(y)$  cerrado  $\forall y \in Y$ .

Demostración:

Porque los puntos de  $Y$  son cerrados y la preimagen de cerrados por continuidad es cerrada.

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

En este apartado estudiamos como comporta la propiedad definida con respecto a las construcciones del tema Construcciones. Se trata de ver cuándo se conserva, cuándo no y qué hipótesis podemos añadir para que se conserve en los casos que no.

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
$T_2$	$\Rightarrow$	$\times$	$\Leftrightarrow$	$\Leftrightarrow$

Cuadro 4.1: Tabla de comportamiento de la separación.

Demostración:

### 1. Subespacios:

Consideremos un subespacio  $Y \subset X$  de un espacio  $X$  que es Hausdorff. Por ser  $X$  Hausdorff, cualesquiera dos puntos  $y_1, y_2 \in Y$  verifican que  $\exists V^{y_1} \cap V^{y_2} = \emptyset$  donde  $V^{y_1}$  y  $V^{y_2}$  son entornos en  $X$ . Pues si tomamos los correspondientes entornos, pero en la topología relativa a  $Y$ , entonces  $(V^{y_1} \cap Y) \cap (V^{y_2} \cap Y) = \emptyset$  vemos que siguen sin cortarse.

### 2. Cociente:

Para demostrar que no se cumple basta con dar un contraejemplo: consideremos el cociente y los respectivos puntos

$$Y = \mathbb{R}/\mathbb{Q} : \left. \begin{array}{l} y_1 = \mathbb{Q} \in Y \\ y_2 = \sqrt{2} \in Y \end{array} \right\}$$

y veamos que  $\nexists V^{y_1} \cap V^{y_2} = \emptyset$ . Cualquier entorno abierto de  $\sqrt{2}$  contiene racionales (por su densidad en  $\mathbb{R}$ ), por tanto al saturar contiene  $\mathbb{Q}$ . Como todo abierto en el cociente es proyección de un saturado, cualquier abierto contiene al punto gordo  $\mathbb{Q}$  y, en consecuencia, la intersección nunca es disjunta.

### 3. Producto

Veamos que se da la doble implicación, es decir, que  $X$  e  $Y$  son ambos  $T_2$  si y sólo si  $X \times Y$  es  $T_2$ .

$\Rightarrow)$  Tomamos  $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \in X \times Y$ . Esto es posible en dos casos:

- $x_1 \neq x_2$ . Como  $X$  es  $T_2 \Rightarrow \exists V^{x_1} \cap V^{x_2} = \emptyset \Rightarrow (V^{x_1} \times Y) \cap (V^{x_2} \times Y) = \emptyset$
- $y_1 \neq y_2$  podemos hacer lo mismo porque  $Y$  es también  $T_2$ .




Figura 4.1: Separación en el producto gracias a la separación en el factor.

$\Leftarrow)$  Sabemos que  $X \approx X \times \{y_0\} \subset X \times Y$ . Como  $X \times Y$  es  $T_2$  y hemos visto que esta propiedad se hereda por subespacios, entonces  $X \times \{y_0\}$  es  $T_2$  y, por homeomorfismo,  $X$  también.

#### 4. Suma:

Recordemos que se ha definido la suma como la unión disjunta de los sumandos. Esto quiere decir que para cualquier  $x \in X$  el propio  $X$  es entorno de  $x$  y lo mismo ocurre con  $Y$  para sus puntos. Esto quiere decir que  $X = V^x$ ,  $Y = V^y$  y  $V^x \cap V^y = X \cap Y = \emptyset$ . Por tanto, los puntos de distintos conjuntos lo verifican.

Si  $X$  y  $Y$  son ambos  $T_2$ , entonces la suma lo es porque hemos visto que entre conjuntos se cumple y si son  $T_2$  dentro del propio conjunto se cumple también. Pero es que además el recíproco es cierto, pues si se cumple en la suma se debe cumplir en cada uno de los conjuntos.

# NUMERABILIDAD

---

Los axiomas de numerabilidad son definiciones y resultados que describen las buenas propiedades que puede tener una topología si algunos elementos como las bases de entornos, las bases de abiertos, los conjuntos densos, etc. son numerables.

## AXIOMAS

En esta sección presentamos los cuatro principales resultados sobre numerabilidad: 1<sup>er</sup> Axioma, 2<sup>o</sup> Axioma, separable y Lindelöf. Pretendemos desmigajar estos conceptos que muchas veces tomamos como “naturales” porque estamos acostumbrados a trabajar con ellos en  $\mathbb{R}^n$ , pero que de no aparecer dotan de propiedades muy distintas a los espacios topológicos.

### I Axioma

---

#### Definición (1<sup>er</sup> Axioma)

Sea  $X$  un espacio topológico, decimos que es **1<sup>er</sup> Axioma** si y sólo si para cualquier punto  $x \in X$  existe una base  $\mathcal{V}^x$  de entornos numerable.

---

Observación:

Como hemos visto otras veces, de cualquier base de entornos se puede sacar una base de entornos abiertos. De esta manera, si existe una base como la de la definición existe una base  $\mathcal{B}^x = \{U_k = V_k\}_{k=1}^\infty$  numerable de entornos abiertos.

#### Proposición

Sea  $X$  un espacio topológico 1<sup>er</sup> Axioma, entonces existe una base de entornos numerable  $\mathcal{W}^x := \{W_k\}_{k=1}^\infty$ , donde  $W_k := U_1 \cap \dots \cap U_k$ , compuesta por entornos abiertos y encajados.

Demostración:

Como  $X$  es 1<sup>er</sup> Axioma, existe una base numerable de entornos  $\{V_k^x\}_{k=1}^\infty$  compuesta por entornos abiertos. Si tomamos el conjunto de los entornos definidos como:

$$\begin{cases} W_1^x = V_1^x \\ W_2^x = V_1^x \cap V_2^x \\ \vdots \\ W_k^x = \bigcap_{i=1}^k V_i^x \end{cases}$$

entonces tenemos un conjunto de entornos abiertos y encajados, pues  $W_{k+1}^x \subset W_k^x$ , y que conforma una base de entornos.

Ejemplo:

1. La topología usual  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$  es un ejemplo de topología 1<sup>er</sup> Axioma, pues el conjunto  $\mathcal{W}^x = \{B(x, \frac{1}{k}) : k \geq 1\}$  es una base de entornos numerable.
2. Las topologías del punto  $(X, \mathcal{T}_a)$  y discreta  $(X, \mathcal{T}_{\text{discreta}})$  también son ejemplos de topologías 1<sup>er</sup> Axioma.
3. La topología de los complementarios finitos  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{CF}})$  es un ejemplo de las topologías que no son 1<sup>er</sup> Axioma.

Para verlo, supongamos que sí, que existe una base  $\exists \mathcal{W}^x = \{W_k\}_{k \geq 1}$  de abiertos encajados. Como son abiertos, entonces  $W_k = \mathbb{R} \setminus F_k$  donde  $F_k$  es un conjunto finito. De esta manera,  $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} W_k = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$  y es no vacía porque es una unión numerable de puntos (y  $\mathbb{R}$  es una unión no numerable). Por tanto, si escogemos  $y \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} W_k$ , el abierto  $U^x = \mathbb{R} \setminus \{y\}$  es un entorno de  $x \in X$ , pero no contiene a ningón  $W_k$  pues el punto  $y$  no pertenece al conjunto.

4. La topología radial  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{rad}})$  tampoco es 1<sup>er</sup> Axioma.

Para verlo, supongamos que sí, que existe una base numerable  $\{W_k : W_k \ni x_0\}_{k \geq 1}$  de entornos abiertos de un punto  $x_0$ . Denotamos por  $L_k$  a las rectas de pendiente  $\frac{1}{k}$  que pasan por ese mismo  $x_0$ . La intersección  $W_k \cap L_k$  contiene un intervalo  $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$  tal que  $0 < \|x_k - x_0\| < \frac{1}{k}$  del que podemos tomar un  $x_k$  cualquiera. Ya vimos que  $U^{x_0} = \mathbb{R}^2 \setminus \{x_k : k \geq 1\}$  es abierto radial y no contiene ningón  $W_k$  ya que a estos pertenecen los  $x_k$ .

## II Axioma

---

### **Definición (2º Axioma)**

Sea  $X$  un espacio topológico, decimos que es **2º Axioma** si y sólo si existe una base numerable  $\mathcal{B}$  de abiertos.

Ejemplo:

- La topología del punto  $\mathcal{T}_a$  y la discreta  $\mathcal{T}_{\text{discr.}}$  equipadas sobre un conjunto  $X$  no numerable no son 2º Axioma, pues para la del punto la base mínima de abiertos es  $\mathcal{B}_a = \{\{a, x\} : x \in X\}$ , que es no numerable si  $X$  lo es. Por otro lado, en  $\mathcal{T}_{\text{discr.}}$  tenemos como base mínima  $\{\{x\} : x \in X\}$  que no es numerable cuando  $X$  no lo es.
- La topología usual  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$  es 2º Axioma, ya que tenemos como base de abiertos  $\mathcal{B} = \{B(q, \frac{1}{k}) : q \in \mathbb{Q}^n, k \geq 1\}$ .

### **Proposición**

Sea  $X$  un espacio topológico, si es 2º Axioma es 1<sup>er</sup> Axioma.

Demostración:

Sea la base de abiertos que verifica el 2º Axioma  $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k \geq 1}$ , entonces el conjunto  $\mathcal{B}^x = \{B_k : x \in B_k\}$  es base de entornos  $\forall x \in X$  y además, si  $\mathcal{B}$  es numerable, también lo será  $\mathcal{B}^x$ .

Observación:

El recíproco no es cierto, pues tenemos como contraejemplo la topología discreta cuando se equipa sobre un conjunto de puntos  $X$  no numerable.

## Separable

---

### **Definición (Separable)**

Sea  $X$  un espacio topológico, decimos que es **separable** si y sólo si existe un subconjunto  $A \subset X$  numerable y denso.

---

Ejemplo:

- El espacio usual  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$  es separable porque el subconjunto  $\mathbb{Q}^n$  es numerable y denso.
- Cualquier espacio  $(X, \mathcal{T}_{\text{discr.}})$  donde  $X$  no sea numerable, no es separable. Ya que, en caso de serlo, habría un subconjunto  $A \subset X$  tal que  $\bar{A} = X$  y, como en la trivial todo es abierto y cerrado, en particular  $A$  sería cerrado y  $A = \bar{A} = X$ .
- La topología del punto  $\mathcal{T}_a$  sí es separable porque el punto clave  $\{a\}$  es denso y es un conjunto finito.
- En la topología de los complementarios finitos  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{CF}})$  cualquier subconjunto  $A \subset \mathbb{R}$  numerable infinito es denso porque en cualquier entorno de un punto  $x \in X$  hay un abierto  $U^x$  que contiene a  $x$  y, por ser abierto, le faltan un número finito de puntos, luego tiene que tener puntos de  $A$ . De esta manera, por numerable y denso sabemos que el conjunto  $X$  es separable.
- La topología radial  $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\text{rad}})$  también es separable

### **Proposición**

Sea  $X$  un espacio topológico, si es 2º Axioma es separable.

Demostración:

Sea  $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k \geq 1}$  la base de abiertos de la propiedad de ser 2º Axioma, entonces  $A := \{a_k : a_k \in B_k\}_{k \geq 1}$  corta a todo abierto y, por tanto, es denso.

Observación:

Sin embargo, aquí mostramos algunas de las no propiedades que uno puede tener la tentación de creer e intentar demostrar:

1. I Ax. + separable  $\not\Rightarrow$  II Ax.

Contraejemplo:  $(X, \mathcal{T}_a)$ ,  $X$  no numerable.

2. I Ax.  $\not\Rightarrow$  separable.

Contraejemplo: Topología discreta en un espacio no numerable.

3. Separable  $\not\Rightarrow$  I Ax.

Contraejemplo:  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{CF}}) : \overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{R}$ .

## Lindelöf

---

La propiedad de Lindelöf es una forma más débil de compacidad que tiene resultados, si no los mismos, muy parecidos.

---

### **Definición (Lindelöf)**

Sea  $X$  un espacio topológico, decimos que es **Lindelöf** si y sólo si para todo recubrimiento abierto  $X = \bigcup_{i \in I} U_i$  existe un subrecubrimiento  $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_{i_k}$  numerable.

---

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

En este apartado estudiamos como se comportan los axiomas de numerabilidad con respecto a las construcciones del tema Construcciones para ver cuándo se conservan, cuándo se pierden y qué podemos añadir para no perderlas.

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
I Ax.	✓	X abiertos ✓	✓	✓
II Ax.	✓	X abiertos ✓	✓	✓
Separable	X abiertos ✓	✓	✓	✓
Lindelöf	X cerrados ✓	✓	X	✓

Cuadro 5.1: Tabla de comportamiento de la numerabilidad con respecto a las construcciones.

Demostración:

■ Subespacios:

- I Ax. y II Ax. se heredan a subespacios intersecando las bases ambientes que cumplen los axiomas con el subespacio.
- Separable no se hereda en general, por ejemplo, la topología  $(X, \mathcal{T}_a)$  sobre un  $X$  no numerable hace que el subespacio  $X \setminus \{a\}$  tenga la topología discreta y hemos visto que en  $X$  no numerable esta no es separable.  
Sin embargo, si el subespacio es abierto sí se hereda intersecando el conjunto denso con el subespacio.
- Lindelöf no se hereda en general, por ejemplo, tomamos  $Y$  no Lindelöf y el conjunto  $X = Y \cup \{w\}$  que es compacto,  $\mathcal{B}^w = \{X \setminus F : F \subset Y\}$  con  $F$  finito.  
Sin embargo, a subespacios cerrados, como la compacidad, sí se hereda.

■ Cocientes:

- $X = \mathbb{R}_u$  es I y II Axiomas,  $Y = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  no es I.

Demostración:

$\alpha = \mathbb{Z} \in Y, \exists \mathcal{W}^\alpha = \{W_k : k \geq 1\}$  abiertos saturados,  $W_k \supset \mathbb{Z}, \forall k$   
 $(\text{Figura 5.1}) \Rightarrow U = \underbrace{\mathbb{R} \setminus \{\varepsilon_k : k \geq 1\}}_{\text{cerr.}}$  entorno abierto saturado de  $\mathbb{Z}$ ,  $U \not\supset W_k, \forall k$ . Esto último porque  $\varepsilon_k \in W_k$ , pero  $\varepsilon_k \notin \mathbb{R} \setminus \{\varepsilon_k : k \geq 1\}$ .




Figura 5.1: Si  $\varepsilon_k \notin \mathbb{Z}$ , vemos que aunque  $\mathbb{R}_u$  cumple el I y el II axioma, existe un cociente que no.

- Las aplicaciones continuas y abiertas conservan I y II.

Demostración:

La imagen de una base es una base.

- Las aplicaciones continuas conservan la separabilidad

Demostración:

Sabemos que  $f(\overline{A}) \stackrel{\text{cont.}}{\subset} \overline{f(A)}$ . Entonces, si  $\overline{A} = X$ ,  $Y = f(X) = f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \Rightarrow \overline{f(A)} = Y$ .

- Las aplicaciones continuas conservan Lindelöf, pues es un resultado más débil que el de compacidad y para compacidad se cumple.

Estas tres últimas propiedades se pueden aplicar al cociente porque la proyección es una aplicación continua.

#### ■ Productos y Sumas:

- Para productos: producto finito de familias numerables es numerable.
- Para sumas: suma finita de familias numerables es numerable.
- La separabilidad se mantiene porque:  $\overline{A_1 \times A_2} = \overline{A_1} \times \overline{A_2}$ .
- Solo falla Lindelöf:
  - $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,]})$  es Lindelöf (ejercicio no banal).
  - $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{[,]}^2)$  no es Lindelöf: si lo fuera,  $L = \{x + y = 0\} \subset \mathbb{R}^2$  heredaría la propiedad, pero es discreto no numerable. ( $\perp$ )

## SUCESIONES

Cuando en  $\mathbb{R}^n$  usábamos las sucesiones para describir elementos de la topología en realidad estábamos usando, de fondo, otros resultados topológicos que nos permitían hacer esas simplificaciones. Por ello, merece un comentario destacado (sobre todo al final de este capítulo que es el que habilita el poder usar sucesiones) para distinguir cuándo esto es posible y cuándo no.

### Definición (Sucesión y Límite)

Sea  $X$  un espacio topológico, definimos una **sucesión** como una aplicación  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$  que denotamos<sup>1</sup> por  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  y definimos su **límite** como un valor  $x \in X$  que cumple:

$$\forall U^x \subset X, \exists k_0 \in \mathbb{N} : k \geq k_0 \Rightarrow x_k \in U^x$$

---

### Proposición

Sea  $X$  un espacio topológico Hausdorff y  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión convergente, entonces el límite de convergencia es único.

Demostración:

La clave de la demostración es que el ser  $T_2$  nos permite considerar dos entornos disjuntos donde deben estar todos los términos de la sucesión a partir de uno concreto y, como son disjuntos, no pueden estar en ambos entornos simultáneamente. Supongamos que tenemos dos límites de la sucesión  $x \neq y$ , entonces:

$$\exists U^x \cap U^y = \emptyset \Rightarrow \begin{cases} \{x_k : k \geq k_0\} \subset U^x \\ \{x_k : k \geq k_1\} \subset U^y \end{cases} \Rightarrow \forall k \geq \max\{k_0, k_1\} : \{x_k : k \geq k_1\} \subset U^x \cap U^y = \emptyset \Rightarrow \#$$

### Observación:

Cuando en  $\mathbb{R}^n$  utilizábamos sucesiones para describir elementos de la topología tales como la adherencia, la acumulación, etc. en realidad lo que estábamos utilizando es que  $\mathbb{R}^n$  es 1<sup>er</sup> Axioma. El 1<sup>er</sup> Axioma es el elemento topológico que permite describir una la topología vía sucesiones, por ejemplo:

$$x \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists \{x_k\} \subset A : x_k \rightarrow x$$

---

<sup>1</sup>Con esta notación queremos decir que  $x_n = f(n)$ .

$\Rightarrow)$  Supongamos que  $x \in \overline{A}$

$$\left. \begin{array}{l} \exists \mathcal{W}^x = \{W_k^x\}_{k \geq 1} \text{ base ent. encajados} \xrightarrow{x \in \overline{A}} \exists x_k \in W_k \cap A \\ \forall U^x \supset W_{k_0}^x \supset W_{k_0+1}^x \supset \dots \Rightarrow x_k \in U^x, \forall k \geq k_0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_k \rightarrow x$$

$\Leftarrow)$  Supongamos que  $\exists \{x_k\} \subset A : x_k \rightarrow x$ :

$$A \ni x_k \rightarrow x \Rightarrow \forall U^x, \exists x_{k_0} \in U^x \cap A$$

Pero, salvo cuando podamos trabajar en un espacio 1<sup>er</sup> Axioma, en general, los límites de sucesiones son poco útiles para trabajar con la topología.

---

### Enunciado

*Caracterizar la continuidad por sucesiones, si es posible:*

$$f : X \rightarrow Y$$


---

# COMPACIDAD

---

## CONCEPTO Y MANTRAS

---

### Definición (Compacidad)

Un espacio topológico  $X$  decimos que es **compacto** si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones equivalentes:

- De todo recubrimiento abierto se puede extraer un subrecubrimiento finito:

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i \Rightarrow \exists U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_r} = X$$

- Dada una familia de cerrados, si la intersección finita de algunos de ellos es no vacía, entonces la intersección no finita del total es no vacía:

$$\forall F_{i_1} \cap \dots \cap F_{i_r} \neq \emptyset \Rightarrow \bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$$

---

### Ejemplo:

Como estamos más acostumbrados a la primera de las definiciones que se ha dado, vamos a ejemplificar que la 2<sup>a</sup> no se cumple si, por ejemplo, los conjuntos no son cerrados. Para ello, podemos considerar la familia de conjuntos  $\{(0, \frac{1}{n})\}_{n=1}^{\infty}$ . De dicha familia, cualquier cantidad finita tiene intersección no vacía, pero cuando hacemos la intersección arbitraria ésta es vacía.

---

### Definición (Subespacios compactos)

Sea  $X$  un espacio topológico y  $K \subset X$  un subconjunto suyo, decimos que  $K$  es **compacto en  $X$**  si y sólo si

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i \text{ con } U_i \overset{\text{ab.}}{\subset} X \Rightarrow \exists U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_r} \supset K$$

---

### Observación:

La definición anterior es trivialmente equivalente a dar la definición de compacidad del inicio del capítulo, pero considerando  $K$  como espacio topológico con su topología relativa.

### Ejemplo:

1.  $K \subset \mathbb{R}_u^n$  es compacto  $\Leftrightarrow K$  es cerrado y acotado (Heine-Borel).
2.  $[a, b] \subset \mathbb{R}_u$  compacto. ( $\Rightarrow$  Heine-Borel por resultados generales).

3. Si  $X$  es compacto con  $\mathcal{T}_{\text{discr.}}$   $\Rightarrow$  es finito

Demostración:

$X = \bigcup_{x \in X} \{x\}$  es recubrimiento abierto en  $\mathcal{T}_{\text{discreta}}$  y como es compacto  $\exists \bigcup_{i=1}^n \{x_i\} = X$ .

4.  $x_k \rightarrow x \Rightarrow K = \{x, x_k : k \geq 1\}$  es compacto.

Demostración:

Sea  $\{U_i\}_{i \in I}$  tal que,  $\bigcup_{i \in I} U_i = K \Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \exists U_{i_0}^x \ni x \xrightarrow{\text{lím}} x_k \in U_{i_0}, \forall k > k_0 \\ x_k \in U_{i_k}, \forall k \leq k_0 \end{array} \right\} \Rightarrow K \subset U_{i_0} \cup U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_{k_0}}$$

Por ser  $k_0$  finito.

5.  $K \subset \mathbb{R}_u^n$  compacto  $\Leftrightarrow \forall A^\infty \subset K, A' \cap K \neq \emptyset$  (Bolzano-Weierstrass)

### Proposición (Mantra 1)

Sea  $X$  un espacio topológico compacto y  $K$  un subespacio cerrado suyo, entonces es compacto.

$$F \overset{\text{cerr.}}{\subset} X_{\text{compacto}} \Rightarrow F \text{ compacto.}$$

Demostración:

Dado un recubrimiento  $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$  podemos escribir el total en términos de unión de abiertos como  $X = (X \setminus K) \cup \bigcup_{i \in I} U_i$ . Como  $X$  es compacto, de este recubrimiento podemos extraer otro finito, es decir,  $\exists (X \setminus K) \cup U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_r} = X$ . Por ser subespacio  $K \subset X = (X \setminus K) \cup U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_r}$  y como no puede estar contenido en su complementario, entonces está  $K \subset U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_r}$ , es decir, es compacto.

### Proposición (Mantra 2)

Sea  $X$  un espacio topológico compacto y  $A \subset X$  un subconjunto con infinitos puntos, entonces tiene puntos de acumulación en  $X$ .

$$A_\infty \subset X_{\text{compacto}} \Rightarrow A' \neq \emptyset$$

Demostración:

Vimos en su momento que la adherencia puede expresarse como  $\overline{A} = A \cup A'$  y, si  $A' = \emptyset$ , entonces  $\overline{A} = A$  y esto indica que  $A$  es cerrado. Cerrado en compacto hemos visto que es compacto luego  $A$  es compacto.

Pero recordemos también que al adherencia se podía escribir como

$$\overline{A} = \{\text{puntos aislados}\} \sqcup A'$$

es decir, que  $A$  está compuesto únicamente por puntos aislados. Como hemos visto que  $A$  es compacto y sus puntos son aislados, si proponemos como recubrimiento de abiertos los entornos abiertos disjuntos de cada punto (que existen porque son aislados) tiene que existir un subrecubrimiento finito y, como cada punto sólo pertenece a uno de los conjuntos, no se puede prescindir de ninguno, luego el recubrimiento inicial era finito. Esto indica que existe un número finito de puntos aislados, es decir, que  $A$  es finito #.

### Proposición (Mantra 3)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una aplicación continua y  $K \subset X$  un subespacio compacto, entonces  $f(K)$  es compacto en  $Y$ .

Demostración:

$$f(X) \subset \bigcup_i U_i \Rightarrow X = \bigcup_i f^{-1}U_i \Rightarrow \exists f^{-1}U_{i_1} \cup \dots \cup f^{-1}U_{i_r} = X \Rightarrow U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_r} \supset f(X)$$

Ejemplo:

La propiedad de conservación de la compacidad a través de aplicaciones continuas es muy importante porque permite demostrar la compacidad de espacios muy complicados a través de una aplicación continua desde espacios más sencillos. Por ejemplo, el proyectivo real  $\mathbb{RP}^n$  es compacto porque es imagen continua de la esfera  $\mathbb{S}^n$  por la aplicación de la proyección antipodal y la esfera es compacta.

### Proposición (Mantra 4)

Sea  $X$  un espacio topológico  $T_2$  y  $K \subset X$  un subespacio compacto, entonces  $K$  es cerrado.

Demostración:

Vamos a ver que  $X \setminus K$  es abierto probando que es entorno de todos sus puntos, es decir, vamos a probar que  $\forall x \in X \setminus K : \exists U^x \cap K = \emptyset$  (que es lo mismo que  $U^x \subset X \setminus K$ ).

Dado cualquier punto  $x \in X \setminus K$ , para cualquier  $y \in K$  que escogamos se verifica que existen entornos de ambos  $V_y^x$  y  $W^y$  disjuntos, por ser el espacio  $T_2$ . De esta manera, podemos escribir  $K := \bigcup_{y \in K} W^y$  y, como es compacto,  $K := W^{y_1} \cup \dots \cup W^{y_r}$ .

Como buscamos un abierto  $U^x$  que no corte con  $K$  y tenemos definido este en términos de unos entornos finitos (de los que hemos calculado otros homólogos que no cortan con ellos), lo único que es posible hacer es considerar el abierto  $U^x := V_{y_1}^x \cap \dots \cap V_{y_r}^x$  que es disjunto a cualquier  $W^{y_i}$ , es decir, a  $K$ .

Observación:

En un espacio topológico  $T_2$ , los resultados que se aplican a puntos se suelen poder aplicar a compactos. Es sencillo, utilizando el Mantra 4, demostrar que dos compactos disjuntos en un  $T_2$  se separan como puntos.

### Proposición

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función continua,  $X$  compacto e  $Y$  Hausdorff, entonces  $f$  es cerrada.

Demostración:

Si escogemos un cerrado  $F \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$ , entonces por ser  $X$  compacto,  $F$  es compacto. Como la aplicación es continua  $f(F)$  es compacto en  $Y$  y, por ser  $T_2$ , es cerrado en  $Y$ . Por tanto, hemos demostrado que la aplicación es cerrada.

### Corolario

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función continua,  $X$  compacto e  $Y$  Hausdorff, si añadimos las siguientes hipótesis:

$$\begin{cases} \text{inyectiva} \\ \text{sobreinyectiva} \\ \text{biyectiva} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{inmersión cerrada} \\ \text{identificación cerrada} \\ \text{homeomorfismo} \end{cases}$$

se tienen los anteriores resultados.

Demostración:

Por las caracterizaciones que hicimos en el tema de Construcciones.

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

En este apartado estudiamos como se comporta la compacidad con respecto a las construcciones del tema Construcciones para ver cuándo se conservan, cuándo se pierden y qué podemos añadir para no perderlas.

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
Compacidad	✗ cerrados ✓	✓	✓	✓
Demostración:	Mantra 1	Mantra 3	Tychonoff	Unión finita

Cuadro 6.1: Tabla de comportamiento de la compacidad respecto a las construcciones, con demostración incluida.

### Teorema (de Tychonoff)

*Si  $X$  e  $Y$  son dos compactos  $\Rightarrow X \times Y$  es compacto.*

Demostración:

Sea  $X \times Y = \bigcup_{i \in I} W_i$ ,  $W_i \in \mathcal{T}_X \times \mathcal{T}_Y$ .

1.  $\forall (x, y) \in X \times Y$ ,  $\exists U_y^x \times V_x^y \subset W_i$ ,  $i$  depende de  $(x, y)$ . Por la definición de la topología producto por base de abiertos.
2.  $\forall x \in X$ ,  $Y = \bigcup_{y \in Y} V_x^y \xrightarrow{Y \text{ comp.}} Y = V_x^{y_1} \cup \dots \cup V_x^{y_r}$ , los  $y_k$  y su número,  $r$ , dependen de  $x$ .
3.  $U^x = U_{y_1}^x \cap \dots \cap U_{y_r}^x$ ,  $U^x \times V_x^{y_k} \subset U_{y_k}^x \times V_x^{y_k} \subset W_{i_k}$ ,  $i_k$  depende de  $x$ .
4.  $X = \bigcup_{x \in X} U^x \xrightarrow{X \text{ comp.}} X = U^{x_1} \cup \dots \cup U^{x_s}$ .
5. Veamos que:

$$X \times Y = \bigcup_{\substack{1 \leq l \leq s \\ 1 \leq k \leq r}} U^{x_l} \times V_{x_l}^{y_k} \subset \bigcup_{\substack{1 \leq l \leq s \\ 1 \leq k \leq r}} W_{i_k}, \text{ los } i_k \text{ dependen de los } x_l.$$

Ya que:

- $x \in X \Rightarrow \exists U^{x_l} \ni x$ .
- $y \in Y = V_{x_l}^{y_{l_1}} \cup \dots \cup V_{x_l}^{y_{l_r}} \Rightarrow \exists V_{x_l}^{y_{l_k}} \ni y$

Con lo que tenemos un subrecubrimiento finito a partir de un recubrimiento cualquiera.

Observación:

1.  $X \times Y$  compacto  $\Rightarrow X$  e  $Y$  compactos.

Demostración:

Aplicamos el Mantra 3 para las proyecciones.

2. Heine-Borel:  $K \subset \mathbb{R}_u^n$  cerrado y acotado  $\Rightarrow$  compacto.

Demostración:

Si  $K$  es acotado, pertenece al producto cartesiano de intervalos acotados y si además es cerrado, entonces pertenece a un producto cartesiano de intervalos cerrados y acotados de la forma

$$K \subset [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

Como sabemos que el intervalo  $[0, 1]$  es compacto, por homeomorfismo, los intervalos  $[a, b]$  son compactos. Además, por Tychonov, el producto de ellos también lo es, luego tenemos  $K$  cerrado contenido en un compacto, es decir, compacto.

# COMPACIDAD LOCAL

---

## Definición

Sea  $Y \subset X$ , es **localmente cerrado** si cumple las condiciones equivalentes siguientes:

1.  $\forall y \in Y, \exists V^y \overset{\text{ent.}}{\subset} X : Y \cap V^y \overset{\text{cerr.}}{\subset} V^y$ . ( $\Rightarrow$  lo mismo  $\forall U^y \subset V^y$ )
  2.  $Y$  es abierto en su adherencia  $\Leftrightarrow Y = \overline{Y} \cap U$  con  $U \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ .
  3.  $Y$  es cerrado en un abierto:  $Y = F \cap U$ ,  $F \overset{\text{cerr.}}{\subset} X$ ,  $U \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ . ( $\Rightarrow$  vale  $F = \overline{Y}$ )
- 

Demostración:

- 1.  $\Rightarrow$  2) ¿ $Y = \overline{Y} \cap \left(\bigcup_{y \in Y} U^y\right)$ ?

$\subset$ ) Trivial.

$\supset$ ) Tomamos un elemento  $x$ :

$$x \in \overline{Y} \cap U^y \stackrel{?}{\Rightarrow} x \in \text{Adh}_{U^y}(Y \cap U^y) \stackrel{Y \cap U^y \overset{\text{cerr.}}{\subset} U^y}{=} Y \cap U^y \subset Y$$
$$\forall U^x, U^x \subset U^y \stackrel{*}{\Rightarrow} \emptyset \neq Y \cap U^x = (Y \cap U^y) \cap U^x.$$

Por tanto, gracias a \* demostramos ?.

- 2.  $\Rightarrow$  3)  $Y$  abierto en  $\overline{Y} \Leftrightarrow \underbrace{\overline{Y}}_{=F} \cap U$ .

$$F \cap U = Y \Rightarrow F \supset \overline{Y} \Rightarrow F \cap U = \overline{Y} \cap U.$$

- 3.  $\Rightarrow$  1)  $Y = F \cap U \overset{\text{cerr.}}{\subset} U (= U^y, \forall y)$ .

Esto es un ejemplo de localización de una propiedad topológica  $\mathcal{P}$  (en este caso es ser cerrado). Se puede entender como:

$$\begin{aligned} & \forall x, \exists V^x \text{ que cumple } \mathcal{P} \text{ ó} \\ & \forall x, \exists \mathcal{V}^x \text{ base de entornos que cumplen } \mathcal{P}. \end{aligned}$$

A veces son equivalentes (como en este caso), a veces no. El concepto adecuado de localización es mediante bases de entornos.

# COMPACIDAD LOCAL Y MANTRAS

## Definición

$X$  es **localmente compacto** si  $\forall x \in X, \exists V^x$  base de entornos compactos.

## Ejemplo:

1.  $\mathbb{R}_u^n$  es localmente compactos:  $V^x = \{B[x, \varepsilon] : \varepsilon > 0\}$
2.  $T = B(0, 1) \cup \{p\}$ ,  $T_u$  no es localmente compacto.

### Demostración:

Veamos un conjunto infinito sin acumulación en  $T$ :

$$\begin{aligned} \exists V^p \stackrel{\text{comp.}}{\subset} T \Rightarrow \exists B(0, \varepsilon) \cap T \subset V^p \Rightarrow \exists \overbrace{x_k}^{\in V^p} \rightarrow x_0 \in S(0, 1) \setminus T \\ \Rightarrow \{x_k : k \geq 1\} \subset V^p \subset T. \end{aligned}$$




Figura 7.1: Visualización de un conjunto que no es localmente compacto en la topología usual de  $\mathbb{R}^2$ .

3. En general NO basta que exista un entorno compacto.

En  $S = T \sqcup \{q\}$  tomamos como entornos del punto añadido  $q$  los  $W \subset S$  que tienen complementario finito (y  $q \in W$ ). Es decir, para  $q$  tenemos la topología de los complementarios finitos mientras que para el resto de puntos tenemos la topología usual. En este caso,  $S$  es compacto, pero sus puntos no son localmente compactos (por lo menos,  $q$ )

Pero este caso es un ejemplo con un espacio no separado.

## Proposición

Si  $X$  es  $T_2$  y  $x \in X$  tiene un entorno compacto, entonces tiene una base de entornos compactos.

### Demostración:

Queremos ver que  $\forall U^x$  abierto,  $\exists K^x \stackrel{\text{ent.}}{\subset} U^x$  compactos.

$\exists V^x (\supseteq W^x)$  compacto  $\stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{V}^x = \{\text{entornos compactos } K^x\}$  base de entornos.

$\exists_{\text{ab.}} U_1^x \subset \overline{U_1^x} \subset U^x$ :

$$V^x \setminus U^x \stackrel{\text{cerr.}}{\subset} V_{\text{comp}}^x \Rightarrow \overbrace{V \setminus U}^{\not\exists x} \text{ comp. en } T_2 \Rightarrow \exists \overbrace{U_1^x \& A}^{\text{ab. disjuntos}} \supset V^x \setminus U^x$$

Y tenemos que:  $K^x = \overline{W^x \cap U^x} \Rightarrow$

- $\overline{V^x}_{\text{comp.}} \cap \overline{U_1^x} = V_{\text{comp.}}^x \cap \overline{U_1^x} \subset V^x \cap \overline{X \setminus A} = V^x \cap \overbrace{(X \setminus A)}^{\text{cerr.}} \subset U^x.$
- Intersección de dos entornos es entorno.
- $W^x \cap U_1^x \subset V^x \stackrel{\text{comp. en } T_2}{=} \overline{V^x} \subset X \Rightarrow \underbrace{K^x}_{\text{cerr.}} \subset \underbrace{V^x}_{\text{comp.}} \Rightarrow K^x \text{ comp.}$

Y tenemos dos mantras:

### Proposición (Mantra 1)

*Localmente cerrado en localmente compacto es localmente compacto.*

Demostración:

Sea  $Y \subset X$  con  $Y$  localmente cerrado y  $X$  localmente compacto e  $y \in Y$ .

Tenemos:

$$\overline{U_1^x} \cap V^x \subset \overline{X \setminus A} \cap V^x = \overbrace{(X \setminus A)}^{\text{cerr.}} \cap V^x \subset U^x$$

Y como  $Y$  es localmente cerrado,  $\exists W^y \cap Y \stackrel{\text{cerr.}}{\subset} W^y$  ent. en  $X$ . Por ser  $X$  localmente compacto  $\exists K^y$  compacto tal que,  $K^y \subset W^y \Rightarrow K^y \cap W^y \cap Y \stackrel{\text{cerr.}}{\subset} K^y \Rightarrow$

$$L^y = \underbrace{K^y \cap W^y}_{\text{ent. en } X} \cap Y \stackrel{\text{cerr.}}{\subset} K^y \Rightarrow L^y \text{ ent. en } Y \text{ compacto.}$$

### Proposición (Mantra 2)

*Localmente compacto en  $T_2$  es localmente cerrado.*

Demostración:

Sea  $Y \subset X$  con  $Y$  localmente compacto,  $X$  siendo  $T_2$  e  $y \in Y \Rightarrow$

$$\exists L^y = \underbrace{V^y \cap Y}_{\text{comp. ent. en } Y} \subset \underbrace{V^y}_{\text{ent. en } X} \stackrel{T_2}{\Longrightarrow} V^y \cap Y = L^y \stackrel{\text{cerr.}}{\subset} V^y.$$

### Corolario

*En un  $T_2$  localmente compacto, ser localmente cerrado es equivalente a localmente compacto.*

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
Compacidad local	$\times$ Loc. cerrados ✓	$\times$ Abiertos ✓	✓	✓
Demostración:	Mantra 1	$f(\text{ent.}) = \text{ent}$	Tychonoff	Loc. suma es como sum's

Cuadro 7.1: La tabla nos indica como se conserva la compacidad local en las distintas construcciones que hemos visto. Las sumas y los productos son finitos.

Ejemplo:

$Y = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  no es localmente compacto.

- $\mathbb{Z} \subset \underbrace{W}_{\text{ab.}} \subset \mathbb{R} : \exists k + \underbrace{\varepsilon_k}_{0 < \varepsilon_k < 1} \in W \forall k \geq 1 \Rightarrow A = \{k + \varepsilon_k : k \geq 1\} \subset W$ 
  - Cerrado
  - Saturado ( $n\mathbb{Z} = \emptyset$ )
  - Infinito
  - Discreto
- $\exists K \subset Y$  entorno compacto de  $y = \mathbb{Z} \in Y \Rightarrow \exists \underbrace{W}_{\supseteq \mathbb{Z}}^{\text{ab.}} \subset p^{-1}K \Rightarrow pA \subset K$  infinito sin acumulación.

## COMPACTIFICACIÓN POR UN PUNTO

Este es otro problema importante: sumergir un espacio como subespacio abierto denso de un espacio compacto. Con “sumergir” nos referimos a una inmersión.

$$X \xrightarrow[\text{denso}]{\text{ab.}} X^*$$

donde  $X$  es no compacto y  $X^*$  es compacto y Hausdorff, es decir, es localmente compacto y, por ende, la imagen de  $X$  es localmente compacta.

Intuitivamente se trata de añadir los límites que el espacio no tiene (por no ser compacto).

Ejemplo:

- $\mathbb{R}^n \equiv B^n \setminus \{a\} \subset \mathbb{S}^n$  vía proyección estereográfica desde  $a$ .
- $\mathbb{R}^n \equiv \mathbb{RP}^n \setminus H \subset \mathbb{RP}^n$  vía cartas afines.

### Definición

Llamamos **residuo** a la diferencia entre el espacio desde el que surge la inmersión y el de llegada.

### Proposición

$X$  (no compacto) localmente compacto y  $T_2$ . Entonces:

- $\exists j : X \hookrightarrow X^*$  compacto  $T_2$ ,  $j$  inmersión abierta  $X^* \setminus j(X) = \{\omega\}$ .
- Unicidad:




Figura 7.2: Con esto vemos que la unicidad es por homeomorfismo.

Demostración:

- $X^* = X \sqcup \{\omega\}$ ,  $\mathcal{T}^* = \mathcal{T} \cup \{X^* \setminus K : K \subset X \text{ comp.}\}$ .
  - $\mathcal{T}^*$  es topología: fácil por las hipótesis sobre  $X$ .

- $K_i \overset{\text{comp.}}{\subset} X \xrightarrow{T_2} K_i \overset{\text{cerr.}}{\subset} X \Rightarrow \overbrace{\bigcap_i K_i}^{\text{cerr.}} \overset{\text{comp.}}{\subset} \overbrace{K_{i_0}}^{\text{comp.}} \Rightarrow \bigcap_i K_i \text{ comp.}$
  - $U \overset{\text{ab.}}{\subset} X, X \overset{\text{comp.}}{\subset} X \Rightarrow U \setminus K = \text{ab.} \setminus \text{cerr.} = \text{ab.}$
  - $U \overset{\text{ab.}}{\subset} X, K \overset{\text{comp.}}{\subset} X \Rightarrow U \cup (X^* \setminus K) = X^* \setminus (K \setminus U), K \setminus U \subset K \text{ cerrado} \Rightarrow \text{compacto.}$
  - $X \subset X^*$  inmersión abierta:  $(X^* \setminus K) \cap X = X \setminus K \in \mathcal{T}$  pues  $X$  es  $T_2$ .
  - $X^*$  es compacto:  $X^* = \bigcup_i W_i.$
- $\exists W_{i_0} \ni w \Rightarrow W_{i_0} = X^* \setminus \underbrace{K}_{\text{comp.}} \Rightarrow K \subset W_{i_1} \cup \dots \cup W_{i_r} \Rightarrow X^* = W_{i_0} \cup W_{i_1} \cup \dots \cup W_{i_r}$
- $X^*$  es  $T_2$  : Si tomamos dos puntos de  $X$  simplemente utilizamos que es  $T_2$ . Por tanto, lo interesante es separar  $x \in X$  de  $w$ :

$$x \in X \text{ loc. comp.} \Rightarrow \exists K^x \text{ ent. comp.} \Rightarrow X^* \setminus K^x = U^\omega \text{ ent. de } \omega$$

- $X$  es denso:

$$\overline{X} = X^*, \forall \overbrace{W^x}^{=X \setminus K} \cap X = X \setminus K \neq \emptyset$$

porque  $X$  no es compacto, pero  $K$  sí.

## 2. Unicidad:

- $\begin{cases} h_{j_1} = j_2 \\ j_i \text{ inmersiones} \end{cases} \Rightarrow h| : j_1(X) \rightarrow j_2(X) \text{ homeomorfismo.}$
- $h$  continua en  $\omega_1$  (análogamente  $h^{-1}$  continua en  $\omega_2$ )

$$\begin{aligned} h(\omega_1) = \omega_2 \in W \overset{\text{ab.}}{\subset} X_2^* \Rightarrow X_2^* \setminus W \overset{\text{cerr.}}{\subset} X_2^* \Rightarrow X_2^* \setminus W \overset{\text{comp.}}{\subset} j_2(X) \\ \Rightarrow K = h^{-1}(X_2^* \setminus W) \overset{\text{comp.}}{\subset} j_1(X) \subset X_1^* \\ [X_1^* \text{ es } T_2] \Rightarrow K \overset{\text{cerr.}}{\subset} X_1^* \Rightarrow h^{-1}(W) = X_1^* \setminus K \overset{\text{ab.}}{\subset} X_1^*. \end{aligned}$$

### Definición

El espacio  $X^*$  se denomina **compactificación por un punto** de  $X$ .

También, **compactificación de Alexandroff**.

Por ejemplo,  $\mathbb{S}^n$  es la compactificación por un punto de  $\mathbb{R}^n$  (vía proyección estereográfica como dijimos antes).

Observación: ¡Importante!

1. La unicidad justifica? que un espacio  $X^*$  compacto  $T_2$  es la compactificación de  $X^* \setminus \{0\}$  para cualquier  $w \in X^*$ .

2. Si dos espacios son homeomorfos, lo son sus compactos.

$$X_1 \xrightarrow[\text{homeo.}]{} X_2 \xrightarrow{j_2} X_2^* \Rightarrow j_1 = j_2 \circ f : X_1 \rightarrow X_2^*$$

que cumple las condiciones.

3. Si dos espacios no son homeomorfos, pueden serlo sus compactos.



No son homeomorfos porque ningún punto de  $X_1$  desconecta sus entornos. Por otro lado, el punto del vértice superior de  $X_2$  si que desconecta TODOS sus entornos suficientemente pequeños. Es decir,  $X_1$  tiene distintas características topológicas de  $X_2$ .

# CONEXIÓN

---

## CONCEPTO Y MANTRAS

---

### Definición

$X$  es **conexo** si cumple las siguientes condiciones equivalentes:

1.  $\#U \sqcup V = X$ , abiertos  $\neq \emptyset$ .
  2.  $\#F \sqcup C = X$ , cerrados  $\neq \emptyset$ .
  3.  $\#E \subsetneq X$  abierto y cerrado  $\neq \emptyset$ .
- 

### Demostración:

Equivalencia:  $F = \underbrace{X \setminus V}_{=U}$ ,  $C = \underbrace{X \setminus U}_{=V}$ ,  $E = U = X \setminus V$ .

### Observación:

$Y \subset X$  subespacio conexo:  $\#U \cup V \supset Y$  abierto de  $X$ ,

$$\begin{cases} U \cap Y \neq \emptyset \\ V \cap Y \neq \emptyset \\ U \cap V \cap Y = \emptyset \end{cases}$$

Esta definición es equivalente a comprobar que  $Y$  es conexo en su topología relativa.

### Ejemplo: (Fundamental)

- $\mathbb{R}$  es conexo.
- $\mathbb{Q}$  no es conexo. De hecho, es **totalmente desconexo**.

### Demostración:

Si dividimos  $\mathbb{R}$  en dos segmentos disjuntos separados por  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  tenemos que  $\mathbb{Q} = \mathbb{Q} \cap ([-\infty, \alpha) \sqcup (\alpha, +\infty])$  que son abiertos en  $\mathbb{Q}$  y disjuntos.

- Sorgenfrey: Solo son conexos los puntos.
- $(0, 1) \subset \mathbb{R}_u$  es conexo.
- Mantras generales  $\Rightarrow$  segmentos en  $\mathbb{R}^n$ , estrellados y convexos son conexos.

### Teorema (del pivot. Mantra 1)

Sea  $X = \bigcup_{i \in I} A_i$ . Si  $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$  y  $A_i$  conexos  $\forall i \in I \Rightarrow X$  conexo.

Demostración:

Tenemos que ver que  $\emptyset \neq E \subset_{\text{cerr.}}^{\text{ab.}} X$  es el total:

$$\begin{aligned} \emptyset \neq E \subset_{\text{cerr.}}^{\text{ab.}} X &\Rightarrow E \cap A_i \subset_{\text{cerr.}}^{\text{ab.}} A_i \xrightarrow{\text{conx.}} \begin{cases} E \cap A_i = \emptyset, \text{ ó} \\ E \supset^* A_i \end{cases} \\ &\xrightarrow[\substack{E \neq \emptyset}]{*} \exists i_0 : E \supset A_{i_0} \supset \bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset \Rightarrow \forall i \in I, E \cap A_i \neq \emptyset \xrightarrow{*} E \supset A_i \\ &\Rightarrow E \supset \bigcup_{i \in I} A_i \Rightarrow E = X. \end{aligned}$$

### Corolario (Variantes)

1.  $X = \bigcup_{i \in I} A_i$ ,  $\exists A_{i_0} \cap A_i \neq \emptyset$ ,  $\forall i \in I$ .

Demostración:

$X = \bigcup_{i \in I} (A_{i_0} \cup A_i)$  conexo por mantra 1 y se aplica el mantra 1.

2. Cadenas:  $X = \underbrace{A_1 \cup \dots \cup A_k \cup \dots}_{\text{todos conexos}}$  y  $A_k \cap A_{k+1} \neq \emptyset \Rightarrow X$  conexo.

Demostración:

Se usa el mantra 1 dos veces:

$$\begin{cases} X_k = (((((A_1 \cup A_2) \cup A_3) \dots) \cup) A_{k-1}) \cup A_k \\ X = \bigcup_{k \in K} (X_1 \cup \dots \cup X_k) \end{cases}$$




Figura 8.1: Ejemplo de una cadena de conexos.

Ahora vemos el contrarrecíproco del anterior resultado que es de vital importancia.

### Proposición (Construcción de cadenas)

Sea  $X$  conexo tal que  $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ , recubrimiento abierto y  $p, q \in X \Rightarrow \exists U_{i_0} \cup \dots \cup U_{i_k}$  de  $p$  a  $q : p \in U_{i_0}, U_{i_{k-1}} \cap U_{i_k} \neq \emptyset, q \in U_{i_k}$ .


Demostración:

Veamos que  $A = \{x \in X : \exists U_{i_k}, \text{ cadena, de } p \text{ a } x\} \neq \emptyset$  abierto y cerrado  $\Rightarrow A = X$  y  $q \in A$ , es decir, para cualquier elemento de  $X$  existe una cadena desde  $p$  que es lo que buscamos. Esto se debe a que:

- No vacío:  $\exists U_{i_0} \ni p$  y  $U_{i_0}$  va de  $p$  a  $p$ .
- Abierto:  $\exists U_{i_0}, \dots, U_{i_r}$  de  $p$  a  $x \Rightarrow U_{i_r} \subset A$ , es decir, es entorno de todos sus puntos.
- Cerrado:

$$\begin{aligned} y \in \overline{A} \text{ e } y \in U_{i(y)} &\Rightarrow A \cap U_{i(y)} \neq \emptyset \\ &\Rightarrow \exists U_{i_0}, \dots, U_{i_r} \text{ de } p \text{ a } x \in U_{i(y)} \\ &\Rightarrow U_{i_0}, \dots, U_{i_r}, U_{i(y)} \text{ de } p \text{ a } y. \end{aligned}$$

Por tanto,  $y \in A$ , es decir,  $A = \overline{A}$ .



Con esto es un subconjunto de uno conexo, no vacío, abierto y cerrado, es decir, es el total.

### Proposición (Mantra 2)

*Imagen continua de un conexo es conexo.*

Demostración:

Sea  $f : X \rightarrow Y$  continua y  $\emptyset \neq E \subset_{\text{ab.}} f(X) \stackrel{\text{cont.}}{\iff} \emptyset \neq f^{-1}(E) \subset_{\text{ab.}} X \Rightarrow f^{-1}(E) = X \Rightarrow E = f(X)$ .

### Proposición (Mantra 3)

*La adherencia de un conexo es conexo, es decir,*

$$Y \subset X \text{ con } Y \text{ conexo y denso} \Rightarrow X \text{ conexo.}$$

Demostración:

$\emptyset \neq E \subset_{\text{ab.}} X \Rightarrow E \cap Y \subset_{\text{ab.}} Y \Rightarrow \begin{cases} E \cap Y \neq \emptyset \text{ por la densidad.} \\ E \cap Y = Y \Rightarrow Y \subset E \subset_{\text{cerr.}} X = \overline{Y} \Rightarrow E = X. \end{cases}$

Ejemplo:

1. Por 31) tenemos que:  $(0, 1) \stackrel{\text{denso}}{\subset} [0, 1] \xrightarrow{\text{M3}} [0, 1]$  conexo. Con una interpolación:  $\sigma(t) = (1 - t)a + tb$  es homeomorfismo con  $[a, b] \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{M2}} [a, b]$  es conexo. Aplicando ahora:

- Pivote:  $E = \bigcup_{x \in E} [a, x]$  estrellado (resp. de  $a$ ): convexos, bolas abiertas y cerradas, rectángulos...
- Mantra 2: Trazas de curvas continuas  $\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ .

2. Seno del topólogo (polaco):

Son conexos:  $\begin{cases} \Gamma = \text{imagen} : t \mapsto (t, \sin \frac{1}{t}), t > 0 \text{ por ser imagen de una función continua} \\ J = \{0\} \times [0, 1] \\ \overline{\Gamma} = \Gamma \cup J \text{ por ser adherencia.} \end{cases}$




Figura 8.2: Representación de la gráfica del llamado seno del topólogo o de Varsovia.

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
Conexión	$\times$	✓	✓	$\times$
Demostración:	$\{0, 1\} \subset [0, 1]$	Mantra 3	Pivote	Cada sum. es ab. y cerr.

Cuadro 8.1: La tabla nos indica como se conserva la conexión con las propiedades que hemos visto. Las sumas y los productos son finitos.

### Proposición

$X \times Y$  conexo  $\Leftrightarrow X$  y  $Y$  conexo.

Demostración:

$\Rightarrow)$  Mantra 3 para las proyecciones.

$\Leftarrow)$  Fijamos  $a \in X$ .

$$\left. \begin{array}{l} Z_y = \underbrace{(X \times \{y\})}_{\approx X} \cup \underbrace{(\{a\} \times Y)}_{\approx Y} \text{ dos conx. se cortan en } (a, y) \xrightarrow{\text{Piv.}} Z_y \text{ conx.} \\ \forall y \in Y, \quad \bigcap_{y \in Y} Z_y = \{a\} \times Y \neq \emptyset \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Piv.}}$$

$$\bigcup_{y \in Y} Z_y = X \times Y \text{ conx.}$$




Figura 8.3: La figura nos representa como el producto de dos conexos, es conexo. Cada línea del cuadrado es un  $X \times \{y\}$ .

# COMPONENTES CONEXAS Y CONEXIÓN LOCAL

---

## COMPONENTES

---

### Definición

Una **componente conexa** (c.c) de  $X$  es un subespacio conexo maximal.

---

### Proposición (Construcción)

1.  $\forall a \in X$  definimos:  $C(a) = \bigcup_{a \in A_{\text{conx}}} A$  es conexo (por t. pivote),  $a \in C(a)$ .
2.  $E \subset X$  conexo tal que  $C(a) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow$

$$C(a) \cup E \text{ conx. (pivote)} \Rightarrow C(a) \cup E \text{ es uno de los } A \text{ de } C(a) \Rightarrow E \subset C(a)$$

Luego,

- $C(a)$  maximal  $\Rightarrow$  componente conexa.
  - $a \neq b : C(a) = C(b)$  ó  $C(a) \cap C(b) = \emptyset$ . Usamos  $E = C(b)$ .
3.  $\overline{C(a)}$  conexo (mantra adh.)  $\Rightarrow \overline{\overline{C(a)}} = \overline{C(a)}$  (maximalidad)  
$$\overbrace{C(a)}^{\text{cerr.}}$$

1. + 2. + 3.  $\Rightarrow X = \bigsqcup_{C \subset X} C$  es una partición de cerrados disjuntos.

### Ejemplo:

1.  $X_{\text{discreto}} : C(x) = \{x\}$  (puntos abiertos y cerrados)
2.  $\mathbb{Q}_u : C(p) = \{p\}$  (todo intervalo de  $\mathbb{R}$  tiene racionales)
3.  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}) : C(t) = \{t\}$  ( $\mathbb{R} = (\leftarrow, a) \cup [a, \rightarrow)$  abierto y cerrado)
4.  $X = \{0, Y_k, k \geq 1\} : \begin{cases} C(0) = \{0\} \text{ cerrado, no abierto } (\{\frac{1}{k} : k \geq 1\} \text{ no cerr.}) \\ C(\frac{1}{k}) = \{\frac{1}{k}\} \text{ cerrado y abierto.} \end{cases}$

---

### Definición

Un espacio cuyas componentes son los puntos se llama **totalmente desconexo**.

---

### Proposición

Las componentes conexas de  $X \times Y$  son los productos de componentes conexas.

Demostración:

$$C \overset{\text{c.c.}}{\subset} \underbrace{X \times Y}_{\xrightarrow{p} X \quad \xrightarrow{q} Y} \Rightarrow p(C) \text{ y } q(C) \text{ conexos en } X \text{ e } Y, \text{ respectivamente, (imagen continua)} \Rightarrow$$
$$\begin{cases} p(C) \subset E \overset{\text{c.c.}}{\subset} X \\ q(C) \subset F \overset{\text{c.c.}}{\subset} Y \end{cases} \Rightarrow C \subset E \times F \xrightarrow{\text{Max. de } C} C = E \times F.$$

## CONEXIÓN LOCAL

### Definición

$X$  es **localmente conexo** si  $\forall x \in X, \exists \mathcal{B}^x$  base de entornos abiertos conexos.

### Proposición

$X$  es localmente conexo  $\Leftrightarrow$  las componentes conexas de un abierto son abiertas:

$$U \overset{\text{ab.}}{\subset} X \text{ y } C \overset{\text{c.c.}}{\subset} U \Rightarrow C \overset{\text{ab.}}{\subset} X.$$

Demostración:

$\Rightarrow)$  Si  $x \in C \overset{\text{c.c.}}{\subset} U \overset{\text{ab.}}{\subset} X \Rightarrow \exists \underbrace{U^x}_{\text{ab. conn.}} \subset U \Rightarrow U^x \subset C \Rightarrow C \overset{\text{ab.}}{\subset} X$ . Es decir,  $U$  es entorno de todos sus puntos.

$\Leftarrow)$   $\mathcal{B}^x = \{C(x) \overset{\text{c.c.}}{\subset} U \overset{\text{ab.}}{\subset} X : x \in U\}$ . Con  $C(x)$  abierto por ser c.c de abierto.

### Enunciado

$X$  es localmente conexo  $\Leftrightarrow \forall x \in X, \exists \mathcal{V}^x$  base de entornos conexos.

Ejemplo: (Esencial)

$\{0, \frac{1}{k} : k \geq 1\} = Y \subset \mathbb{R}_u$  no es localmente conexo.

Demostración:

La c.c  $(0) = \{0\}$  no es abierto. Directamente:

$$0 \in \underbrace{V}_{\text{ent. de } 0 \in \mathbb{R}} \cap Y \Rightarrow V \supset (0, \varepsilon), \exists 0 < \underbrace{\theta}_{\notin \mathbb{Q}} < \frac{1}{k} < \varepsilon < 1$$
$$\Rightarrow V \cap Y \subset \underbrace{(-, \theta)}_{\ni 0} \cup \underbrace{(\theta, \rightarrow)}_{\ni \frac{1}{k}} \Rightarrow V \cap Y \text{ no conexo..}$$

### Enunciado

1. Analizar una sucesión de segmentos que convergen a otro:




Figura 9.1: Ejemplo

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
Conexión local	$\times$	✓	✓	$\times$
Demostración:	Ejemplo esencial	No banal	Prod. ent. conx.	Suma como sum's


Cuadro 9.1: La tabla nos indica como se conserva la compacidad local en las construcciones que hemos visto. Las sumas y los productos son finitos.

### Proposición

Sea  $f : X \rightarrow Y$  identificación con  $X$  localmente conexo  $\Rightarrow Y$  es localmente conexo.

Demostración:

El diagrama siguiente resume el argumento (si se lee en el orden adecuado).





# CONEXIÓN POR CAMINOS

## Definición

Un **camino** en un espacio  $X$  es una aplicación continua  $\alpha : [a, b] \subset \mathbb{R}_u \rightarrow X$ . Decimos:

- $\alpha$  va de  $\alpha(a)$  a  $\alpha(b)$ , conecta  $\alpha(a)$  con  $\alpha(b)$ , que son **extremos**.
- La imagen  $\alpha[a, b] \subset X$  es la **traza**, conexa por imagen continua.

## Proposición (Cambios de parámetros)

$\forall \varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  continua  $\Rightarrow \beta = \alpha \circ \varphi$  es otro camino con igual traza.

$\varphi$  es un **cambio de parámetro** cuando es homeomorfismo (creciente o decreciente).




Ejemplo: (Interpolación lineal)

Dados  $p, q \in \mathbb{R}^n$ ,  $\alpha : [0, 1] \rightarrow [p, q] : t \mapsto (1 - t)p + tq$  es un camino bien conocido y útil. También sirve para reparametrizar si  $[p, q] = [a, b] \subset \mathbb{R}$ . Vemos, por ejemplo, que siempre podemos reducirnos a caminos con dominio  $[0, 1]$ . Esto será fundamental más adelante.

## Proposición (Producto de caminos)

Topológicamente:



(Alternativa: Reparametrizar  $\beta$  con dominio  $[b, b + (d - c)]$ )

Ejemplo:

Si hacemos el producto de segmentos consecutivos obtenemos **caminos poligonales**.

# CONEXIÓN POR CAMINOS

## Definición

Un espacio  $X$  es **conexo por caminos** si sus puntos se pueden conectar con un camino:

$$\forall x \forall y \in X, \exists \sigma_y : [a, b] \rightarrow X, \sigma_y(a) = x \wedge \sigma_y(b) = y$$

## Observación:

En particular,  $X = \bigcup_{y \in X} \sigma_y[a, b]$  es **conexo** (pivote,  $\alpha_y(a) = x, \forall y$ )

## Ejemplo:


1. La mayor parte de los conexos conocidos son conexos por caminos:

- Los abiertos conexos (top. usual) son conexos por poligonales, que son caminos.
- Los conjuntos convexos y los estrellados también.

2. El seno del topólogo  $\Gamma$  es la traza de  $\alpha(t) = (t, \sin \frac{1}{t})$ ,  $t > 0$ , es conexo y lo es su adherencia  $\bar{\Gamma} = J \cup \Gamma$ ,  $J = \{0\} \times [0, 1]$ . Pero  $\bar{\Gamma}$  no es conexo por caminos.

## Demostración:

No existen caminos  $\sigma : [a, b] \rightarrow \bar{\Gamma}$   $\begin{cases} \sigma(a) = p \in J \\ \sigma(b) = q \in \Gamma \end{cases}$ :



- $\sigma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$ ,  $\alpha, \beta$  continuas.  $\exists a' = \max\{t \in [a, b] : \alpha(t) = 0\} \Rightarrow (\alpha \text{ continua en un compacto}) \Rightarrow \begin{cases} \alpha(a') = 0, \sigma(a') = p' \in J \\ t > a' : \alpha(t) > 0 \Rightarrow \sigma(t) \in \Gamma \Rightarrow \beta(t) = \sin \frac{1}{\alpha(t)} \end{cases}$
- Supongamos  $p' = \sigma(a') \neq (0, 1)$  (punto) y  $\exists \delta : B(p', \delta) \cap \{y = 1\} = \emptyset$ .  $\sigma$  continua  $\Rightarrow \exists \sigma[a', \varepsilon] \subset B(p', \delta) \Rightarrow \sigma[a', \varepsilon] \cap \{y = 1\} = \emptyset$ . (si  $p' = (0, 1)$  evitaríamos  $\{y = -1\}$ )
- $\alpha$  continua  $\Rightarrow \alpha[a', \varepsilon] \subset \mathbb{R}$  conexo compacto = intervalo:  $\alpha[a', \varepsilon] = [0, c]$ .
- La oscilación de  $\sin \frac{1}{x}$  lleva  $\sigma$  a  $\{y = 1\}$ , fuera de la bola elegida:


$$\begin{aligned} k \gg 0 \Rightarrow \frac{2}{(1 + 4k)\pi} &\in [0, c] = \alpha[a', \varepsilon] \Rightarrow \exists a' < t_k < \varepsilon : \alpha(t_k) = \frac{2}{(1 + 4k)\pi} \\ \Rightarrow \sigma(t_k) &= \left( \alpha(t_k), \sin \left( \frac{1}{\alpha(t_k)} \right) \right) = (x_k, 1) \perp \end{aligned}$$

# MANTRAS

Casi todo lo que dijimos sobre la conexión nos vale:


## Proposición (Mantra del pivote)

Sea  $X = \bigcup_i A_i$ ,  $\bigcap_i A_i \neq \emptyset$ ,  $\forall A_i$  conexos por caminos  $\Rightarrow X$  conexo por caminos.



### Proposición (Mantra de la imagen)

Sea  $f : X \rightarrow Y$  continua con  $X$  conexo por caminos  $\Rightarrow f(X)$  es conexo por caminos.



### Proposición (Mantra de la adherencia (!NO!))

El seno del topólogo  $\Gamma$  es conexo por caminos:  $(a, \sin \frac{1}{a})$  y  $(b, \sin \frac{1}{b})$  se conectan por el camino evidente,  $\alpha(t) = (t, \sin \frac{1}{t})$ ,  $a \leq t \leq b$ . Pero, como hemos visto, la adherencia  $\bar{\Gamma}$  no es conexa por caminos.

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
Conexión por caminos	✗	✓	✓	✗

Cuadro 10.1: La tabla nos indica como se conserva la conexión por caminos en las construcciones que hemos visto. Las sumas y los productos son finitos.

### Proposición (Productos)

Sean  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$ :

$$\begin{aligned} \sigma : [a, b] &\rightarrow X : \left\{ \begin{array}{l} \sigma(a) = x_1 \\ \sigma(b) = x_2 \end{array} \right. \\ \tau : [a, b] &\rightarrow Y : \left\{ \begin{array}{l} \tau(a) = y_1 \\ \tau(b) = y_2 \end{array} \right. \end{aligned} \Rightarrow \gamma = (\sigma, \tau) : [a, b] \rightarrow X \times Y : \left\{ \begin{array}{l} \gamma(a) = (x_1, y_1) \\ \gamma(b) = (x_2, y_2) \end{array} \right.$$



# COMPONENTES CONEXAS POR CAMINOS Y CONEXIÓN LOCAL POR CAMINOS

---

## COMPONENTES CONEXAS POR CAMINOS

Todo análogo a las componentes conexas (casi). Sea  $X$  espacio topológico.

---

### Definición

Una *componente conexa por caminos* (*c.c.c*) es un subconjunto conexo por caminos maximal.

---

### Proposición (Descripción)

1. La *c.c.c* de  $x \in X$  es  $\bigcup_{x \in A} A$  con  $A$  conexa por caminos.
2. Las *c.c.c* forman una partición de  $X$ , más fina que la de las *c.c.*

Demostración:

Porque conexo por caminos  $\Rightarrow$  conexo, pero no a la inversa.

**¡OJO!** Las *c.c.c* no son necesariamente cerradas.

Como contraejemplo de ambas cosas dichas tenemos la adherencia del seno topólogo.

Ejemplo:

$\Gamma$  seno del topólogo y  $\bar{\Gamma} = J \cup \Gamma$  son conexos. Tenemos que  $\bar{\Gamma}$  es una *c.c.*, mientras que  $J$  y  $\Gamma$  son dos *c.c.c*, una cerrada ( $J$ ) y la otra no ( $\Gamma$ ).

Demostración:

Porque  $\bar{\Gamma}$  no es conexa por caminos.

## CONEXIÓN LOCAL POR CAMINOS

Imitamos sin sorpresa las demostraciones de la conexión local y tenemos:

---

### Definición

$X$  es *localmente conexo por caminos* si  $\forall x \in X, \exists \mathcal{B}^x$  base de entornos abiertos conexos por caminos.

	Subespacios	Cocientes	Productos	Sumas
Conexión local por caminos	✗	✓	✓	✓

Cuadro 11.1: También vale que las c.c.c del producto son los productos de las c.c.c de los factores.

---

### Proposición

$X$  es localmente conexo por caminos  $\Leftrightarrow$  las c.c.c de un abierto son abiertas.

---

### Enunciado

Locamente conexo  $\Leftrightarrow \forall x \in X, \exists V^x$  base de entornos conexos por caminos.

---

## TABLA DE COMPORTAMIENTO

### RELACIONES ENTRE LAS PROPIEDADES DE CONEXIÓN

Lo principal es que:

### Proposición

Conexo y localmente conexo por caminos  $\Rightarrow$  Conexo por caminos.

Demostración:

- Conexo  $\Rightarrow \forall x, y, \exists$  cadenas de  $x$  a  $y$ .
- Localmente conexo por caminos  $\Rightarrow$  cadenas de abiertos conexos por caminos  $\Rightarrow$  Var. pivote  
Estas cadenas son conexas por caminos.

Por tanto,  $\exists$  camino de  $x$  a  $y$ .

Observación:

Esta es la demostración de que un abierto conexo de  $\mathbb{R}_u^n$  lo es por poligonales (se usan cadenas de bolas).

Observación: (Resumen)

Por especificar todas las posibilidades:

CONEXOS	CONEXOS	LOC. CONEXOS
CONEXOS	CONEXOS	LOC. CONEXOS
CONEXOS POR CAMINOS	CONEXOS POR CAMINOS	LOC. CONEXOS POR CAMINOS

Ejercicio: Contraejemplos. Los menos fáciles son \* y \*\*

# Parte II

## Topología algebraica



# HOMOTOPÍA

---

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES

---

### Definición

Una homotopía es una aplicación continua  $H : Y \times [0, 1] \rightarrow X$ :

1.  $H_s : Y \rightarrow X : y \mapsto H(y, s)$ ,  $H \equiv \{H_s : 0 \leq s \leq 1\}$  familia uniparamétrica de aplicaciones.
2. Siendo  $f = H_0$  y  $g = H_1$ :

$$\begin{cases} H_s : f \simeq g \text{ homotopía entre } f \text{ y } g \\ H \text{ deformación continua de } f \text{ a } g \end{cases} \quad \boxed{\text{El problema: cuándo } f \simeq g}$$

3.  $f \simeq g$  relación de equivalencia:

- $f \simeq f$  vía  $H_s \equiv f$ .
- $H_s : f \simeq g \Rightarrow H_{1-s} : g \simeq f$ .
- $\begin{cases} F_s : f \simeq g \\ G_s : g \simeq h \end{cases} \Rightarrow H_s = \begin{cases} F_{2s}, & 0 \leq s \leq 1/2 \\ G_{2s-1}, & 1/2 \leq s \leq 1 \end{cases} : f \simeq h$

Demostración:

$$\text{Continuidad: } \begin{cases} F_{2(1/2)} = F_1 = g \\ G_{2(1/2)-1} = G_0 = g \end{cases}$$

---

### Proposición

$X$  conexo por caminos,  $f, g : Y \rightarrow X$  constantes  $\Rightarrow f \simeq g$ .

Demostración:

$$\exists \sigma : [0, 1] \rightarrow X, \sigma(0) = f(y_0) \text{ y } \sigma(1) = g(y_0) \Rightarrow H_s \equiv \sigma(s) : \begin{cases} H_0 \equiv \sigma(0) = f(y_0) \equiv f \\ H_1 \equiv \sigma(1) = g(y_0) \equiv g \end{cases}$$

---

### Definición

$f : Y \rightarrow X$  es nulhomótopa si  $f \simeq$  constante, esencial en caso contrario.

---

### Teorema (Problema esencial. Hopf.)

(1932)  $\exists f : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$  esencial con  $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4 = \mathbb{C}^2$  y  $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{C} : (z, z') \mapsto (\|z\|^2 - \|z'\|^2, 2zz')$

# CONCEPTO RELATIVO

---

## Definición

$H : Y \times [0, 1] \rightarrow X$  es relativa a  $A \subset Y$  si  $H_s(a) = H_0(a)$ ,  $\forall a \in A$ ,  $\forall s$ .

---

## Proposición

$H$  relativa a  $A$ ,  $f = H_0$ ,  $g = H_1 \Rightarrow f|_A = g|_A$ . Notación:  $H_s = f \xrightarrow{A} g$  (Relación de equivalencia).

Ejemplo: (Fundamentales. Interpolación)


1.  $f, g : Y \rightarrow X \subset \mathbb{R}^n$  convexo  $\Rightarrow \exists H_s = (1-s)f + sg : f \simeq g$ .

Demostración:

Pues por convexidad  $H_s(y) \in \underbrace{[f(y), g(y)]}_{\text{cond. crucial!}} \subset X$ .

$f(a) = g(a) \Rightarrow H_s(a) = f(a) = g(a) \Rightarrow H_s$  es relativa a  $A = \{f = g\}$ .

2.  $f : Y \rightarrow X \subset \mathbb{R}^n$  estrellado verp?,  $x_0$ ,  $[x, x_0] \subset X$ ,  $\forall x \in X \Rightarrow H_s = (1-s)f + sx_0 : f \simeq x_0$  (relativa a  $A = f^{-1}(x_0)$ ).
3. Variante en  $\mathbb{S}^n$ :



# CONTRACTIBILIDAD

---

## Definición

$X$  es contrátil si  $\text{id} : X \rightarrow X$  es nulhomótopa:  $\exists H_s : \text{id} \simeq x_0$ .

$Y$  fuertemente contrátil si  $\exists H_s : \text{id} \xrightarrow{x_0} x_0$  (homótopa relativa a  $\{x_0\}$ )

---

Observación:

Los ejemplos son difíciles, pero son cosas distintas.

Ejemplo:

$X \subset \mathbb{R}^n$  estrellado verp?  $x_0 \Rightarrow$  fuertemente contrátil

Demostración:

$$H_s = (1-s)\text{id} + sx_0.$$

## Proposición

1. Si  $X$  es contrátil  $\Rightarrow$  es conexo por caminos.

2. Si  $X$  es contrátil  $\Rightarrow \begin{cases} \forall f : Y \rightarrow X \text{ nulhomótopa.} \\ \forall g : X \rightarrow Z \text{ nulhomótopa.} \end{cases}$

Demostración:

1.  $H_s : id \simeq x_0 \Rightarrow S \mapsto H_s(x_0)$  camino de  $x$  a  $x_0$ .

2.  $H_s : id \simeq x_0 \begin{cases} H_s \circ f : f \simeq x_0 \\ g \circ H_s : g \simeq g(x_0) \end{cases}$

Observación:

Pocos espacios son contráctiles, pero no es inmediato verlo.




# HOMOTOPÍA DE CAMINOS

## EL CONCEPTO BÁSICO

### Definición

$\sigma, \tau : [a, b] \rightarrow X$  son homótopos con extremos fijos si  $\exists H_s : \sigma \simeq \tau$  relativa a  $\{a, b\}$ :


$$\begin{cases} H_s(a) = \sigma(a) = \tau(a) \\ H_s(b) = \sigma(b) = \tau(b) \end{cases} \quad \forall s$$



### Observación:

Es un problema de extensión:

Definir  $H$  en el cuadrado  $[a, b] \times [0, 1]$  con valor determinado en su borde.



## SIMPLE-CONEXIÓN

### Definición

$X$  es simplemente conexo si cumple las siguientes condiciones equivalentes:

1.  $\forall \sigma, \tau : [a, b] \rightarrow X$  con iguales extremos son homótopos con extremos fijos.
2.  $\forall f : \mathbb{S}' \rightarrow X$  se extiende al disco interior de la circunferencia.

Demostración:

Colapsando dos lados de un cuadrado  $\xrightarrow{\pi}$  disco con dos puntos en la circunferencia unidos por dos ceros  $\alpha, \beta$ .

1.  $\Rightarrow$  2.)

$$f : \mathbb{S}^1 \rightarrow X \Rightarrow f \circ \pi \begin{cases} \alpha \rightarrow \text{camino } \sigma \\ \beta \rightarrow \text{camino } \tau \end{cases} \\ \Rightarrow \exists H \text{ con extremos fijos} \Rightarrow \text{compatible con } \pi \\ \Rightarrow H \text{ pasa al cociente por } \pi, \text{ dando } F..$$

2.  $\Rightarrow$  1.) Dos caminos  $\sigma, \tau$  con extremos  $p, q$  definen  $f$  en la circunferencia y su extensión  $F$  al disco define la homotopía  $H = F \circ \pi$ .

Ejemplo:

Los conjuntos convexos son simplemente conexos. ¿Los estrellados?

## ESFERAS $\mathbb{S}^N$ , $N \geq 2$

### Proposición


$\mathbb{S}^n : \{x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$  es simplemente conexo ( $n \geq 2$ ).

Demostración:

$\sigma, \tau : [a, b] \rightarrow \mathbb{S}^n$ ,  $\sigma(a) = \tau(a) = p$ ,  $\sigma(b) = \tau(b) = q$ .

$$\left. \begin{array}{l} \exists c, -c \in \mathbb{S}^n \setminus \{p, 1\} \wedge U = \mathbb{S}^n \setminus \{c\} \stackrel{\text{homeo.}}{\approx} \mathbb{R}^n \\ V = \mathbb{S}^n \setminus \{-c\} \stackrel{\text{homeo.}}{\approx} \mathbb{R}^n \end{array} \right\} \text{proyección estereográfica.}$$

1.  $[a, b] \subset \sigma^{-1}U \cup \sigma^{-1}V \xrightarrow{\text{comp.}} \exists a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = 1 : \sigma[t_{i-1}, t_i] \begin{cases} \subset U \\ \subset V \end{cases} \quad \text{dónde } \sigma[t_{i-1}, t_i] \text{ es la traza de } \sigma_i = \sigma|_{[t_{i-1}, t_i]}.$
2. Si dos consecutivos están en el mismo  $U$  ó  $V$ , eliminamos la juntura común  $\Rightarrow$  al atravesar una juntura  $t_k$  cambiamos de  $U$  a  $V$  ó viceversa, en particular,  $x_k = \sigma(t_k) \in U \cap V \approx \mathbb{R}^n \setminus \{\text{punto}\}$ , que es conexo por caminos, o bien, nos quedamos sin junturas y  $\sigma[a, b] \subset U$  ó  $V$ .
3. Consideramos los trozos en  $V$  (incluido que  $\sigma[a, b] \subset V$  porque no hay ya junturas)



(\*)

$$\begin{aligned} \sigma(t_{i-1}), \sigma(t_i) &\in U \cap V \approx \mathbb{R}^n \setminus \{\text{punto}\} \text{ conexo por caminos} \\ \Rightarrow \exists \sigma_i^* : [t_{i-1}, t_i] &\rightarrow U \cap V \subset V \text{ mismos extremos que } \sigma_i. \end{aligned}$$

$$(***) \quad V \approx \mathbb{R}^n \text{ convexo} \Rightarrow \exists H_s^i : \sigma_i \simeq \sigma_i^* \text{ en } V \text{ con extremos fijos. ¡Ojo! } [\sigma_i^* : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow U].$$

4. Pegando a trozos homotopías en  $\mathbb{S}^n$ :

$$\begin{cases} \sigma [t_{i_1}, t_i] \subset U \Rightarrow H_s^i \equiv \sigma_i = \sigma_i^* : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow U \subset \mathbb{S}^n \\ \sigma [t_{i_1}, t_i] \subset V \xrightarrow{3} H_s^i : \sigma_i \simeq \sigma_i^* : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow V \subset \mathbb{S}^n \end{cases} \Rightarrow \sigma \simeq \sigma^*$$

Homótopos en  $\mathbb{S}^n$  con extremos fijos, pero  $\sigma^* [a, b] \subset U$ .

5. Igual,  $\exists H_s : \tau \simeq \tau^*$  homotopía en  $\mathbb{S}^n$  con extremos fijos, pero  $\tau^* [a, b] \subset U$ .

En conclusión:  $\sigma^* \simeq \tau^*$  en  $U (\approx \mathbb{R}^n)$  con extremos fijos  $\Rightarrow \sigma \simeq \sigma^* \simeq \tau^* \simeq \tau$  con extremos fijos.



# EL GRUPO FUNDAMENTAL

---

## OPERACIONES CON CAMINOS

Sea  $X$  es conexo por caminos.

### Definición (Producto)

$$\sigma, \tau : [0, 1] \rightarrow X, \sigma(1) = \tau(0) \Rightarrow \sigma * \tau(t) = \begin{cases} \sigma(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \tau(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

[Reescalando  $\begin{cases} \sigma \text{ de } [0, 1] \text{ a } [0, 1/2] \\ \tau \text{ de } [0, 1] \text{ a } [1/2, 1] \end{cases}$ ]




---


Las propiedades algebraicas son TODAS SALVO HOMOTOPÍA CON EXTREMOS FIJOS.

### Proposición


Propiedades de grupo:

1. Asociativa:  $(\alpha * \beta) * \gamma \simeq \alpha * (\beta * \gamma)$ .

En cada altura  $s$  se reescalan los caminos con junturas.




2. Neutros:



3. Inverso:  $\sigma'(t) = \sigma(1-t) \Rightarrow \sigma * \sigma' \simeq e_0$  y  $\sigma'' = \sigma \Rightarrow \sigma' * \sigma \simeq e_1$ .

No se reescalada:  $0 \leq \frac{1-s}{2} \leq \frac{1+s}{2} \leq 1$ .

Las junturas dicen dónde parar  $\sigma$  y empezar  $\sigma'$  en cada altura:



4. Invarianza por homotopía:

$$\begin{cases} F_s : \sigma_1 \simeq \sigma_2 \\ G_s : \tau_1 \simeq \tau_2 \end{cases} \xrightarrow{\text{Trans.}} F_s * G_s : \sigma_1 * \tau_1 \simeq \sigma_2 * \tau_2$$

$$F_s * G_s(t) = \begin{cases} F_s(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ G_s(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

## EL GRUPO FUNDAMENTAL

Sea  $X$  conexo por caminos,  $x_0 \in X$  punto base fijo.

### Definición

1. Lazo de base  $x_0$ ,  $\sigma : [0, 1] \rightarrow X$ ,  $\underbrace{\sigma(0) = \sigma(1)}_{\text{lazo}} = x_0$ , punto fijo.
2. ■  $\sigma, \tau : [0, 1] \rightarrow X$  lazos de base  $x_0$ .  
■  $H_s : \sigma \simeq \tau$  de lazos:  $H_s(0) = H_s(1), \forall s$ .  
■  $H_s = \sigma \xrightarrow{x_0} \tau$  de lazos con punto base fijo:  $H_s(0) = H_s(1) = x_0, \forall s$ . [Relativa a  $\{0, 1\}$ ]

### Definición (Grupo fundamental)

- $\pi(X, x_0) = \{\text{lazos de base } x_0\} / \xrightarrow{x_0} \{\text{"Lazos / homotopía"}\}$
- $[\sigma] * [\tau] = [\sigma * \tau]$  define bien un grupo por 14.1.

Ejemplo:

1.  $X$  simplemente conexo  $\Leftrightarrow \pi(X, x_0) = \{1\}, \forall x_0$ . [ $\Leftarrow$ ] ejercicio]

2.  $\pi(\mathbb{S}^n, x_0) = \{1\}, n \geq 2$ .

Demostración:

Por 1) y ser  $\mathbb{S}^\times$ ,  $n \geq 2$  simplemente conexa.

3.  $\pi(\mathbb{R}\mathbb{P}^n, x_0) = \mathbb{Z}_2, n \geq 2$ .

4.  $\pi(\mathbb{S}^1, x_0) = \mathbb{Z}$ ,  $\pi(\text{banda Möbius}) = \mathbb{Z}$ .

5.  $\pi(\infty, x_0) = \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Z}$  que es una lemniscata y un grupo libre no comunitativo.

El cálculo de grupos fundamentales no es una tarea trivial, pero muy útil.


El punto base no es muy importante.

### Proposición

Sea  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  de  $\alpha(0) = x_0$  a  $\alpha(1) = x_1$ . La conjugación:

$$\begin{aligned} \pi(X, x_0) &\rightarrow \pi(X, x_1) \\ [\sigma] &\mapsto [\sigma' * \sigma * \sigma']. \end{aligned}$$

es isomorfismo de grupos.



Demostración:

Fácil con las propiedades de 14.1.

## FUNTORIALIDAD


### Definición

Definimos  $h_*$  como:

$$\begin{aligned} h : X \rightarrow Y \text{ homeo, } h(x_0) = y_0 \Rightarrow \\ h_* : \pi(X, x_0) \rightarrow \pi(Y, y_0) \text{ iso.} \\ [\sigma] \mapsto [h \circ \sigma]. \end{aligned}$$

Es fácil y útil: espacios homeomorfos deben tener grupos fundamentales isomorfos.

Por ejemplo,  $\mathbb{S}^2$  y  $\mathbb{RP}^2$  no son homeomorfos. Pero la construcción es mucho más general.



### Definición (Functorialidad)


$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_* \text{ y } (id_X)_* = id_{\pi(X, x_0)}.$$

### Ejemplo:

Si  $h : X \rightarrow Y$ ,  $x_0 \mapsto y_0$  es homeomorfismo  $\Rightarrow (h_*)^{-1} = (h^{-1})_*$ . [Más preciso que  $h_*$  isomorfismo]

### Proposición (Producto de espacios)

Tenemos que si:



entonces:

$$\begin{aligned} \pi(X \times Y, (x_0, y_0)) &\xrightarrow{p_*, q_*} \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0) \\ [\gamma] = [(\sigma; \tau)] &\mapsto ([\sigma], [\tau]). \end{aligned}$$

es un isomorfismo.

Demostración:

Sean:

$$\left. \begin{array}{l} F_s : \sigma_1 \xrightarrow{x_0} \sigma_2 \\ G_s : \tau_1 \xrightarrow{y_0} \tau_2 \end{array} \right\} \Rightarrow (F_s, G_s) : (\sigma_1, \tau_1) = \gamma_1 \mapsto \gamma_2 = (\sigma_2, \tau_2) \text{ y nada más...}$$

Ejemplo:

1.  $\pi(\mathbb{S} \times \mathbb{S}) = \pi(\mathbb{S}) \times \pi(\mathbb{S}) = \mathbb{Z}^2$ .
2.  $\pi(\mathbb{S}^1 \times [0, 1]) = \pi(\mathbb{S}) \times \pi([0, 1])$ .

# RETRACTOS

---

## RETRACTOS Y DEFORMACIONES

---

### Definición

Una aplicación  $\rho : X \rightarrow A \subset X$  es:

1. Un retracto si  $\rho|_A = id_A$  ( $y A = \rho(A)$  es un retracto de  $X$ )
  2. Una deformación (fuerte) si:  $\exists H_s : id_X \xrightarrow{A} \rho$ , homotopía relativa a  $A$ .
- 

### Ejemplo:

1.  $\forall$  cte :  $X \rightarrow \{x_0\} \subset X$  es retracto.
2. El retracto radial  $\rho : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^n : x \mapsto x/\|x\|$  es una deformación.  $H_s(x) = (1-s)x + s\rho(x)$ .
3.  $\left. \begin{array}{l} \rho : X \rightarrow A \subset X \subset \mathbb{R}^n \text{ retracto} \\ [x, \rho(x)] \subset X, \forall x \end{array} \right\} \Rightarrow \rho \text{ deformación: } H_s = (1-s)id_X + s\rho \text{ (interpolación).}$
4. Cilindros:


$$\begin{aligned} \rho : X \times [0, 1] &\rightarrow X \times \{0\} \\ (x, t) &\mapsto (x, 0) = \rho(x, t). \end{aligned}$$

con  $\rho$  deformación sobre  $X$ :  $H_s(x, t) = \begin{pmatrix} x, & \underbrace{(1-s)t}_{(1-s)t+s \cdot 0} \\ & \end{pmatrix}$ .



5. Banda de Möbius:  $\mathbb{S}^1 \subset M = \bigcup_{p \in \mathbb{S}^1} [a_p, b_p]$ .

Deformación sobre  $\mathbb{S}^1$ :  $\begin{cases} \rho : M \rightarrow \mathbb{S}^1 : x \mapsto \rho(x) \\ H_s(x, s) = (1-s)x + s\rho(x) \end{cases}$



### Proposición

Sea  $\rho : X \rightarrow A \subset X$ ,  $a_0 \in A$ ;  $\rho_* : \pi(X, a_0) \rightarrow \pi(A, a_0)$ .

1.  $\rho$  retracto  $\Rightarrow \rho_*$  suprayectivo.
2.  $\rho$  deformación  $\Rightarrow \rho_*$  isomorfismo.

Demostración:

1.  $\rho$  retracto:

$$A \xrightarrow{\begin{array}{l} j \\ id_A \end{array}} X \xrightarrow{\rho} \pi(A, a_0) \xrightarrow{\begin{array}{l} j_* \\ id_{\pi(A, a_0)} \end{array}} \pi(X, a_0) \xrightarrow{\rho_*} \pi(A, a_0) \xrightarrow{\begin{array}{l} j_* \text{ inyectiva} \\ \rho_* \text{ sobre} \end{array}}$$

2.  $\rho$  deformación:

$$H_s : id_X \xrightarrow{A} \rho \Rightarrow j_* \text{ sobre.} : \left\{ \begin{array}{l} [\sigma] \in \pi(X, a_0) \Rightarrow H_s \circ \sigma : \sigma \xrightarrow{A} \rho \circ \sigma = j \circ \rho \circ \sigma \\ \Rightarrow [\sigma] = [j \circ \rho \circ \sigma] = j_* [\rho \circ \sigma] \end{array} \right.$$

y por ser  $j_*$  sobre  $\Rightarrow \rho_*$  inyectiva.

Ejemplo:

$$1. \pi(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \pi(\mathbb{S}^n) = \begin{cases} \{1\}, n \geq 2 \\ \mathbb{Z}, n = 1 \end{cases}$$

$$2. \pi(\text{cilindro}) = \pi(\text{banda de Möbius}) = \pi(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}.$$

Demostración:


Veremos  $\mathbb{S}^1$ ...

## COCIENTES

Muchos espacios son cocientes y las deformaciones se pueden hacer compatibles para facilitar las construcciones.

Ejemplo:

Cilindro  $C = \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$  y banda de Möbius  $M$ .



Tenemos  $C, M = R/$  identificaciones adecuadas de lados opuestos y, por otro lado, la deformación de  $R$  sobre  $A = [a, b]$ ,  $H_s(z) = (1 - s)z + s\rho(z) \xrightarrow{(*)}$  deformación de  $R/ \sim$  sobre  $[a, b]/ \sim = \mathbb{S}^1$ .

Es decir,  $\mathbb{S}^1$  es deformación de  $C$  y de  $M$ , luego todos tienen  $\pi = \mathbb{Z}$ .

( $*$ ): porque  $p$  y  $H_s$  son compatibles con las relaciones:  $z \sim z' \Rightarrow H_s(z) \simeq H_s(z')$ , luego inducen aplicaciones continuas  $\bar{p}$  y  $\bar{H}_s : R/ \sim \rightarrow A/ \sim$ .

Normalmente se hacen las deformaciones pensando en que cumplan  $H_s(z) \simeq H_s(z')$ .


## AGUJEROS

Conviene insistir en un ejemplo importante de deformación y sus variantes.

$$1. \rho : \underbrace{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}_{\text{esp. con "agujero"}} \rightarrow \mathbb{S}^n \text{ deformación} \Rightarrow \pi(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, x_0) =$$


$$= \begin{cases} \mathbb{Z}, n = 1 (\text{se verá...}) \\ \{1\}, n \geq 2 (\mathbb{S}^n, n \geq 2 \text{ simple-conexa}) \end{cases}$$

2. Dibujos en  $\mathbb{R}^2 \setminus \{c\}$  de retracciones sobre curvas “alrededor” del “agujero”  $c$ :




3. Dos agujeros  $\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\}$ .

Se trocea el espacio en cerrados, en cada uno de los cuáles se hace una deformación, de manera que en las fronteras coincidan. En el dibujo se sombrean diferentes las zonas en las que se usan deformaciones diferentes. Las deformaciones más cómodas son las interpolaciones de  $id$  y una retracción geométrica.



En este caso,  $\rho : \mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\} \rightarrow \infty?$  es deformación y  $\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\}, x_0) = \pi(\infty?) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$  (grupo fundamental de una lemniscata).

4. Otra variante:



$\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\} \rightarrow dibujo$  deformación dice que:

$$\pi(dibujo) = \pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\}, x_0) = \pi(\underbrace{\infty?}_{=\mathbb{Z} * \mathbb{Z}})$$

que es igual al grupo fundamental, pero no homeomorfismo.

5. Aún más ejemplos así (ya sin especificar el punto base):

$$\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b, c\}) = \pi(dibujo) = \pi(dibujo) = \pi(dibujo) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Demostración: (creo)

Cualesquiera tres puntos en  $\mathbb{R}^2$  se pueden recolocar con homeomorfismos para hacer, a partir de ellos, retracciones sobre las curvas dibujadas, no homeomorfas. (?)


Ejercicio: Deformar  $\mathbb{RP}^2 \setminus \{a\}$  sobre una circunferencia, para obtener  $\pi(\mathbb{RP}^2 \setminus \{a\}) = \mathbb{Z}$ .

# RECUBRIDORES

---

## EL PROBLEMA DE ELEVACIÓN

Fijada  $p$ , qué  $f$ 's tienen elevación  $\tilde{f}$ . i.e:  $p \circ \tilde{f} = f$



### Definición

$p$  es un recubridor si  $\forall x \in X$ ,  $\exists \underbrace{U^x}_{\text{ab. trivializante}} : p^{-1}(U^x) = \bigsqcup_{\lambda} U_{\lambda}$  y  $\forall \lambda, p| : U_{\lambda} \rightarrow U^x$  homeomorfismo.

Es un tipo especial de homeomorfismo local sobrejetivo y, por eso, identificación abierta.

Ejemplo: (¡Importantes!)


1. La identificación antipodal,  $\pi : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^n$ ,

$$\forall x \in \mathbb{R}\mathbb{P}^n \quad \exists \underbrace{U^x}_{\text{trivializante}} = \mathbb{R}\mathbb{P}^n \setminus \underbrace{H}_{\text{hiperplano}} \quad \wedge \quad \pi^{-1}(U^x) = \mathbb{S}^n \setminus \pi^{-1}H = S_+ \sqcup S_-$$

hemisferios abiertos.

Ya se ilustró convenientemente en su lección. ¿Qué se tiene para  $n = 1$ ?

2. La identificación exponencial,  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 : \theta \mapsto e^{2\pi i \theta} = (\cos 2\pi\theta, \sin 2\pi\theta)$ .



# UNICIDAD DE ELEVACIÓN

## Proposición

*Si  $Z$  es conexo, dos elevaciones que coinciden en algún puntos son iguales.*

Demostración:

$$A = \{z \in Z : \tilde{f}_1(z) = \tilde{f}_2(z)\}, p \circ \tilde{f}_1 = f.$$

$$\begin{aligned} \underbrace{x}_{\tilde{f}(z)} \in U^x, p^{-1}U^x = \bigsqcup_{\lambda} U_{\lambda} \text{ (trivialización)} \Rightarrow \tilde{f}_i(z) \in p^{-1}U^x \wedge \exists! \lambda_i : \tilde{f}_i(z) \in U_{\lambda_i} \\ \Rightarrow \forall \eta \in W^z = \tilde{f}_1^{-1}(U_{\lambda_1}) \cap \tilde{f}_2^{-1}(U_{\lambda_2}) : \hat{f}_1(\eta) = \hat{f}_2(\eta) \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \lambda_1 = \lambda_2 (**). \end{aligned}$$

(\*) debido a:

- $\Rightarrow$ )  $U_{\lambda}$ 's disjuntos.
- $\Leftarrow$ )  $p\tilde{f}_1 = p\tilde{f}_2$  y  $p|_{U_{\lambda}}$  1-1.

Por tanto,

$$\begin{aligned} \underbrace{\text{Ab.}}_A W^z \subset A \text{ si } z \in A : \tilde{f}_1(z) = \tilde{f}_2(z) \stackrel{(**)}{\Rightarrow} \lambda_1 = \lambda_2 \Rightarrow \tilde{f}_1(W^z) \wedge \tilde{f}_2(W^z) \subset U_{\lambda_1} = U_{\lambda_2} \xrightarrow[p|]{\text{iny.}} \underbrace{U^x}_{\text{iny.}} \\ \Rightarrow \forall \eta \in W^z : \tilde{f}_1(\eta), \tilde{f}_2(\eta) \mapsto \tau?(z) \Rightarrow \tilde{f}_1(\eta) = \tilde{f}_2(\eta). \end{aligned}$$

y,

$$\begin{aligned} \underbrace{\text{Cerr.}}_A W^z \subset Z \setminus A \text{ si } z \notin A : \tilde{f}_1(z) \neq \tilde{f}_2(z) \stackrel{(**)}{\Rightarrow} \lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \tilde{f}_1(W^z) \cap \tilde{f}_2(W^z) \subset U_{\lambda_1} \cap U_{\lambda_2} = \emptyset \\ \Rightarrow \forall \eta \in W^z : \tilde{f}_1(\eta) \neq \tilde{f}_2(\eta). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\exists \tilde{f}_1(z) = \tilde{f}_2(z) \Rightarrow \emptyset \neq A \underset{\text{cerr.}}{\subset}^{\text{ab.}} Z \text{ conx.} \Rightarrow A = Z \wedge \tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$$

# LEMA DE ELEVACIÓN

## Proposición

*Tenemos que:*

$$\begin{cases} f = H : Y \times [0, 1] \rightarrow X \text{ (homotopía)} \\ \exists \tilde{H}_0 \text{ elevación de } H_0 : Y \rightarrow X \end{cases} \Rightarrow \exists \tilde{H} \text{ elevación, } (\tilde{H})_0 = \tilde{H}_0$$

Demostración:

1. Elevación semilocal:  $\forall y \in Y, \tilde{H}^y : V^y \times [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$  elevación de  $H|_{V^y \times [0, 1]}$ .

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \{y\} \times [0, 1] \subset \bigcup_x H^{-1}(U^x), p^{-1}U^x = \bigsqcup_{\lambda} U_{\lambda} \text{ (trivialización en } x) \Rightarrow \\ & \xrightarrow{\text{comp.}} \exists 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_r = 1 : \{y\} \times [t_{i-1}, t_i] \subset H^{-1}(U^{x_i}) \\ & \xrightarrow{\text{comp.}} \forall i, \exists V_i^y \times [t_{i-1}, t_i] \subset H^{-1}(U^{x_i}) \\ & \Rightarrow \exists V^y = V_1^y \cap \dots \cap V_r^y : V^y \times [t_{i-1}, t_i] \stackrel{(*)}{\subset} H^{-1}(U^{x_i}). \end{aligned}$$

b) Inducción,  $i > 0 : \exists \tilde{H}_0 : V^y \times \{t_0\} \rightarrow \tilde{X}$  por hipótesis.

$$\begin{aligned}
 & \underline{i-1 \rightarrow i : \exists H_{i-1}^y \text{ en } V^y \times [t_0, t_{i-1?}] \Rightarrow \text{se puede extender a } V^y \times [t_{i-1}, t_i]} \\
 (*) \Rightarrow & \left\{ \begin{array}{l} H(y, t_{i-1}) \in U^{x_i} \xrightarrow{\exists \lambda} \tilde{H}_{i-1}^y(y, t_{i-1}) \in U_\lambda \xrightarrow{\text{red. } V^y} \\ \hat{H}_{i-1}^y(V^y \times (t_{i-1})) \subset U_\lambda \rightarrow U^{x_i} \\ \exists (p|_{U_\lambda}^{-1}) \circ H : V^y \times [t_{i-1}, t_i] \rightarrow U_\lambda \text{ elevación (de } H) \end{array} \right. \\
 \Rightarrow & p \circ \tilde{H}_{i-1}^y = p \circ [(p|_{U_\lambda}^{-1} \circ H)] : V^y \times \{t_{i-1}\} \rightarrow U^{x_i} \\
 \xrightarrow{p|_{U_\lambda} \text{ iny.}} & \tilde{H}_{i-1}^y = (p|_{U_\lambda})^{-1} \circ H \text{ en } V^y \times \{t_{i-1}\} \\
 \Rightarrow & (p|_{U_\lambda}^{-1}) \circ H \text{ extiende } \tilde{H}_{i-1}^y \text{ a } V^y \times [t_{i-1}, t_i].
 \end{aligned}$$

2. Elevación global. Las locales  $\{\tilde{H}^y : V^y \times [0, 1] \rightarrow \tilde{X}\}_{y \in Y}$  encolan bien, pues coinciden en las intersecciones:  $\forall y \in V^{y_1} \cap V^{y_2}$ :

Observación:

1. La elevación de una aplicación  $Y \rightarrow X$  sólo depende de su clase de homotopía.
2. Todo camino  $\sigma : [0, 1] \rightarrow X$  tiene una única elevación  $\tilde{\sigma}$  con origen  $\tilde{\sigma}(0) \in p^{-1}(\sigma(0))$ .

$$\left. \left\{ \begin{array}{l} \tilde{H}^{y_1}(y, \bullet) \\ \tilde{H}^{y_2}(y, \bullet) \end{array} \right\} \text{ elevan } H(y, \bullet) : \{y\} \times [0, 1] \\ \tilde{H}^{y_1}(y, 0) = \tilde{H}_0(y) = \tilde{H}^{y_2}(y, 0) \quad 1^{\text{er}} \text{ paso ind.} \right\} \xrightarrow{\text{Uni. elevación.}} \tilde{H}^{y_1}(y, t) = \tilde{H}^{y_2}(y, t), \forall z$$



# CÁLCULOS MEDIANTE RECURRIDORES

---

Hemos visto ya que:

- $\pi(\text{estrellado}) = \{1\}$ ,  $\pi(\mathbb{S}^n) = \{1\}$ ,  $n \geq 2 \Rightarrow \pi(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \{1\}$ .
- $\pi(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Z}_2$ ,  $n \geq 2$  (no demostrado)
- $\pi(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$  (no demostrado).
  - $\pi(\text{toro}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ,  $\pi(\text{cilindro}) = \mathbb{Z}$ .
  - $\pi(\text{banda de Möbius}) = \mathbb{Z}$ ,  $\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{a\}) = \mathbb{Z}$ .

Ahora toca demostrar  $\pi(\mathbb{P}^n)$  y  $\pi(\mathbb{S}^1)$ .

## ESPACIOS PROYECTIVOS REALES

### Teorema

$$\pi(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Z}_2, n \geq 2$$

#### Demostración:

Usamos el recubridor antipodal  $p : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{P}^n : \tilde{x}, -\tilde{x} \mapsto x = [\tilde{x}] = [-\tilde{x}]$ . Punto base en  $\mathbb{P}^n : x_0 = (0 : \dots : 1)$ ;  $\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{P}^n$ ,  $\sigma(0) = \sigma(1) = x_0$ ,  $\tilde{x}_0 = (0, \dots, 1)$ . Ahora, por el lema de elevación:


$$\Rightarrow \exists! \tilde{\sigma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^n, p\tilde{\sigma} = \sigma, \tilde{\sigma} = \tilde{x}_0 \wedge \tilde{\sigma}(1) \in p^{-1}(x_0) = \{\tilde{x}_0, -\tilde{x}_0\}$$

No veces? lazo.

$$1. \tilde{\sigma}(1) = \tilde{x}_0 \xrightarrow{\mathbb{S}^n \text{ simple conx.}} \exists \tilde{H}_s : \tilde{\sigma} \xrightarrow{x_0} \tilde{x}_0 \Rightarrow \exists p \circ \tilde{H}_s : \sigma \xrightarrow{x_0} x_0 \Rightarrow [\sigma] = 1 \in \pi(\mathbb{P}^n, x_0).$$

$$2. \tilde{\sigma}(1) = -\tilde{x}_0 \xrightarrow{\mathbb{S}^n \text{ simple conx.}} \exists \tilde{H}_s : \tilde{\sigma} \xrightarrow{\tilde{x}_0, -\tilde{x}_0} \tilde{\alpha} = (0, \dots, 0, \sin \pi t, \cos \pi t) \Rightarrow \exists p \circ H_s : \sigma \xrightarrow{x_0} \alpha = p \circ \tilde{\alpha}, \text{lazo de base } x_0, \alpha(0) = \alpha(1) = x_0.$$

3. Tenemos:



1. 2. 3.  $\Rightarrow \pi(\mathbb{P}^n, x_0)$  tiene dos elementos distintos dependiendo del extremo de la elevación  $\Rightarrow$

$$\boxed{\pi(\mathbb{P}^n, x_0) = \mathbb{Z}_2}.$$

## LA CIRCUNFERENCIA

### Teorema

$$\pi(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}.$$

Observación:

$$\mathbb{S}^1 = \mathbb{P}^1.$$

Demostración:

Usamos el recubridor exponencial  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 : \theta \mapsto (\cos 2\pi\theta, \sin 2\pi\theta)$ . Punto base  $x_0 \in \mathbb{S}^1, \forall \sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1, s(0) = \sigma(1) = x_0$ . Por el lema de elevación:

$$\Rightarrow \exists \tilde{\sigma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, p\tilde{\sigma} = \sigma \Rightarrow p\tilde{\sigma}(1) = \sigma(1) = \sigma(0) = p\tilde{\sigma}(0) \Rightarrow \tilde{\sigma}(1) = \tilde{\sigma}(0) + k, k \in \mathbb{Z}$$

### Teorema

El  $n^o$  de vueltas:

$$\begin{aligned} \# : \pi(\mathbb{S}^1, x_0) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ [\sigma] &\mapsto \#\sigma = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0). \end{aligned}$$

es isomorfismo de grupos bien definido.

Demostración:

1.  $k = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0)$  no depende de  $\tilde{\sigma}$ .

$$\begin{aligned} p\tilde{\tau} = \sigma = p\tilde{\sigma} \Rightarrow \tilde{\tau}(0) = \tilde{\sigma}(0) + l \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\tau} & \text{elevan } \sigma \\ \tilde{\sigma} + l & \text{coinciden} \\ & \text{en } t = 0 \end{cases} &\xrightarrow{\text{uni. elev.}} \tilde{\tau} = \tilde{\sigma} + l \\ \Rightarrow k = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0) = (\tilde{\tau}(1) - l) - (\tilde{\tau}(0) - l) &= \tilde{\tau}(1) - \tilde{\tau}(0). \end{aligned}$$

2.  $k$  no depende de homotopía de lazos, luego  $\#$  está bien definido. Sea  $H_s : \sigma \simeq \tau$  y  $H_s(1) = H_s(0), \forall s$ :

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \exists \tilde{H}_s : \tilde{\sigma} \simeq \tilde{\tau} \text{ entre elevaciones de } \sigma \wedge \tau \\ &\Rightarrow s \mapsto \underbrace{\tilde{H}_s(1)}_{\xrightarrow{p} H_s(1)} \setminus \underbrace{\tilde{H}_s(0)}_{\xrightarrow{p} H_s(0)} \in \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{cont.}} \tilde{H}_s(1) - \tilde{H}_s(0) \equiv cte. \\ &\Rightarrow k = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0) = \tilde{H}_0(1) - \tilde{H}_0(0) \stackrel{cte.}{=} \tilde{H}_1(1) - \tilde{H}_1(0) = \tilde{\tau}(1) - \tilde{\tau}(0). \end{aligned}$$

3.  $\#$  es isomorfismo. Sea  $\#\sigma = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0)$  y  $\#\tau = \tilde{\tau}(1) - \tilde{\tau}(0)$  y:

$$\begin{aligned}\tau(0) &= \tau(1) = p\tilde{\sigma}(1) \Rightarrow \tilde{\sigma}(1) \text{ cond. inicial elev.} \\ &\Rightarrow \exists \tilde{\tau} : \underline{\tilde{\tau}(0) = \tilde{\sigma}(1)} \Rightarrow \tilde{\sigma} * \tilde{\tau} = \sigma * \tilde{\tau}.\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\#\(\sigma * \tau) &= \sigma * \tilde{\tau}(1) - \sigma * \tilde{\tau}(0) = \tilde{\sigma} * \tilde{\tau}(1) - \tilde{\sigma} * \tilde{\tau}(0) = \tilde{\tau}(1) - \tilde{\sigma}(0) = \\ &= (\tilde{\tau}(1) - \tilde{\tau}(0)) + (\tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0)) = \#\tau + \#\sigma.\end{aligned}$$

4.  $\#$  es suprayectiva:

$$\#\(\cos 2\pi kt, \sin 2\pi kt) = kt|_0^1 = k$$

(Recorrer  $\mathbb{S}^1$   $k$  veces)

5.  $\#$  es 1-1:

$$0 = \#\sigma = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sigma(\tilde{1}) = \tilde{\sigma}(0) \Rightarrow \begin{cases} H_s(0) = p\tilde{\sigma}(0) = \sigma(0) = \sigma(0) = x_0 \\ H_s(1) = p\tilde{\sigma}(1) = \sigma(1) = x_0 \end{cases} \\ \underbrace{p((1-s)\tilde{\sigma}(t) + s\tilde{\sigma}(0))}_{H_s(t)} : \sigma \xrightarrow[\substack{(*) \\ (*)}]{} x_0 \end{array} \right\} (*)$$

$[\Rightarrow (\sigma) = 1 \in \pi(\mathbb{S}^1, x_0)]$



# APLICACIONES EN DIMENSIÓN 2

---

Veamos tres teoremas importantes que se pueden demostrar en dimensión 2 con lo que ya hemos visto del grupo fundamental.

## TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

### Teorema (Fundamental del Álgebra)

*Todo polinomio  $P(z) \in \mathbb{C}[z]$  tiene raíces complejas.*

Demostración:

Sea  $P(z) = z^d + a_1 z^{d-1} + \dots + \overbrace{a_d}^{\neq 0}$  (mónico después de dividir por el cof. director)

1. Tendremos:

$$P_s(z) = z^d + sa_1 z^{d-1} + \dots + sa_d = 0 \xrightarrow{0 \leq s \leq 1} |z| < 1 + |a_1| + \dots + |a_d| = r$$

$$P_s \neq 0 \xrightarrow{z \neq 0} \text{entre } z^{d-1} : -z = s \left( a_1 + \dots + \underbrace{s \frac{a_d}{z^{d-1}}}_{\neq 0} \right) \Rightarrow |z| \leq \begin{cases} 1, & |z| \leq 1 \\ |a_1| + \dots + |a_d|, & |z| \geq 1 \end{cases} .$$

$$\begin{aligned} 2. \ z(t) &= r(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \Rightarrow |z(t)| = r \Rightarrow \exists H_s(t) = \underbrace{\frac{P_s(z(t))}{|P_s(z(t))|}}_{\neq 0} \text{ por 1.} \\ &\Rightarrow (\cos 2\pi dt, \sin 2\pi dt) = \frac{z(t)^d}{|z(t)^d|} = H_0(t) \stackrel{\text{lazos: } z(0)=z(1)}{\simeq} H_1(t) \\ &= \frac{P(z(t))}{|P(z(t))|} = \sigma(t) \Rightarrow d = \#(\dots) = \#\sigma. \end{aligned}$$

$$3. \ P(z) \neq 0, \forall z \Rightarrow \exists G_s(t) = \frac{P(sz(t))}{|P(sz(t))|} : G_0 \equiv \underbrace{\frac{a_d}{|a_d|}}_{\text{lazos}} \simeq G_1 = \sigma \Rightarrow 0 = \#(\text{cte.}) = \#\sigma.$$

## TEOREMA DEL PUNTO FIJO DE BROUWER

### Teorema (de no retracto)

$\nexists$  retracto  $\rho : \mathbb{D}^2 = \{x^2 + y^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{S}^1$ .

Demostración:

Tenemos:

$$\exists \rho \Rightarrow \rho_* : \underbrace{\pi(\mathbb{D}^2)}_{\text{convexo}} \xrightarrow{\#_{\mathbb{Z}}} \underbrace{\pi(\mathbb{S}^1)}_{= \{0\}} \text{ sobre (15.1)}$$


### Teorema (del punto fijo)

$\forall f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$  continua,  $\exists p$  punto fijo  $x = f(x)$ .

Demostración:

Al absurdo?:  $x \neq f(x), \forall x \Rightarrow \exists \rho : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$  retracto.

Construcción de  $\rho$ :



La recta ( $x \neq f(x)$ ),  $r(x, f(x)) \cap \mathbb{S}^1 = \{a, b\} \Rightarrow \rho(x) = a = x + \lambda(x)(x - f(x))$ .

Ejercicio: Ecuación de  $\lambda$  y continuidad.


## TEOREMA DE LA ESFERA DE BROUWER

### Teorema (de la esfera de Brouwer)

$\nexists \eta : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  campo tangente continuo sin ceros. ( $\text{Tangente} \equiv \eta(x) \perp x, \forall x \in \mathbb{S}^2$ )

Demostración:

Con una ilustración:



Sea  $\exists \eta$  sin ceros  $\Rightarrow \exists \frac{\eta}{\|\eta\|}$  unitario  $\Rightarrow$  podemos suponer  $\|\eta\| = 1$ :

1.  $h : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2 \xrightarrow{\approx \text{hom.}} SO(3) = \{\text{matrices } 3 \times 3 \text{ ortogonales, } \det > 0\}$

$$(\alpha, \beta; x) \xmapsto{h} A = (u, v, u \times v) \begin{cases} u = x \\ v = \alpha \eta(x) + \beta(x \times \eta(x)) \end{cases}$$

Con  $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ ,  $\|x\| = 1$ . Bien definida, continua y biyectiva  $\xrightarrow{\text{compacto a } T_2}$  homeo.

2.  $h_* : \underbrace{\pi(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2)}_{=\mathbb{Z} \times \{1\}} \rightarrow \pi(SO(3))$  isomorfismo  $\Rightarrow \pi(SO(3)) = \mathbb{Z}$ .

3. Abracadabra?:  $SO(3) \xrightarrow{\text{homeo.}} \mathbb{P}^3 \Rightarrow \mathbb{Z} = \pi(SO(3)) = \pi(\mathbb{P}^3)$ .



# MÁS APLICACIONES POR EL MISMO PRECIO

---

Unos cuantos teoremas profundos más en dim = 2.


## BORSUK-ULAM

### Teorema (de Borsuk)

Sea  $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  impar ( $f(-x) = -f(x)$ ) :  $\#f(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$  impar ( $\Rightarrow \# \neq 0$ )

Demostración:

Tenemos que:



$\tilde{\sigma}$  elevación de  $\sigma(t) = f(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ .  $\begin{cases} x = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) & (*) \\ 0 \leq t \leq 1/2 \end{cases}$

$f(-x) = -f(x) \xrightarrow{(*)} \sigma(t + \frac{1}{2}) = -\sigma(t) \Rightarrow \tilde{\sigma}(t + \frac{1}{2}) = \tilde{\sigma}(t) + k_t + \frac{1}{2}$ . Como  $k_t \equiv cte.$  es continua:

$$\#\sigma = \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0) = \left( \tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}\left(\frac{1}{2}\right) + \tilde{\sigma}\left(\frac{1}{2}\right) - \tilde{\sigma}(0) \right) = \left( \underbrace{k_{1/2}}_{k_0} + \frac{1}{2} \right) + \left( k_0 + \frac{1}{2} \right) = 2k_0 + 1$$

Análogamente,

### Teorema (de Hirsch)

Sea  $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  par ( $f(-x) = f(x)$ ) :  $\#f(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$  par.

### Corolario (Teorema de Borsuk-Ulam)

$f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  impar  $\Rightarrow$  esencial.

Demostración:

$\exists H_s : f \simeq cte. \Rightarrow H_s(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) : \sigma \simeq x_0 \Rightarrow \#\sigma = 0$ , con  $\sigma$  rotación anterior y la homotopía de lazos.

### Corolario (2)

$\nexists g : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$  impar.

Demostración:

Tenemos:

$$\begin{array}{c} \text{Idem-} \\ \mathbb{S}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{S}^1 \\ \downarrow \sigma \quad \downarrow f = g \\ \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\text{base } (1,0,0) \text{ fijo}} (1,0,0) \\ (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \end{array}$$

■  $g$  impar  $\Rightarrow f$  impar  $\Rightarrow \#\sigma \neq 0$ .

■  $\mathbb{S}^2$  simple conexo  $\exists H_s : (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0) \xrightarrow{\text{base } (1,0,0) \text{ fijo}} (1,0,0)$ . Como  $f = g \circ \sigma = 0 \Rightarrow$

$$g \circ H_s : f \underbrace{(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)}_{\sigma} \simeq f(1,0,0) \text{ cte.} \Rightarrow \#\sigma = 0$$

### Corolario (3)

$\forall h : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \exists h(x) = h(-x) (\Rightarrow h \text{ no es 1-1})$ .

Demostración:

$h(x) \neq h(-x), \forall x \Rightarrow \exists g(x) = \frac{h(x) - h(-x)}{\|h(x) - h(-x)\|} : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$  impar.

## INVARIANZA DEL DOMINIO

### Teorema

Sea  $f : U_{ab.} \rightarrow \mathbb{R}^2$  continua y 1-1  $\Rightarrow f(U)$  es abierto.

Demostración:

$\forall a \in U, \exists V^{\text{ab.}} \subset \mathbb{R}^2 : f(a) \in V \subset f(U)$ . Por traslaciones:  $a = f(a) = 0$ . Con esto,  $\exists \varepsilon > 0 :$

$$B(0, \varepsilon) \subset B[0, \varepsilon] \subset U; 0 \notin S = S[0, \varepsilon] \xrightarrow{1-1} 0 = f(0) \in f(S) \Rightarrow \exists V = C(0) \overset{\text{c.c.}}{\subset} \mathbb{R}^2 \setminus f(S)$$

$S$  comp.  $\Rightarrow f(S)$  comp.  $\Rightarrow$  cerr. en  $\mathbb{R}^2$

$$\Rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ loc. conx.} \Rightarrow V \underset{\text{conx.}}{\subset} \mathbb{R}^2 \Rightarrow \text{c. caminos}(*).$$

Este  $V$  es la solución:  $V \subset f(B) \subset f(U)$ .

Al absurdo:  $\exists c \in V \setminus f(B) \xrightarrow{(*)} \exists \sigma : [0, 1] \rightarrow V, \sigma(0) = c, \sigma(1) = 0$ .

Denotamos,

$$g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto f(\varepsilon x); h : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto g(x) - g(-x)$$

y tenemos las homotopías:  $\mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1$ .

- $\frac{f(\varepsilon sx) - c}{\|\cdot\|} : \frac{-c}{\|\cdot\|} \simeq \frac{g - c}{\|\cdot\|}$ .
- $\frac{f(\varepsilon x) - \sigma(s)}{\|\cdot\|} : \frac{g - c}{\|\cdot\|} \simeq \frac{g}{\|\cdot\|}$ .
- $\frac{f(\varepsilon x) - f(-\varepsilon sx)}{\|\cdot\|} : \frac{g}{\|\cdot\|} \simeq \frac{h}{\|\cdot\|}$

Con esto,  $\frac{h}{\|\cdot\|} \simeq \text{cte.}!$  por Borsuk-Ulam.

Que los denominadores no se anulan es una comprobación rutinaria.

## DIVARIANZA DEL BORDE Y DE LA DIMENSIÓN

### Teorema

$$S, T \subset \mathbb{R}^2, h : S \xrightarrow{\text{homeo.}} T \Rightarrow h(S \setminus \overset{\circ}{S}) = T \setminus \overset{\circ}{T}.$$

Demostración:

$$h : \overset{\circ}{S} \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ inyectiva} \Rightarrow h(\overset{\circ}{S}) \underset{19,2}{\subset} \mathbb{R}^2 \Rightarrow h(\overset{\circ}{S}) \subset \overset{\circ}{T}. \text{ (el otro} \supset \text{ con } h^{-1})$$

Ejemplo:

$$S = T = \{x \geq 0\} \subset \mathbb{R}^2 \Rightarrow h(x = 0) = (x = 0).$$

### Teorema

$$U \underset{\text{ab.}}{\subset} \mathbb{R}^n, V \underset{\text{ab.}}{\subset} \mathbb{R}^2, h : U \xrightarrow{\text{homeo.}} V \Rightarrow n = 2.$$

Demostración:

$$\begin{aligned} \exists H \subset \mathbb{R}^n & [\text{plano afín interior vacío en } \mathbb{R}^n \text{ salvo si } n = 2] (*) : U \cap H \neq \emptyset \Rightarrow h| : \underbrace{U \cap H}_{\approx \text{ab.}} \xrightarrow{1-1} V \subset \\ \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{19,2} h(U \cap H) \underset{\text{ab.}}{\subset} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{h \text{ homeo.}} U \cap H = h^{-1}h(U \cap H) \underset{\text{ab.}}{\subset} U \xrightarrow{(*)} n = 2 \end{aligned}$$




# SUPERFICIES

## CONCEPTO

### Definición

Una superficie es un espacio localmente homeomorfo a  $\mathbb{R}^2$ . Supondremos siempre que es  $T_2$  y el II Ax., lo que implica que se puede sumergir en  $\mathbb{R}^n$  para  $n$  grande.

Nos interesan las superficies compactas. Las tres primeras son cocientes:



Ejercicio:  $\mathbb{P}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4 : (x_0 : x_1 : x_2) \mapsto \frac{(x_1^2 - x_2^2, x_0x_1, x_0x_2, x_1x_2)}{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2}$ .

Observación:

$P^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tiene siempre identificaciones adicionales (como el cross-cap?)

## SUMAS CONEXAS

El método genérico para construir superficies requiere el concepto un poco más general siguiente:

### Definición

Una superficie con borde es un espacio local homeomorfo a  $\{x \geq 0\} \subset \mathbb{R}^2$  y los puntos del borde se corresponden con  $\{x = 0\}$  (es una definición consistente por la inversa? del borde)



---

### Observación:

Sin los puntos del borde se tiene una superficie ordinaria.

### Ejemplo:

1. Un disco cerrado, que tiene por borde la circunferencia.
2. Una corona circular, una banda entre rectas paralelas, un tronco de cilindro.



Con este concepto podemos “hacer agujeros” en superficies y, con ellos, definir:

---

### **Definición**

*La suma conexa  $M \# M'$  de dos superficies  $M$  y  $M'$  se construye haciendo un agujero en cada una y pegando las superficies agujereadas por sus bordes:*

1. *Agujeros:  $B \subset M$  y  $B \subset M'$  (discos abiertos) con bordes  $S = \overline{B} \setminus B$  y  $S' = \overline{B'} \setminus B'$  (circunferencias).*
2. *Superficies agujereadas:  $M \setminus B$  y  $M' \setminus B'$  con los mismos bordes  $S$  y  $S'$ .*
3. *Pegando por los bordes:  $M \# M' = ((M \setminus B) + (M' \setminus B')) / (S \equiv S')$ .*



---

### **Proposición**

*La suma conexa está bien definida y no depende de los agujeros elegidos (salvo homeomorfismos).*

### Demostración:

Que efectivamente es una superficie ordinaria (sin borde) es fácil si elegimos los agujeros en abiertos de las superficies homeomorfas a  $\mathbb{R}^2$ . Luego, hay que ver que si cambiamos los agujeros obtenemos el mismo resultado (salvo homeomorfismo) y esto ya requiere resultados profundos como el teorema de Jordan-Schoenflies.

### **Proposición**

*La suma conexa es una operación asociativa conmutativa con elemento neutro la esfera.*

### Demostración:

Que  $(M \# M') \# M'' \approx M \# (M' \# M'')$  es fácil tomando agujeros bien separados. También es obvio que  $M \# M' \approx M' \# M$ . Finalmente:


$$M \# \mathbb{S}^2 = ((M \setminus B) + (\mathbb{S}^2 \setminus B')) / (S \equiv S') = ((M \setminus B) + B) / (S \equiv S') = M$$

pues  $\mathbb{S}^2 \setminus B'$  es un disco cerrado que restituimos a  $M$ .


## COCIENTES

Las sumas conexas se visualizan muy bien mediante identificaciones.

### 1. Suma conexa de toros:



### 2. Suma conexa de planos proyectivos:





# CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES

---

## EL TEOREMA


### Teorema

Toda superficie compacta es homeomorfa a una y sólo una entre:

$$\mathbb{S}^2; \quad \Pi^2 \# \cdots \# \Pi^2, k \geq 1; \quad \mathbb{P}^2 \# \cdots \# \mathbb{P}^2, k \geq 1$$

Las podemos dibujar:

- En  $\mathbb{R}^3$ :



- En  $\mathbb{R}^4$  (modelo en  $\mathbb{R}^3$ ):



El “solo una” del enunciado nos dice que estas superficies son todas distintas (no homeomorfismo): el grupo fundamental las distingue. Ya sabemos que  $\pi(\mathbb{S}^2) = \{1\}$ ,  $\pi(\Pi^2) = \mathbb{Z}^2$ ,  $\pi(\mathbb{P}^2) = \mathbb{Z}_2$  y los demás  $H_0$ ? son desiguales (aunque no sepamos calcularlos).

# LA RELACIÓN FUNDAMENTAL


En la lista del teorema de clasificación no hay sumas “mixtas”:  $\Pi^2 \# \mathbb{P}^2, \dots$ , pero el mismo teorema nos dice que están en la lista. Es claro que, por las propiedades de  $\#$ , cualquier suma conexa de  $\mathbb{S}^2, \Pi^2$  y  $\mathbb{P}^2$  estará en la lista en cuanto esté  $\Pi^2 \# \mathbb{P}^2$ . En efecto:

## Proposición


$$\mathbb{P}^2 \# \Pi^2 = \mathbb{P}^2 \# \mathbb{P}^2 \# \mathbb{P}^2.$$

Demostración:

“Cut & paste” típico de identificaciones. Como  $\mathbb{P}^2 \# \mathbb{P}^2 = \mathbb{K}^2$  (20.3) es la botella de Klein, el homeomorfismo que partiremos? es  $\mathbb{P}^2 \# \Pi^2 = \mathbb{P}^2 \# \mathbb{K}^2$  con:




1. Agujeros:




2. Pegados:



3. Cut & paste:



Obtenemos dos representaciones nuevas de  $\mathbb{P}^2 \# \mathbb{H}^2$  y  $\mathbb{P}^2 \# \mathbb{K}^2$ , con apariencias desiguales, pero topologías iguales: dos hexágonos con las mismas identificaciones de lados:



No dejarse engañar por los colores ni los sentidos de las flechas.

## GRUPOS FUNDAMENTALES CON UN AGUJERO

Aunque no podamos distinguir todas las superficies unas de otras porque no conocemos todos los grupos fundamentales, si podemos hacer algunas distinciones “haciendo agujeros”.


### Proposición

*Distinguimos:*


1.  $\pi(\mathbb{S}^2 \setminus \{a\}) = \pi(\mathbb{R}^2) = \{1\}$ .
2.  $\pi(\mathbb{H}^2 \# \dots \# \mathbb{H}^2 \setminus \{a\}) = \pi(\text{dibujo}^{2k}) = \mathbb{Z}^{*^{2k}}$ .
3.  $\pi(\mathbb{P}^2 \# \dots \# \mathbb{P}^2 \setminus \{a\}) = \pi(\text{dibujo}^k) = \mathbb{Z}^{*^k}$ .

Demostración:


Tenemos



Con  $k$  arbitrario es lo mismo:  $4k$  lados identificados por pares,  $4k$  vértices todos identificados. Por retracción radical desde un punto interior (el agujero), obtenemos la poligonal con esas mismas identificaciones. Al identificar los vértices se tiene un bouquet de  $4k$  pétalos y, al identificar pétalos por pares, un bouquet de  $2k$  pétalos.



$k = 3$ . Por *cut & paste*, los lados, pueden? sumar un proyectivo aporta? 2 lados identificados entre sí con tres vértices identificados todos (21.2).



Con  $k$  arbitrario es lo mismo: se empieza con un polígono de  $2k$  lados, que se retrae a una poligonal de  $2k$  lados, en la que se identifican los vértices para obtener un bouquet de  $2k$  pétalos, que se identifican por pares para tener un bouquet de  $k$ .

### Conclusión:

Todas las superficies se distinguen por el grupo fundamental después de quitar un punto, salvo los pares:

$$\Pi^2 \# \cdots \# \Pi^2 \wedge \mathbb{P}^2 \# \cdots \# \mathbb{P}^2 = \mathbb{K}^2 \# \cdots \# \mathbb{K}^2$$

para cada  $k \geq 1$ . El primer caso (y el esencial) es que el toro y la botella de Klein no son homeomorfos: La razón de fondo es la orientabilidad, que no hemos estudiado aquí.

En general:

- Cualquier  $\mathbb{P}^n \# \cdots \# \mathbb{P}^2$  contiene una banda de Möbius (de hecho, tantas como sumandos) y la banda es no orientable.
- Cualquier  $\Pi^2 \# \cdots \# \Pi^2$  es orientable, luego cualquier abierto suyo lo es, luego no puede contener una banda de Möbius.

# GRANDE FINALE

Vamos a probar que la esfera no es contrátil, utilizando el teorema de la esfera de Brouwer (18.3) y las ideas sobre vectores tangentes allí vistas:

## Proposición

$\mathbb{S}^2$  no es contráctil:  $\#H_t : \text{cte.} \simeq id_{\mathbb{S}^2}$ .

Demostración:

Absurdo: sea que  $\exists H_t : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ ,  $H_0(x) = x_0$ ,  $H_1(x) = x$ .

### 1. Problema de elevación:

Problema de elevación

Sea  $\tilde{H}$  un receptor para  $x$  planta ideal

?  $\exists \tilde{H} : \tilde{B}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{S}^2 \times (\Omega^2 \setminus \{0\}) : x \perp y\}$

$\mathbb{S}^2 \times \Omega^2 \setminus \{0\} \xrightarrow{H} \mathbb{S}^2 \quad x \quad \exists \tilde{H} \Rightarrow \tilde{H}_y(x) = (H_y(x), u_y(x)), \quad u_y(x) \perp H_y(x)$


$\begin{bmatrix} \{x \in \mathbb{S}^2 : T_x \mathbb{S}^2 \perp \{0\}\} \\ \text{Núm. tang a } \mathbb{S}^2 \text{ en } x \end{bmatrix} \Rightarrow \exists u_y(x) \perp H_y(x) = x$

Véase pues que  $\exists \tilde{H}$

campo tangente a la esfera sin ceros  
entre el teo de Brouwer

## 2. Estructura de $\tilde{\mathbb{S}}^1$ :

Como esquema tenemos,



Así,  $c = (0, 0, 1)$ ,  $U = \mathbb{S}^2 \setminus \{c\} = \{x_3 \neq 1\}$ ,  $-U : \mathbb{S}^2 \setminus \{-c\} = \{x_3 \neq -1\}$ .

En  $U : x_3 \neq 1$ ,  $\{\eta(x) = (1 - x_3 - x_1^2, -x_1 x_2, x_1(1 - x_3)), \eta(x) = x \times \eta(x)\}$  base de  $T_x \mathbb{S}^2$  ortogonal.  $\Rightarrow \forall \underbrace{u}_{\neq 0} \perp x : u = \lambda(u, x)\eta(x) + \mu(u, x)\eta(x)$ .

$$\begin{cases} \lambda(u, x) = \langle u, \eta(x) \rangle / \|\eta(x)\|^2 \\ \mu(u, x) = \langle u, \eta(x) \rangle / \|\eta(x)\|^2 \end{cases} \quad \text{cond's ?? continuas.}$$

En  $-U : x_3 \neq -1$  igual con  $\eta(x) = (1 + x_3 - x_1^2, -x_1 x_2, -x_1(1 + x_3))$ .

3. Preparación local: Igual que en 16,2 para la elevación de recubridores:

$$\forall x \in \mathbb{S}^2, \exists W^x \overset{\text{ab.}}{\subset} \mathbb{S}^2, \exists 0 = t_0 < \dots < t_r = 1 : W^x \times [t_{i-1}, t_i] \subset H^{-1}(U) \text{ ó } H^{-1}(-U)$$

reducción  $W^x \supset \overline{V^x} \supset V^x$ .

¡La partición depende de  $x!$   $\Rightarrow \mathbb{S}^2 \text{ comp.} \mathbb{S}^2 = V^{x_1} \cup \dots \cup V^{x_v}$  y juntamos las  $v$  particiones.

$$\Rightarrow \mathbb{S}^2 = V_1 \cup \dots \cup V_v \wedge \exists 0 = t_0 < \dots < t_r = 1 : H \left( \overbrace{W_k}^{\supset \overline{V}_k \supset V_k} \times [t_{i-1}, t_i] \right) \subset U \text{ ó } -U.$$

Objetivo: construir la elevación  $\tilde{H}$  en pasos sucesivos:

- dada  $\tilde{H}_t$  para  $0 \leq t \leq t_{i-1}$  extenderla a  $t_{i-1} \leq t \leq t_i$ , es decir,
- dada  $\tilde{H}_{t_{i-1}}$  extenderla a  $t_{i-1} \leq t \leq t_i$ .

Para empezar en  $i = 1$ :

$$\tilde{H}_{t_0}(x) = \tilde{H}_0(x) = (H_0(x), u_0(x)) = (x_0, u_0), \text{ cualquier } \overbrace{u_0}^{\neq 0} \perp x_0$$

El paso inductivo da más trabajo y para simplificar un escalamiento permite suponer  $[t_{i-1}, t_i] = [0, 1]$  y  $H(W_k \times [0, 1]) \subset U \text{ ó } -U \forall k(*)$ . Queremos:

- dada  $\tilde{H}_0$  extenderla a  $0 \leq t \leq 1$

Demostración:

$$\tilde{H}_0 = \tilde{H}_{t_{i-1}} \text{ no es la elevación de } i = 1.$$

4. Descomposición de la extensión en varios pasos: Tomamos  $C_k = \mathbb{S}^2 \setminus V_k$  y,

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \varphi_k(x) &= \frac{\text{dist}(x, C_k)}{\sum_l \text{dist}(x, C_k)} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi_k \leq 1 \\ \{\varphi_k = 0\} = C_k \quad \text{por ser los } C_k \text{ cerrados.} \\ \sum_l \varphi_l = 1 \end{cases} \\ \text{b)} \quad \psi_k &= \varphi_1 + \dots + \varphi_k \Rightarrow \begin{cases} 0 \equiv \psi_0 \leq \psi_1 \leq \dots \leq \psi_k \equiv 1 \\ \{\psi_{k-1} < \psi_k\} = \{\varphi \neq 0\} = X \setminus C_k = V_k \\ \overline{\{\psi_{k-1} < \psi_k\}} = \overline{V_k} \subset W_k \end{cases} \end{aligned} \quad (*)$$

Las  $\psi_k$  son los límites superiores de la siguiente cadena de cerrados:

$$\mathbb{S}^2 \times \{0\} = \Gamma_0 \subset \Gamma_1 \subset \dots \subset \Gamma_k = \{t \leq \psi_k(x) : x \in \mathbb{S}^2\} \subset \dots \subset \Gamma_v = \mathbb{S}^2 \times [0, 1]$$

y, empezando con  $\tilde{H}_0$  para  $k = 1$ , la cosa es:


- dada  $\tilde{H}^{k-1} = (r, u^{k-1})$  elevación de  $H|_{\Gamma_{k-1}}$ , extenderla a  $\Gamma_k \setminus \Gamma_{k-1}$ . Como:

$$\begin{cases} \Gamma_{k-1} \setminus \overline{V}_k \times [0, 1] \stackrel{(**)}{=} \Gamma_k \setminus \overline{V}_k \times [0, 1] = A \overset{\text{ab.}}{\subset} \Gamma_k \\ \Gamma_{k-1} \cap (W_k \times [0, 1]) = B \overset{\text{ab.}}{\subset} \Gamma_k \end{cases} \quad \wedge \quad \Gamma_k = \underbrace{A}_{\subset \Gamma_{k-1}} \cup B$$

definiremos,

- $\tilde{H}^k$  en  $B$  tal que,  $\tilde{H}^k = \tilde{H}^{k-1}$  en  $A \cap B \subset \mathbb{S}^2 \setminus V_k \times [0, 1]$ .

$$5. \quad (x, t) \in B \xrightarrow{(*)} \begin{cases} H_t(x) \in U \\ H_{\psi_{k-1}(x)}(x) \in U \end{cases} \Rightarrow \exists \eta \text{ y } S \text{ en } \begin{cases} H_t(x). \text{ (ii)} \\ H_{\psi_{k-1}(x)}(x). \text{ (i)} \end{cases}.$$



$$\text{a)} \quad t \leq \psi_{k-1}(x) : (x, t) \in \Gamma_{k-1} \Rightarrow \tilde{H}_t^k(x) = \tilde{H}_t^{k-1}(x).$$

$$\underline{b}) \quad t \geq \psi_{k-1}(x) : \tilde{H}^{k-1} = (H, u^{k-1}).$$

(i)  $\Rightarrow$

$$\underbrace{u_{\psi_{k-1}(x)^{k-1}(x)}}_{\neq 0} = \lambda_{\psi_{k-1}(x)}(x) \eta(H_{\psi_{k-1}(x)}(x)) + \psi_{k-1}(x)(x) \zeta(H_{\psi_{k-1}(x)}(x)).$$

(ii)  $\uparrow$

$$\begin{aligned}\exists u_t^k(x) &= \lambda_{\psi_{k-1}(x)}(x)\eta(H_t(x)) + \mu_{\psi_{k-1}(x)}(x)\zeta(H_t(x)) \\ &\Rightarrow \exists \tilde{H}_t^k(x) = (H_t(x), u_t^k(x)).\end{aligned}$$

y por la construcción es continua.

a) y b) coinciden en  $t = \psi_{k-1}(x)$ .

$$6. \psi_{k-1} \stackrel{(**)}{=} \psi_k \text{ fuera de } V_k \Rightarrow \tilde{H}^k \text{ de 5.} = \tilde{H}^{k-1} \text{ en } A \cap B.$$

Esto completa la propuesta de que  $\exists \tilde{H}$  elevación de  $H$  y, con ello, se completa la contradicción buscada. Acaba aquí la demostración de que  $\mathbb{S}^2$  no es contráctil.