

Estudio sobre los Cristales

Mario Álvarez Martínez, Jorge Aranda Honrubia, Pablo de Puelles Carceles, Julia Ruiz Picó, Cristina T

2026-02-18

Exploración y preparación de la BBDD [3 páginas máximo]

Descripción y naturaleza de las variables

```
##          variable      tipo
## RI          RI      numerical
## Na          Na      numerical
## Mg          Mg      numerical
## Al          Al      numerical
## Si          Si      numerical
## K           K       numerical
## Ca          Ca      numerical
## Ba          Ba      numerical
## Fe          Fe      numerical
## Type        Type     numerical
## hardness    hardness numerical
## color        color    categorical
## transparency transparency categorical
## id           id       numerical
## density      density   numerical
## thermal_exp thermal_exp numerical
```

Variables constantes o casi constantes

Comprobaremos ahora si existe alguna variable que no varía (o que varía muy poco) y la eliminaremos también de la base de datos, ya que no se tratará de una variable aleatoria y no tiene sentido incluirla en el análisis estadístico. Esto se comprueba de forma diferente para las variables numéricas y para las variables categóricas.

En el caso de las variables numéricas, podemos calcular su desviación típica. Como la desviación típica depende de las unidades de medida y de la magnitud de la variable, es más aconsejable utilizar el coeficiente de variación.

Para las variables categóricas, obtendremos una tabla de frecuencias para comprobar si toman distintos valores.

```
##          RI          Na          Mg          Al
## Min.    :1.511  Min.    :10.73  Min.    :0.000  Min.    :0.290
## 1st Qu.:1.517  1st Qu.:12.94  1st Qu.:1.750  1st Qu.:1.183
## Median :1.518  Median :13.34  Median :3.465  Median :1.355
## Mean    :1.519  Mean    :13.44  Mean    :2.598  Mean    :1.442
## 3rd Qu.:1.520  3rd Qu.:13.89  3rd Qu.:3.618  3rd Qu.:1.630
## Max.    :1.534  Max.    :17.38  Max.    :4.490  Max.    :3.500
##
```

```

##           Si           K           Ca           Ba
## Min.      :69.81   Min.      :0.0000   Min.      : 5.430   Min.      :0.0000
## 1st Qu.:72.19   1st Qu.:0.1100   1st Qu.: 8.325   1st Qu.:0.0000
## Median :72.78   Median :0.5500   Median : 8.675   Median :0.0000
## Mean      :72.61   Mean      :0.4932   Mean      : 9.047   Mean      :0.1895
## 3rd Qu.:73.07   3rd Qu.:0.6000   3rd Qu.: 9.418   3rd Qu.:0.0000
## Max.      :75.41   Max.      :6.2100   Max.      :16.190   Max.      :3.1500
##
##           Fe           Type           hardness           id
## Min.      :0.00000   Min.      :1.000   Min.      :1.000   Min.      : NA
## 1st Qu.:0.00000   1st Qu.:1.000   1st Qu.:2.000   1st Qu.: NA
## Median :0.00000   Median :2.000   Median :4.000   Median : NA
## Mean      :0.05478   Mean      :2.412   Mean      :3.758   Mean      :NaN
## 3rd Qu.:0.09750   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.: NA
## Max.      :0.51000   Max.      :5.000   Max.      :7.000   Max.      : NA
##                                     NA's      :182
##           density           thermal_exp
## Min.      :1.991   Min.      : 5.197
## 1st Qu.:2.358   1st Qu.: 7.971
## Median :2.487   Median : 9.033
## Mean      :2.499   Mean      : 9.018
## 3rd Qu.:2.617   3rd Qu.:10.046
## Max.      :3.028   Max.      :12.172
##
##           RI           Si           Na           density thermal_exp           Ca
## 0.002089285 0.011297771 0.063155740 0.077034630 0.165150703 0.165275035
##           Al           hardness           Mg           Type           K           Fe
## 0.355153852 0.507853168 0.571899760 0.592820556 1.420877170 1.759191850
##           Ba
## 2.735458238
##           color transparency
## [1,] 124 13
## [2,] 27 41
## [3,] 31 128
##           color transparency
## [1,] 68.13 7.14
## [2,] 14.84 22.53
## [3,] 17.03 70.33

```

Por ahora se decide no eliminar ninguna variable.

Análisis descriptivo

Valores inconsistentes o anómalos

Analizaremos ahora si alguna variable tiene valores inconsistentes, es decir, valores que no son posibles dentro del rango de definición de la variable y que por tanto se deben a un error. En ese caso, estos valores se sustituirán por NA convirtiéndose en valores faltantes o perdidos. Los valores inconsistentes se pueden observar tanto en variables numéricas como categóricas.

También estudiaremos la existencia de posibles valores anómalos en las variables numéricas. A veces, estos valores anómalos pueden deberse a un error (serían valores inconsistentes y se sustituirían por NA). Pero otras veces, los valores anómalos son valores posibles pero muy atípicos o extremos. En este último caso, debemos

tomar la decisión de mantener la observación anómala en el modelo o eliminarla (no se reemplaza el valor anómalo por NA, sino que se elimina el registro completo).

En esta práctica, estudiaremos los valores anómalos desde el punto de vista univariante (se analiza cada variable por separado). Veremos en la Práctica 1 cómo utilizar el Análisis de Componentes Principales (PCA) para estudiar los valores anómalos desde el punto de vista multivariante.

El resumen descriptivo de las variables categóricas (tablas de frecuencias anteriores) no mostró ningún valor inconsistente.

A continuación se estudian gráficamente las variables numéricas. En primer lugar se realiza un gráfico de cajas y bigotes con todas las variables numéricas. Sin embargo, dado que cada una tiene rangos diferentes, se representan los datos en escala logarítmica para mitigar un poco dichas diferencias y poder visualizarlas mejor. Después, realizaremos gráficos individuales para algunas de las variables que más llaman nuestra atención en este gráfico de cajas y bigotes múltiple.

Análisis de Componentes Principales [5 páginas máximo]

Tratamiento de los datos

Selección del número de componentes principales

Validación del modelo

Interpretación del modelo

Conclusiones

Reglas de asociación [OPCIONAL. 2 páginas máximo]

Análisis Factorial de Correspondencias [OPCIONAL. 2 páginas máximo]