





## ESAME DEL 2/02/2024

Sia  $\{X_n; n \geq 1\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 1-q & q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad q \in [0, 1]$$

D11) Sia  $q=0$ . Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)}$ , dopo aver motivato l'esistenza di tale limite.

Soluzione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché  $1 \rightarrow 2$  e  $2 \rightarrow 1$ ,  $\{1, 2\}$  è una classe chiusa e la sottocatena è irriducibile e inoltre è regolare in quanto  $p_{11} > 0$ , quindi per il teorema di Markov  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2$ .

Calcoliamo  $(\pi_1, \pi_2)$  stazionaria della sottocatena  $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{aligned} (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= (\pi_1, \pi_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi_1}{2} + \frac{\pi_2}{2} = \pi_1 \\ \frac{\pi_1}{2} = \pi_2 \end{cases} \Leftrightarrow \pi_1 = 2\pi_2 \quad \text{inoltre } \pi_1 = 1 - \pi_2 \\ \Rightarrow 1 - \pi_2 &= 2\pi_2 \Leftrightarrow 1 = 3\pi_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \pi_2 = \frac{1}{3} \\ \pi_1 = \frac{2}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

In conclusione,  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = \frac{1}{3}$ .



D12) Sia  $q \neq 0$ . Calcolare la probabilità di passaggio (assorbimento) nello stato 4 partendo da ciascuno degli stati 1, 2, 3.

### Soluzione

$$S = \{4\}, D_S = \{1, 2, 3\} \Rightarrow \forall i \in D_S, \lambda_i = \sum_{j \in S} P_{ij} + \sum_{j \in D_S} P_{ij} \lambda_j$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = P_{14} + P_{11}\lambda_1 + P_{12}\lambda_2 + P_{13}\lambda_3 \\ \lambda_2 = P_{24} + P_{21}\lambda_1 + P_{22}\lambda_2 + P_{23}\lambda_3 \\ \lambda_3 = P_{34} + P_{31}\lambda_1 + P_{32}\lambda_2 + P_{33}\lambda_3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{\lambda_1}{2} + \frac{\lambda_2}{2} \Leftrightarrow \frac{\lambda_1}{2} = \frac{\lambda_2}{2} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_2 = (1-q)\lambda_1 + q\lambda_3 \Leftrightarrow \lambda_2 = (1-q)\lambda_1 + q\frac{\lambda_3}{12} \Leftrightarrow 1-(1-q)\lambda_2 = \frac{q\lambda_3}{20} \quad (*) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = \frac{13}{40} + \frac{\lambda_3}{2} \Leftrightarrow \frac{\lambda_3}{2} = \frac{13}{40} \Leftrightarrow \lambda_3 = \frac{13}{20} \end{cases}$$

$$(*) \quad q\lambda_2 = \frac{q\lambda_3}{20} \Leftrightarrow \lambda_2 = \frac{\lambda_3}{20}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{13}{20}, \quad \lambda_2 = \frac{13}{20}, \quad \lambda_3 = \frac{13}{20}$$



## ESAME DEL 20/02/2024

Sia  $\{X_n : n \geq 1\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 7/10 & 3/10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1-q}{4} & \frac{1-q}{4} & q & \frac{1-q}{4} & \frac{1-q}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & \frac{3q}{4} & \frac{3-3q}{4} & 1/4 \end{pmatrix} \quad q \in [0, 2]$$

D1) Sia  $q=0$ . Giustificare l'esistenza di  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,j}^{(n)}$  per  $i, j \in \{4, 5\}$ , e verificare che si ottiene sempre lo stesso valore (per ogni scelta di  $i, j \in \{4, 5\}$ ).

### Soluzione

$$P = \begin{pmatrix} 7/10 & 3/10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & 1/4 \end{pmatrix} \quad \text{Dobbiamo calcolare i seguenti limiti:}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{44}^{(n)}, \lim_{n \rightarrow \infty} P_{45}^{(n)}, \lim_{n \rightarrow \infty} P_{54}^{(n)}, \lim_{n \rightarrow \infty} P_{55}^{(n)}$$

I stati  $\{4, 5\}$  costituiscono una classe chiusa, quindi la sottocatena associata è irriducibile e inoltre è regolare in quanto  $P_{44} > 0$  ( $P_{55} > 0$ ), quindi per il teorema di Markov

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{i4}^{(n)} = \pi_4 \text{ per } i = 4, 5 \text{ e } \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i5}^{(n)} = \pi_5 \text{ per } i = 4, 5.$$

Calcoliamo dunque la stazionaria  $(\pi_4, \pi_5)$  relativa alla sottocatena  $\begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$

$$(\pi_4, \pi_5) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix} = (\pi_4, \pi_5) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi_4}{4} + \frac{3\pi_5}{4} = \pi_4 \\ \frac{3\pi_4}{4} + \frac{\pi_5}{4} = \pi_5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3}{4}\pi_5 = \frac{3}{4}\pi_4 \Leftrightarrow \pi_4 = \pi_5 \\ \frac{3}{4}\pi_4 = \frac{3}{4}\pi_5 \end{cases}$$



Inoltre vale anche  $\pi_4 = 1 - \pi_5 \Rightarrow 1 - \pi_5 = \pi_5 \Leftrightarrow 2\pi_5 = 1 \Leftrightarrow \pi_5 = \frac{1}{2}$   
 $\pi_4 = \frac{1}{2}$

In conclusione:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{2} \text{ per ogni scelta di } i, j \in \{4, 5\}.$$

**D22)** Sia  $q=1$ . Calcolare i tempi medi di primo arrivo nello stato 3 partendo da ciascuno degli stati 1, 2, 4, 5.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & \frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Soluzione  $T = \{1, 2, 4, 5\}$  e  $T^c = \{3\}$

$$\mu_i = 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} \mu_j \quad \forall i \in T$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + p_{11}\mu_1 + p_{12}\mu_2 + p_{14}\mu_4 + p_{15}\mu_5 \\ \mu_2 = 1 + p_{21}\mu_1 + p_{22}\mu_2 + p_{24}\mu_4 + p_{25}\mu_5 \\ \mu_4 = 1 + p_{41}\mu_1 + p_{42}\mu_2 + p_{44}\mu_4 + p_{45}\mu_5 \\ \mu_5 = 1 + p_{51}\mu_1 + p_{52}\mu_2 + p_{54}\mu_4 + p_{55}\mu_5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu_1 = 1 + \frac{7}{10}\mu_1 + \frac{3}{10}\mu_2 \\ \mu_2 = 1 + \mu_4 \\ \mu_4 = 1 + \frac{1}{4}\mu_4 + \frac{3}{4}\mu_5 \\ \mu_5 = 1 + \frac{1}{4}\mu_5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{4}\mu_5 = 1 \Leftrightarrow \mu_5 = \frac{4}{3}$$

$$\mu_4 = 1 + \frac{1}{4}\mu_4 + 1 \Rightarrow \frac{3}{4}\mu_4 = 2 \Leftrightarrow \mu_4 = \frac{8}{3}$$

$$\mu_2 = 1 + \frac{8}{3} = \frac{11}{3}$$

$$\mu_1 = 1 + \frac{7}{10}\mu_1 + \frac{11}{3} \Rightarrow \frac{3}{10}\mu_1 = \frac{21}{10} \Leftrightarrow \mu_1 = 7.$$



## ESAME DEL 21/06/2024

Sia  $\{X_n; n \geq 1\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 & b_2 & b_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 1-c \\ 0 & 0 & 0 & c^2 & 1-c^2 \end{pmatrix} \quad \text{dove } a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c \in (0, 1) \text{ tali che}$$
$$a_1 + a_2 + a_3 = 1 \quad b_1 + b_2 + b_3 = 1$$

D11) Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)}$  dopo aver giustificato l'esistenza del limite.

Poiché  $\{4, 5\}$  è una classe chiusa, quindi la sottocatena relativa a  $\{4, 5\}$  è irriducibile e  $p_{55} > 0$  in quanto  $c \neq 0$  per il teorema di Markov  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)} = \pi_5$ .

Sia  $(\pi_4, \pi_5)$  la stazionaria relativa a  $\begin{pmatrix} c & 1-c \\ c^2 & 1-c^2 \end{pmatrix}$ .

$$(\pi_4, \pi_5) \begin{pmatrix} c & 1-c \\ c^2 & 1-c^2 \end{pmatrix} = (\pi_4, \pi_5) \Leftrightarrow \begin{cases} c\pi_4 + c^2\pi_5 = \pi_4 \\ (1-c)\pi_4 + (1-c^2)\pi_5 = \pi_5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1-c)\pi_4 = c^2\pi_5 \\ (1-c)\pi_4 = c^2\pi_5 \end{cases} \Rightarrow \pi_4 = \frac{c^2}{1-c} \pi_5 \Rightarrow 1 - \pi_5 = \frac{c^2}{1-c} \pi_5$$
$$\pi_4 = 1 - \pi_5$$

e inoltre  $\pi_4 = 1 - \pi_5$

$$\Leftrightarrow \left(1 + \frac{c^2}{1-c}\right) \pi_5 = 1 \Leftrightarrow \frac{1-c+c^2}{1-c} \pi_5 = 1 \Leftrightarrow \pi_5 = \frac{1-c}{1-c+c^2}$$

$$\pi_4 = \frac{c^2}{1-c+c^2} \quad \text{In conclusione, } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)} = \frac{1-c}{1-c+c^2}.$$



D12) Verificare che le probabilità di assorbimento in  $\{4, 5\}$  partendo da 2 e da 3 sono:

$$\lambda_2 = \frac{a_3 b_3}{a_1 b_1 + a_1 b_3 + a_3 b_3} \quad \text{e} \quad \lambda_3 = \frac{a_1 b_3 + a_3 b_3}{a_1 b_1 + a_1 b_3 + a_3 b_3}$$

Soluzione

$$S = \{4, 5\}, \quad D_S = \{2, 3\}$$

$$\forall i \in D_S, \quad \lambda_i = \sum_{j \in S} p_{ij} + \sum_{j \in D_S} p_{ij} \lambda_j \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \lambda_2 &= p_{24} + p_{25} + p_{22} \lambda_2 + p_{23} \lambda_3 \\ \lambda_3 &= p_{34} + p_{35} + p_{32} \lambda_2 + p_{33} \lambda_3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_2 = a_2 \lambda_2 + a_3 \lambda_3 \\ \lambda_3 = b_3 + b_1 \lambda_2 + b_2 \lambda_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (1 - a_2) \lambda_2 &= a_3 \lambda_3 & a_1 + a_2 + a_3 = 1 \Rightarrow 1 - a_2 &= a_1 + a_3 \\ (1 - b_2) \lambda_3 &= b_3 + b_1 \lambda_2 & b_1 + b_2 + b_3 = 1 \Rightarrow 1 - b_2 &= b_1 + b_3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (b_1 + b_3) \lambda_3 = b_3 + \frac{b_1 (a_3 \lambda_3)}{a_1 + a_3} \Rightarrow (b_1 + b_3) \lambda_3 = b_3 + \frac{a_3 b_1 \lambda_3}{a_1 + a_3}$$

$$\Rightarrow \left( b_1 + b_3 - \frac{a_3 b_1}{a_1 + a_3} \right) \lambda_3 = b_3 \Leftrightarrow \frac{(a_1 + a_3)(b_1 + b_3) - a_3 b_1}{a_1 + a_3} \lambda_3 = b_3$$

$$\Rightarrow \frac{a_1 b_1 + a_1 b_3 + a_3 b_3 - \cancel{a_3 b_1}}{a_1 + a_3} \lambda_3 = b_3$$

$$\Rightarrow \lambda_3 = \frac{a_1 b_3 + a_3 b_3}{a_1 b_1 + a_1 b_3 + a_3 b_3} \quad \lambda_2 = \frac{a_3 \lambda_3}{a_1 + a_3}$$

$$\lambda_2 = \frac{a_3}{a_1 + a_3} \cdot \frac{a_1 b_3 + a_3 b_3}{a_1 b_1 + a_1 b_3 + a_3 b_3} = \frac{a_3 b_3}{a_1 b_1 + a_1 b_3 + a_3 b_3}$$



## ESAME DEL 19/07/2024

Sia  $\{X_n : n \geq 1\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ q & 0 & 1-q \end{pmatrix} \text{ dove } q \in (0, 1)$$

Dim) Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ , per  $i, j \in E$  dopo aver giustificato l'esistenza del limite.

### Soluzione

La matrice  $P$  è irriducibile e poiché  $p_{11} > 0 \Rightarrow$  è anche regolare quindi per il teorema di Markov  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \forall i, j \in E$ .

Consideriamo l'unica stazionaria  $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$  di  $P$  :  $\pi = \pi P$

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ q & 0 & 1-q \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi_1}{3} + \frac{\pi_2}{3} + q\pi_3 = \pi_1 \\ \frac{\pi_1}{3} + \frac{\pi_2}{3} = \pi_2 \\ \frac{\pi_1}{3} + \frac{\pi_2}{3} + (1-q)\pi_3 = \pi_3 \end{cases} \text{ più la relazione}$$
$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\pi_1}{3} = \frac{2}{3}\pi_2 \\ q\pi_3 = \frac{\pi_1}{3} + \frac{\pi_2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_1 = 2\pi_2 \Rightarrow \frac{2q}{3q+1} \\ q\pi_3 = \frac{2}{3}\pi_2 + \frac{\pi_2}{3} = \pi_2 \Rightarrow \pi_3 = \frac{1}{q}\pi_2 = \frac{1}{3q+1} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \pi_1 = 1 - \pi_2 - \pi_3 \\ 2\pi_2 = 1 - \pi_2 - \frac{1}{q}\pi_2 \end{cases} \Rightarrow \left(2 + 1 + \frac{1}{q}\right)\pi_2 = 1 \Leftrightarrow \pi_2 = \frac{q}{3q+1}$$

$$\pi = \left( \frac{2q}{3q+1}, \frac{1}{3q+1}, \frac{q}{3q+1} \right) \Rightarrow \text{In conclusione : } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i1}^{(n)} = \frac{2q}{3q+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{i2}^{(n)} = \frac{1}{3q+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{i3}^{(n)} = \frac{q}{3q+1}$$



D12) Calcolare i tempi medi di primo passaggio per lo stato 3 partendo da 1 e da 2 rispettivamente.

$$T = \{1, 2\} \text{ e } T^c = \{3\}$$

$$\mu_i = 1 + \sum_{j \in T} P_{ij} \mu_j \quad \forall i \in T \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + \frac{1}{3}\mu_1 + \frac{1}{3}\mu_2 \\ \mu_2 = 1 + \frac{1}{3}\mu_1 + \frac{1}{3}\mu_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3}\mu_1 = 1 + \frac{1}{3}\mu_2 \\ \frac{2}{3}\mu_2 = 1 + \frac{1}{3}\mu_1 \end{cases}$$

$$\mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{3}\mu_1 + \frac{1}{3}\mu_2 = 1 + \frac{1}{3}\mu_1 + \frac{1}{3}\mu_2$$

$$\Leftrightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$\mu_1 = 1 + \frac{1}{3}\mu_1 + \frac{1}{3}\mu_1 \Leftrightarrow \frac{1}{3}\mu_1 = 1 \Leftrightarrow \mu_1 = 3 = \mu_2.$$



## ESAME DEL 3/20/2024

Sia  $\{X_n : n \geq 1\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 1-q \\ 0 & 0 & 0 & q^2 & 1-q^2 \end{pmatrix} \quad q \in (0, 1)$$

D11) Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$  per  $i, j \in \{4, 5\}$  dopo aver giustificato l'esistenza del limite.

### Soluzione

Gli stati  $\{4, 5\}$  sono una classe chiusa, perciò la sottocatena associata a  $\{4, 5\}$  è irriducibile e poiché  $q \in (0, 1)$ ,  $p_{44} > 0$  quindi è anche regolare, quindi per il teorema di Markov  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$  per  $i, j \in \{4, 5\}$ .

Consideriamo la stazionaria  $(\pi_4, \pi_5)$  relativa a  $\{4, 5\}$ , allora

$$(\pi_4, \pi_5) \begin{pmatrix} q & 1-q \\ q^2 & 1-q^2 \end{pmatrix} = (\pi_4, \pi_5) \Rightarrow \begin{cases} q\pi_4 + q^2\pi_5 = \pi_4 \\ (1-q)\pi_4 + (1-q^2)\pi_5 = \pi_5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1-q)\pi_4 &= q^2\pi_5 \Rightarrow \pi_4 = \frac{q^2}{1-q}\pi_5 & 1-\pi_5 &= \frac{q^2}{1-q}\pi_5 \Rightarrow \left(1 + \frac{q^2}{1-q}\right)\pi_5 = 1 \\ \Rightarrow (1-q)\pi_4 &= q^2\pi_5 & \Rightarrow \pi_5 &= \frac{1-q}{1-q+q^2} \\ \text{più la relazione } \pi_4 &= 1 - \pi_5 & \Rightarrow \pi_4 &= \frac{q^2}{1-q+q^2} \end{aligned}$$

$$\pi_4 = \frac{q^2}{1-q+q^2}, \quad \pi_5 = \frac{1-q}{1-q+q^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{q^2}{1-q+q^2} \quad \text{per } i \in \{4, 5\}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1-q}{1-q+q^2}$$



D12) Calcolare i tempi medi di assorbimento nello stato 1 partendo da 2 e da 3 rispettivamente.

Soluzione

$$\begin{cases} \mu_2 = 1 + P_{22}\mu_2 + P_{23}\mu_3 \\ \mu_3 = 1 + P_{32}\mu_2 + P_{33}\mu_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu_2 = 1 + \frac{1}{3}\mu_2 + \frac{1}{3}\mu_3 \\ \mu_3 = 1 + \frac{1}{2}\mu_2 + \frac{1}{2}\mu_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3}\mu_2 = 1 + \frac{1}{3}\mu_3 \Rightarrow \mu_2 = \left(1 + \frac{1}{3}\mu_3\right)\frac{3}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\mu_3$$

$$\frac{1}{2}\mu_3 = 1 + \frac{1}{2}\mu_2 \Rightarrow \mu_3 = 2 + \mu_2 = 2 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\mu_3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\mu_3 = \frac{7}{2} = \mu_3 = 7$$

$$\Rightarrow \mu_2 = \frac{3}{2} + \frac{7}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$(\mu_2, \mu_3) = (5, 7).$$



## ESAME DEL 20/03/2024

Sia  $\{X_n : n \geq 1\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/7 & 2/7 & 1/7 & 3/7 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & r & 1-r \end{pmatrix} \quad r \in (0, 1)$$

D 11) Motivare l'esistenza di  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$  per  $i, j \in \{4, 5\}$  e dire per quale valore di  $r$  questi limiti sono tutti uguali tra loro.

### Soluzione

Gli stati  $\{2, 3\}$  formano una classe chiusa perciò la sottocatena relativa a  $\{2, 3\}$  è irreducibile e poichè  $p_{44} > 0$  è anche regolare quindi per il teorema di Markov  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \forall i, j \in \{4, 5\}$ .

Consideriamo l'unica stazionaria  $(\pi_4, \pi_5)$  di  $\{4, 5\}$ .

$$(\pi_4, \pi_5) \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ r & 1-r \end{pmatrix} = (\pi_4, \pi_5) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi_4}{3} + r\pi_5 = \pi_4 \\ \frac{2}{3}\pi_4 + (1-r)\pi_5 = \pi_5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3}\pi_4 = r\pi_5 \\ \frac{2}{3}\pi_4 = r\pi_5 \end{cases}$$

$$\text{Inoltre vale } \pi_4 + \pi_5 = 1 \Rightarrow \pi_4 = 1 - \pi_5 \Rightarrow 1 - \pi_5 = \frac{3r}{2}\pi_5$$

$$\pi_4 = \frac{3r}{2}\pi_5 \quad \Leftrightarrow \frac{2+3r}{2}\pi_5 = 1$$

$$\Leftrightarrow \pi_5 = \frac{2}{2+3r}$$

$$\pi_4 = \frac{3r}{2+3r}$$



Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{i4}^{(n)} = \frac{3r}{2+3r}$$

$$\forall i \in \{4, 5\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{i5}^{(n)} = \frac{2}{2+3r}$$

$$\text{Infine } \frac{3r}{2+3r} = \frac{2}{2+3r} \Leftrightarrow 3r = 2 \Leftrightarrow r = \frac{2}{3}$$

D12)

$$\lambda_1 = p_{12} + p_{13} + \lambda p_{11} \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \lambda_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{6}{7} \lambda_1 = \frac{3}{7} \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2}$$