



MATRICE DI TRANSIZIONE

Nel caso di catena di Markov omogenea con spazio degli stati E abbiamo i valori

$$P_{ij} = P(X_{n+1}=j | X_n=i) = P(X_1=j | X_0=i) \quad \forall i, j \in E \\ \forall n \geq 0.$$

I valori $(P_{ij})_{i,j \in E}$ costituiscono la matrice di transizione.

In generale si ha una matrice quadrata e quando E è finito, ha dimensione alla cardinalità di E .

DENSITÀ CONGIUNTE PER LE V.A.

$$\pi^{(n)} = (\pi_i^{(n)})_{i \in E} \text{ tale che } \pi_i^{(n)} = P(X_n=i) \text{ per } i \in E$$

↙ matrice di transizione

$$\pi_i^{(n)} \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i \in E} \pi_i^{(n)} = 1 \quad \pi^{(0)}: \text{distribuzione iniziale}$$

ESERCIZIO 1

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con spazio degli stati $E = \{1, 2, 3\}$

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

1) Trovare la distribuzione di X_1 nel caso in cui la distribuzione iniziale sia uniforme.

$$\text{Si ha } \pi^{(1)} = \pi^{(0)} P, \text{ dove } \pi^{(0)} = (1/3, 1/3, 1/3)$$

↙ distribuzione uniforme, $|E|=3$

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P = (1/3, 1/3, 1/3) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12}, \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12}, \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \right) = \left(\frac{3}{12}, \frac{6}{12}, \frac{3}{12} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right)$$

2) Calcolare $P(X_2=3 | X_0=1)$

Si chiede di calcolare $P_{13}^{(2)}$. Calcoliamo per completezza $P^{(2)}$.

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} 5/16 & 7/16 & 4/16 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/16 & 7/16 & 5/16 \end{pmatrix} \rightarrow P_{13}^{(2)}$$

3) Calcolare $P(X_2 \neq 2)$ nel caso in cui si abbia $\pi^{(0)} = (q, 0, 1-q)$ per $q \in [0, 1]$.

Inoltre con questa scelta di $\pi^{(0)}$, dire se esiste un valore di q per cui si ha $P(X_2=1) = P(X_2=3)$.

$$\pi^{(2)} = \pi^{(0)} P^{(2)} = (q, 0, 1-q) \begin{pmatrix} 5/16 & 7/16 & 4/16 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/16 & 7/16 & 5/16 \end{pmatrix} =$$

$$= (q \frac{5}{16} + (1-q) \frac{4}{16}, q \frac{7}{16} + (1-q) \frac{7}{16}, q \frac{4}{16} + (1-q) \frac{5}{16}) =$$

$$= (\frac{4+q}{16}, \frac{7}{16}, \frac{5-q}{16}) \Rightarrow \text{Allora } P(X_2 \neq 2) = P(X_2=1) + P(X_2=3)$$

$P(X_2=1)$ \rightarrow $\frac{4+q}{16}$
 $\text{Somma} = 1 \Rightarrow \text{OK.}$
 $\rightarrow P(X_2=2)$

$$= \frac{4+q}{16} + \frac{5-q}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\text{Oppure } P(X_2 \neq 2) = 1 - P(X_2=2) = 1 - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$$

$$P(X_2=1) = P(X_2=3) = \frac{4+q}{16} = \frac{5-q}{16} \Leftrightarrow 2q = 1 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

Esercizio 2

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con spazio degli stati $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con

$$P = \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \quad \text{per } r \in [0, 1]$$

- 1) Trovare la distribuzione di X_1 nel caso in cui la catena parte dallo stato 4.

Si ha $\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$ nel caso in cui $\pi^{(0)} = (0, 0, 0, 1)$ perché parte dallo stato 4.

$$\pi^{(0)} P = (0, 0, 0, 1) \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = (0, 0, 1/3, 2/3)$$

- 2) Calcolare $P(X_2=1 | X_0=1)$ e più in generale $P(X_n=1 | X_0=1)$ per $n \geq 1$.

Viene chiesto di calcolare $P_{11}^{(n)}$ per $n=2$ e poi per n generico

Il caso $n=2$ si ottiene considerando

$$p^{(2)} = \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11}^{(2)} = r^2 & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$$

$$p^{(n)} = P \dots P \Rightarrow P_{11}^{(n)} = r^n$$

3) Dire se esiste un valore di r per cui, nel caso in cui $P(X_0=1) = \frac{9}{10}$ e $P(X_0=2) = \frac{1}{10}$ e per cui si ha $P(X_2=2) = \frac{1}{100}$

$$\pi^{(2)} = \pi^{(0)} P^{(2)} \quad \text{con} \quad \pi^{(0)} = \left(\frac{9}{10}, \frac{1}{10}, 0, 0 \right)$$

$$\pi^{(2)} = \left(\frac{9}{10}, \frac{1}{10}, 0, 0 \right) \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{9}{10}r, \frac{9}{10}(1-r) + \frac{9}{10}, 0, 0 \right) \begin{pmatrix} r & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} =$$

$$= \left(\frac{9}{10}r^2, \frac{9}{10}r(1-r) + \frac{9}{10}(1-r) + \frac{1}{10}, 0, 0 \right) = \left(\frac{9}{10}r^2, 1 - \frac{9}{10}r^2, 0, 0 \right)$$

$$P(X_2=2) = \frac{1}{100} \Rightarrow 1 - \frac{9}{10}r^2 = \frac{1}{100} \Leftrightarrow -\frac{9}{10}r^2 = 1 - \frac{1}{100} \Leftrightarrow \frac{9}{10}r^2 = \frac{99}{100}$$

$$\Leftrightarrow r^2 = \frac{11}{10} \Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{11}{10}}$$

\Rightarrow Soluzione non accettabile perché $r = \sqrt{\frac{11}{10}} > 1$.

ESERCIZIO 3

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con $E = \{0, 1, 2\}$ e matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/5 & 1/8 & 3/8 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 1 \rightarrow \in E \\ 2 \end{matrix}$$

1) Calcolare $P(X_1 X_2 = 4)$ nel caso in cui la catena parte da 1.

Poiché la catena assume valori in $E = \{0, 1, 2\}$, abbiamo che

$$\{X_1 X_2 = 4\} = \{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}.$$

Quindi dobbiamo calcolare $P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\})$ con la distribuzione iniziale.

Per una generica distribuzione iniziale $\pi^{(0)} = (\pi_0^{(0)}, \pi_1^{(0)}, \pi_2^{(0)})$ si avrebbe

$$P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}) = \sum_{i=0}^2 \pi_i^{(0)} \underbrace{P(X_1 = 2 | X_0 = i)}_{P_{i2}} \underbrace{P(X_2 = 2 | X_1 = 2)}_{P_{22}}$$

Poi nel caso specifico si ha $\pi^{(0)} = (0, 1, 0)$ e quindi

$$P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}) = \underbrace{0}_{i=0} + 1 \cdot \underbrace{P_{12}}_{i=1} \cdot P_{22} + \underbrace{0}_{i=2} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

2) Calcolare $P(X_0 + X_1 = 2)$ nel caso in cui la distribuzione iniziale sia uniforme.

$$\pi^0 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \quad \rightarrow \quad P(X_1=0 | X_0=2) P(X_0=2)$$

$$\{X_0 + X_1 = 2\} = \underbrace{\{X_0=0 \wedge X_1=2\}}_{E_{02}} \vee \underbrace{\{X_0=2 \wedge X_1=0\}}_{E_{20}} \vee \underbrace{\{X_0=1 \wedge X_1=1\}}_{E_{11}}$$

$$P(\{X_0 + X_1 = 2\}) = P(E_{02}) + P(E_{20}) + P(E_{11})$$

Allora

$$\begin{cases} P(E_{02}) = \pi_{(0)}^{(0)} P_{02} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} & \leftarrow P(X_1=2 | X_0=0) P(X_0=0) \\ P(E_{20}) = \pi_{(2)}^{(0)} P_{20} = \frac{1}{3} \cdot 0 = 0 & \leftarrow P(X_1=0 | X_0=2) P(X_0=2) \\ P(E_{11}) = \pi_{(1)}^{(0)} P_{11} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} & \leftarrow P(X_1=1 | X_0=1) P(X_0=1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} + 0 + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$$

3) Sia $\pi^{(0)} = (r, 0, 1-r)$ per $r \in [0, 1]$. Determinare, se esiste, il valore di r affinché si abbia $P(X_1=0) = P(X_1=1) = \frac{1}{4}$

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$$

$$= (r, 0, 1-r) \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/6 & 1/6 & 2/3 \end{pmatrix} = \left(\frac{r}{3} + \frac{1-r}{5}, \frac{r}{3} + \frac{1-r}{6}, \frac{r}{3} + \frac{2(1-r)}{3} \right)$$

$$= \left(\frac{5r+3-3r}{15}, \frac{2r+3}{15}, \frac{5r+3-3r}{15} \right) = \left(\frac{2r+3}{15}, \frac{2r+3}{15}, \frac{-4r+9}{15} \right)$$

$$P(X_1=0) = P(X_1=1) = \frac{2r+3}{15} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2r}{15} = \frac{1}{4} - \frac{3}{15}$$

$$\Rightarrow \frac{2r}{15} = \frac{15-12}{60} \Rightarrow \frac{2r}{15} = \frac{3}{60} \Rightarrow r = \frac{3}{8} \text{ ok.}$$