

Comparaison des modèles - Version
2019.12.12_4zones_Interaction_sans_rho_poutes_matriceVC_maj2018 et
2019.12.12_4zones_Interaction_sans_rho_poutes_matriceVC_maj2020

Marion LEGRAND


4 avril 2022

1 Figures-Modèle


Les modèles comparés ici sont :

- Modèle 2019 MAJ 2018
- Modèle 2021 MAJ 2020

1.1 retour à Vichy




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 1 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori des retours d'adultes à Vichy. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Les cercles pleins indiquent les années pour lesquelles la station de comptage à Vichy est opérationnelle et fournissent le nombre de retours d'adultes. Les cercles orange représentent les coefficients de variation (CVs) associés aux estimations de retour d'adultes.

1.2 Géniteurs potentiels et ratio




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 2 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori des abondances annuelles absolues et relatives de géniteurs potentiels dans chaque zone du bassin de l’Allier : Vichy-Langeac (a et d), Langeac-Poutès (b et e), Amont Poutès (c et f). Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Les lignes pointillées horizontales pour d, e et f indiquent la disponibilité relative de l’habitat potnetiel pour les juvéniles. On notera que pour la zone à l’amont de Poutès il n’y a pas d’estimation des abondances absolues car le nombre exact de géniteurs est toujours connu (c) et l’abondance relative est connue lorsque les comptages à Vichy sont disponibles.

1.3 ratio géniteurs potentiels :frayères



(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020


FIGURE 3 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori du ratio géniteurs potentiels :frayères pour chaque zone du bassin de l’Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Les bandes colorées en arrière-plan représentent la médiane et les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , médiane, 75^{th} et 97.5^{th} des hyper-paramètres $\mu^{K_{down}}$ (a et b) et $\mu^{K_{up}}$ (c).

1.4 Densité de juvéniles - échelle macroscopique

1.4.1 Densités en juvéniles 0+ total (somme de tous les compartiments)




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 4 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori des densités de juvéniles 0+ à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a) Vichy-Langeac, b) Langeac-Poutès, c) Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Le remplissage en couleur foncée des boxplot indique les années durant lesquelles il y a eu du repeuplement.

1.4.2 Densités en juvéniles sauvages




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 5 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori des densités de juvéniles sauvages 0+ à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a) Vichy-Langeac, b) Langeac-Poutès, c) Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Le remplissage en couleur foncée des boxplot indique les années durant lesquelles il y a eu du repeuplement.

1.4.3 Densités en juvéniles d'élevage




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 6 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori des densités de juvéniles d'élevage 0+ à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Le remplissage en couleur foncée des boxplot indique les années durant lesquelles il y a eu du repeuplement.

1.4.4 Densités en juvéniles issus des incubateurs de terrain




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 7 – Comparaison des 2 modèles : distribution a posteriori des densités de juvéniles 0+ issus des incubateurs de terrain à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Il n'y a jamais eu d'incubateurs en amont de Poutès.

1.4.5 Résidus des juvéniles sauvages




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 8 – Comparaison des 2 modèles : Résidus des densités de juvéniles sauvages 0+ à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Le remplissage en couleur foncée des boxplot indique les années durant lesquelles il y a eu du repeuplement.

1.4.6 Résidus des juvéniles d'élevage




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 9 – Comparaison des 2 modèles : Résidus des densités de juvéniles 0+ issus des repeuplements à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Le remplissage en couleur foncée des boxplot indique les années durant lesquelles il y a eu du repeuplement.

1.4.7 Résidus des juvéniles issus des incubateurs




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 10 – Comparaison des 2 modèles : Résidus des densités de juvéniles 0+ issus des incubateurs terrain à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Le remplissage en couleur foncée des boxplot indique les années durant lesquelles il y a eu du repeuplement. Il n'y a jamais eu d'incubateurs en amont de Poutès.

1.4.8 Ratio entre les densités sauvages et les densités totales




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 11 – Comparaison des 2 modèles : contribution relative des juvéniles sauvages par rapport aux juvéniles totales produits à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles é 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Les cercles colorés indiquent les années sans repeuplement.

1.4.9 Ratio entre les densités issus des juvéniles déversés et les densités totales




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 12 – Comparaison des 2 modèles : contribution relative des juvéniles issus des déversements par rapport aux juvéniles totaux produits à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Les cercles colorés indiquent les années sans repeuplement.

1.4.10 Ratio entre les densités issus des incubateurs de terrain et les densités totales




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 13 – Comparaison des 2 modèles : contribution relative des juvéniles issus des incubateurs de terrain par rapport aux juvéniles totaux produits à l'échelle macroscopique $D_{t+1,i}^{tot}$ dans les bassin de l'Allier : a)Vichy-Langeac, b)Langeac-Poutès, c)Amont Poutès. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5^{th} , 25^{th} , 75^{th} et 97.5^{th} . Les cercles colorés indiquent les années sans repeuplement.

1.5 Production relative de juvéniles 0+ pour une année donnée ($J_{t,i}^{coh}$)




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 14 – Comparaison des 2 modèles : production relative de juvéniles 0+ pour une année donnée ($J_{t,i}^{coh}$) pour chaque zone du bassin de l’Allier (panneaux a,d et g), distribution a posteriori des abondances relatives de géniteurs potentiels (panneaux b,e et h) et distribution a posteriori de la différence entre les abondances relatives de géniteurs potentiels et de production de juvéniles 0+ (panneaux c,f et i). Les lignes pointillées horizontales indiquent la disponibilité relative de l’habitat potentiel pour les juvéniles. Les boxplots indiquent les quantiles à 2.5th, 25th, 75th et 97.5th.

1.6 Relation de densité dépendance




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 15 – Comparaison des 2 modèles : Relation de densité dépendance moyenne entre a) les géniteurs potentiels d’une année donnée t et la densité de juvéniles 0+ sauvage l’année suivante $t+1$ et entre b) le nombre de juvéniles 0+ déversés au printemps et la densité de juvéniles issus du repeuplement à l’automne. Les différences spatiales à l’aval et l’amont de Langeac sont représentées par deux courbes de couleurs différentes (rouge pour l’aval et vert pour l’amont). Les cercles et les carrés colorés représentent les “données” pour chaque zone du bassin de l’Allier : rouge pour la zone Vichy-Langeac, vert foncé pour la zone Langeac-Poutès et vert clair pour la zone à l’amont de Poutès. La ligne pointillée dans le panneau b représente la fonction identité.

1.7 Survie du 0+ à l’adulte




(a) Modèle 2019 MAJ 2018




(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 16 – Comparaison des 2 modèles : évolution du taux de retour du juvénile 0+ à l'adulte μ^{sj} (a) et du taux de retour du smolt issu du repeuplement à l'adulte μ^{sm} . Les points indiquent la survie moyenne du smolt issu du repeuplement à l'adulte fixée à partir des données de marquage ($\mu^{sm}=3.79*10^{-4}$)

1.8 Probabilité de migrer sur l'Alagnon et de passer en amont de Langeac et Poutès



(a) Modèle 2019 MAJ 2018



(b) Modèle 2021 MAJ 2020

FIGURE 17 – Comparaison des 2 modèles : probabilité de migrer sur l'Alagnon et de passer en amont de Langeac et Poutès.