

2021年高等工程数学 I (第二阶段)期末考试参考答案

一、(共 10 分) 解: $\lambda I - A \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & \lambda \\ 0 & \lambda & 0 \\ \lambda & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & \lambda \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\lambda^2}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix},$

(A 的行列式因子分别为: $1, \lambda, \lambda^3$) 从而 A 的不变因子分别为: $1, \lambda, \lambda^2$. (5 分)

故 A 的初等因子组为: λ, λ^2 , 所以 A 的 Jordan 标准形为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (5 分)

二、(共 20 分) 解: (1) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 11 & 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 6 & -2 \\ -1 & 2 & 18 \end{pmatrix},$

令 $A = LU$ 为 Doolittle 分解, 则

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$

解方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \text{得 } y_1 = 4, y_2 = -8, y_3 = 18.$$

进一步计算

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 18 \end{pmatrix}, \quad \text{得 } x_3 = 1, x_2 = -1, x_1 = 2. \quad (10 \text{ 分})$$

(2) G-S 迭代格式为:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{3}(4 - x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)}) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{5}(-12 + 3x_1^{(k)} + x_3^{(k-1)}) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{15}(-2 + 3x_1^{(k)} - 11x_2^{(k)}) \end{cases}$$

因为 A 是严格对角占优矩阵, 所以 G-S 迭代法收敛. (10 分)

三、(共 12 分) 解: A 的行盖尔圆盘分别为:

$$G_1: |z - 10| \leq 9, \quad G_2: |z - 20| \leq 2, \quad G_3: |z - 30| \leq 9. \quad (3 \text{ 分})$$

令 $D = \text{diag}(1, \frac{1}{2}, 1)$, (3 分)

则 $B = D^{-1}AD$ 的行盖尔圆盘为:

$$G'_1: |z - 10| \leq 5, \quad G'_2: |z - 20| \leq 4, \quad G'_3: |z - 30| \leq 5.$$

它们两两不交. 由盖尔圆定理可知 G'_1 、 G'_2 、 G'_3 各恰有 A 的一个特征值. 进一步, 由于 A 是实矩阵, 所以 λ 是 A 的特征值当且仅当 $\bar{\lambda}$ 也是 A 的特征值, 即 A 的特征值会关于实轴对称. 注意到 G'_1 、 G'_2 、 G'_3 也关于实轴对称而且各恰有 A 的一个特征值, 我们得到 A 有三个互异实特征值. (6 分)

四、(共 18 分) 解: $\|x\|_\infty = 1$. (4 分)

注意到 $(xx^T)^2 = 3xx^T$, 从而 xx^T 的特征值为: $0, 0, 0, 3$. 由 xx^T 是正规矩阵可知 $\|xx^T\|_2 = \rho(xx^T) = 3$. 故

$$\max_{\|y\|_2=3} \|xx^T y\| = 3 \max_{\|z\|_2=1} \|xx^T z\| = 3\|xx^T\|_2 = 9. \quad (7 \text{ 分})$$

$$(xx^T)^+ = x(x^T x)^{-1}(x^T x)^{-1}x^T = \frac{1}{9}xx^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7 \text{ 分})$$

五、(共 10 分) 解: 引入松弛变量 x_3, x_4, x_5 , 转化为标准形并建立初始表格:

$$\begin{array}{ll} \min & -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} & x_2 + x_3 = 3 \\ & 3x_1 + x_2 + x_4 = 12 \\ & x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{array} \quad (5 \text{ 分})$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	1	0	0	3
x_4	3	0	-1	1	0	9
x_5	1	0	-1	0	1	2
	1	0	-2	0	0	-6

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	1	0	0	3
x_4	0	0	2	1	-3	3
x_1	1	0	-1	0	1	2
	0	0	-1	0	-1	-8

所得最优解为 $(x_1, x_2)^T = (2, 3)^T$, 目标函数的最优值为 -8 . (5 分)

六、(共 10 分) 解: 构造罚函数 $F(x, \mu) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_1 - \mu \ln(x_1 + 1) - \mu \ln x_2$, 其中 μ 是很小的正数. 令

$$\frac{\partial F(x, \mu)}{\partial x_1} = x_1 - 1 - \frac{\mu}{x_1 + 1} = 0, \quad \frac{\partial F(x, \mu)}{\partial x_2} = x_2 - \frac{\mu}{x_2} = 0.$$

解得 $x(\mu) = (\sqrt{1 + \mu}, \sqrt{\mu})^T$. (5 分)

同时, 当前点的 Hesse 矩阵

$$\nabla^2 F(x(\mu), \mu) = \begin{pmatrix} 1 + \frac{\mu}{(\sqrt{1 + \mu} + 1)^2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

正定, 所以 $x(\mu)$ 为 $F(x, \mu)$ 的极小点. 当 $\mu \rightarrow 0$ 时, $x(\mu) \rightarrow x^* = (1, 0)^T$, x^* 为约束问题的最优解, 目标函数的最优值为 $f^* = -\frac{1}{2}$. (5 分)

七、(共 15 分) 解：由 $\nabla f(x) = (x_1 - x_2 - 1, -x_1 + 2x_2)^T$ 可知 $\nabla f(x^{(1)}) = (-1, 0)^T$ ，所以 $d^{(1)} = -\nabla f(x^{(1)}) = (1, 0)^T$ 。把 $x^{(1)} + \alpha d^{(1)} = (\alpha, 0)^T$ 代入目标函数，求解

$$\min \quad \frac{1}{2}\alpha^2 - \alpha,$$

得 $\alpha_1 = 1$ ，从而

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \alpha_1 d^{(1)} = (1, 0)^T. \quad (8 \text{ 分})$$

可计算 $\nabla f(x^{(2)}) = (0, -1)^T$ ，于是得到 $\beta_1 = \frac{\|\nabla f(x^{(2)})\|^2}{\|\nabla f(x^{(1)})\|^2} = 1$ ，所以

$$d^{(2)} = -\nabla f(x^{(2)}) + \beta_1 d^{(1)} = (1, 1)^T.$$

把 $x^{(2)} + \alpha d^{(2)} = (1 + \alpha, \alpha)^T$ 代入目标函数，求解

$$\min \quad \frac{1}{2}(1 + \alpha)^2 - (1 + \alpha)\alpha + \alpha^2 - (1 + \alpha),$$

得 $\alpha_2 = 1$ ，则有

$$x^{(3)} = x^{(2)} + \alpha_2 d^{(2)} = (2, 1)^T.$$

可计算 $\nabla f(x^{(3)}) = (0, 0)^T$ ， $\|\nabla f(x^{(3)})\| = 0$ ，故极小点为

$$x^* = x^{(3)} = (2, 1)^T. \quad (7 \text{ 分})$$

八、(共 5 分) 解：轮盘赌的选择过程：

(1) 计算所有染色体 V_i 的累积概率 q_i ，

$$q_0 = 0, \quad q_i = \sum_{j=1}^i \text{Eval}(V_j), \quad i = 1, 2, \dots, \text{pop_size}.$$

(2) 在 $(0, q_{\text{pop_size}}]$ 中产生一个随机数 r 。

(3) 若 $q_{i-1} < r \leq q_i$ ，则选择染色体 V_i 。

(4) 重复第 (2) 至第 (3) 步 pop_size 次以获得 pop_size 个染色体。