

一、(15 分) 设 $x = \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 2 \end{pmatrix}$ 及 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 计算 $\|x\|_1$ 、 $\max_{\|x\|_\infty=4} \|Ax\|_\infty$ 及 $\text{cond}_2(A)$ 。

解: $\|x\|_1 = 1 + 1 + 2 = 4$ 。

$$\max_{\|x\|_\infty=4} \|Ax\|_\infty = \max_{\left\|\frac{1}{4}x\right\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty = \max_{\|y\|_\infty=1} 4\|Ay\|_\infty = 4\|A\|_\infty = 16$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda & 2 \\ 0 & -2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 2$$

$$\text{cond}_2(A) = \frac{4}{2} = 2$$

二、(8 分) 给出遗传算法中变异运算的常用方法。

- 解: (1) 单点、多点变异法。对二进制编码随机选一个或多个变异位, 将父代在变异位的基因由 1 变为 0 或 0 变为 1。
- (2) 2-opt 法。随机产生两个变异位, 然后将两个变异位的基因按逆序排, 其他位基因保持不变, 产生后代。
- (3) 对实数码, 采用 $X = V + Md$, 其中 M 使得 X 可行的 $[0, M]$ 的随机数, 若找不到可行, 令 $M=0$ 。

三、(10 分) 用倒数障碍内点罚函数法求解
$$\begin{cases} \min & x_1^2 - 6x_1 + 2x_2 + 9 \\ \text{s.t.} & x_1 \geq 3 \\ & x_2 \geq 3 \end{cases}$$
。

解: $P(x, \sigma) = x_1^2 - 6x_1 + 2x_2 + 9 + \sigma \left(\frac{1}{x_1 - 3} + \frac{1}{x_2 - 3} \right)$

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 2x_1 - 6 - \frac{\sigma}{(x_1 - 3)^2} = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial x_2} = 2 - \frac{\sigma}{(x_2 - 3)^2} = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 + \sqrt[3]{\frac{\sigma}{2}} \\ x_2 = 3 + \sqrt{\frac{\sigma}{2}} \end{cases} \quad \text{令 } \sigma \rightarrow 0 \quad \begin{cases} x_1 \rightarrow 3 \\ x_2 \rightarrow 3 \end{cases}$$

四、(12 分) 证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} 20 & 5 & 0.8 \\ 4 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 10i \end{pmatrix}$ 有互异特征值。

$$\text{解: } D = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, B = D^{-1}BD = \begin{pmatrix} 20 & 5 & 0.8 \\ 4 & 10 & 0.5 \\ 2 & 4 & 10i \end{pmatrix}$$

$$|\lambda - 20| \leq 5, |\lambda - 10| \leq 4.5,$$

相互隔离, 故 A 有三个互异特征值。

五、(15 分) 求下列矩阵的不变因子、初等因子及 Jordan 标准形:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 8 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{解: } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & -3 & 2 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ -8 & -6 & \lambda-5 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = (\lambda+1)(\lambda-1)^2 \quad D_2 = D_1 = 1$$

$$d_3 = (\lambda+1)(\lambda-1)^2 \quad d_2 = d_1 = 1$$

$$\text{初等因子: } (\lambda+1) \quad (\lambda-1)^2$$

Jordan 标准形:

$$J = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{六、(20 分) 已知 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

(1) 求 A 的满秩分解;

(2) 求 A^+ ;

(3) 判断 $Ax = b$ 是否有解, 有解时求通解及极小范数解, 无解时求最小二乘解及极小范数最小二乘解。

$$\text{解: (1) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) A^+ = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) AA^+b = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \neq b \quad x = A^+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

七、(10分) 用单纯形法求解问题

$$\begin{cases} \min & -10x_1 - 6x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 \leq 100 \\ & 10x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 600 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 300 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解: 引入松弛变量 x_4, x_5, x_6

$$\begin{cases} \min & -10x_1 - 6x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100 \\ & 10x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_5 = 600 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + x_6 = 300 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| X4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 600 |
| X6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | |
|----|----|---|-----|----|-------|----|------|
| X4 | 0 | 3/5 | 1/2 | 1 | -1/10 | 0 | 40 |
| X1 | 1 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1/10 | 0 | 60 |
| X6 | 0 | 6/5 | 5 | 0 | -1/5 | 1 | 180 |
| | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -600 |

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | |
|----|----|----|------|-------|------|----|---------|
| X2 | 0 | 1 | 5/6 | 5/3 | -1/6 | 0 | 200/3 |
| X1 | 1 | 0 | 1/6 | -2/3 | 1/6 | 0 | 100/3 |
| X6 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 1 | 100 |
| | 0 | 0 | -8/3 | -10/3 | -2/5 | 0 | -2200/3 |

$$x = \left(\frac{100}{3} \quad \frac{200}{3} \quad 0 \right), f_{\min} = -\frac{2200}{3}$$

八、(10 分) 用 FR 共轭梯度法求解 $\min 2x_1^2 + x_2^2$ 初始点取为 $x^{(1)} = (2, 2)^T$ 。

解: $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 4x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$

step 1. $d^{(1)} = -\nabla f(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-8\alpha \\ 2-4\alpha \end{pmatrix}$

$$\min_{\alpha} 2(2-8\alpha)^2 + (2-4\alpha)^2 \Rightarrow \alpha = \frac{5}{18}$$

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} \\ \frac{8}{9} \end{pmatrix} \quad \nabla f(x^{(2)}) = \begin{pmatrix} -\frac{8}{9} \\ \frac{16}{9} \end{pmatrix}$$

step 2. $\beta = \frac{\|\nabla f(x^{(2)})\|}{\|\nabla f(x^{(1)})\|} = \frac{4}{81} \quad d^{(2)} = -\nabla f(x^{(2)}) + \beta d^{(1)} = \frac{40}{81} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$

$$x = \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} \\ \frac{8}{9} \end{pmatrix} + \alpha \frac{40}{81} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \min_{\alpha} \left(\frac{2}{9} - \frac{40}{81}\alpha \right)^2 + \left(\frac{8}{9} - \frac{160}{81}\alpha \right)^2 \Rightarrow \alpha =$$

$$x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \nabla f(x^{(3)}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x^{(3)} \text{ 为极小值点。}$$