

## Tema nr. 1

1. Să se găsească cel mai mic număr pozitiv  $u > 0$ , de forma  $u = 10^{-m}$ , astfel ca:

$$1.0 +_c u \neq 1.0$$

unde prin  $+_c$  am notat operația de adunare efectuată de calculator. Numărul  $u$  poartă numele de *precizia mașină*.

2. Operația  $+_c$  este *neasociativă*: fie numerele reale  $a = 1.0$ ,  $b = u/10$ ,  $c = u/10$ , unde  $u$  este precizia mașină calculată anterior. Să se verifice că operația de adunare efectuată de calculator nu este asociativă, i.e.:

$$(a +_c b) +_c c \neq a +_c (b +_c c).$$

Găsiți un exemplu pentru care operația  $\times_c$  este neasociativă.

### 3. Aproximarea funcției tangenta

Implementați următoarele două metode de aproximare a valorii funcției tangenta: folosind metoda fracțiilor continue și o aproximare polinomială. Să se aplice aceste metode de aproximare a funcției  $\tan$ , pentru argumente  $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . Pentru valori ale lui  $x$  care nu sunt în intervalul  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  se folosește periodicitatea funcției tangenta (se face o împărțire cu rest) și antisimetria,  $\tan(x) = -\tan(-x)$ . Valorile lui  $x$  multiplu de  $\frac{\pi}{2}$  trebuie tratate separat.

Să se compare valoarea funcției tangenta obținută prin cele două metode descrise mai jos cu valoarea furnizată de tangenta implementată în biblioteca matematică a limbajului de programare pe care îl folosiți. Afișați  $|\tan(x) - \text{my\_tan}(x)|$ .

Generați 10.000 de numere în  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ,  $\{x_i \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}); i = 1, 10.000\}$ . Folosiți cele două metode descrise mai jos pentru calculul valorii funcției tangenta. Comparațiile din punct de vedere a erorii de calcul ( $|\tan(x) - \text{my\_tan}(x)|$ ) și al timpului de calcul (al celor 10.000 de valori).

## Aproximarea funcției tangenta folosind fracții continue

O fracție continuă are următoarea formă:

$$f = b_0 + \frac{a_1}{b_1 + \frac{a_2}{b_2 + \frac{a_3}{b_3 + \frac{a_4}{b_4 + \frac{a_5}{b_5 + \dots}}}}}$$

sau, pentru economie de spațiu, se preferă notația:

$$f = b_0 + \frac{a_1}{b_1 +} \frac{a_2}{b_2 +} \frac{a_3}{b_3 +} \frac{a_4}{b_4 +} \frac{a_5}{b_5 +} \dots$$

În formulele de mai sus șirurile  $a_n$  și  $b_n$  pot fi funcții de  $x$ .

Funcția  $\tan$  poate fi reprezentată ca fracție continuă astfel:

$$\tan x = \frac{x}{1 +} \frac{(-x^2)}{3 +} \frac{(-x^2)}{5 +} \frac{(-x^2)}{7 +} \dots$$

Cum se aproximează o fracție continuă?

$$f \approx f_n = \frac{A_n}{B_n}$$

unde  $A_n$  și  $B_n$  se calculează după recurențele:

$$\begin{aligned} A_{-1} &= 1 \quad , \quad A_0 = b_0 \\ A_j &= b_j A_{j-1} + a_j A_{j-2} \quad , \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{-1} &= 0 \quad , \quad B_0 = 1 \\ B_j &= b_j B_{j-1} + a_j B_{j-2} \quad , \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Cea mai bună metodă de a evalua fracții continue pare să fie *metoda lui Lentz modificată*. Fie:

$$C_j = \frac{A_j}{A_{j-1}} \quad , \quad D_j = \frac{B_{j-1}}{B_j}$$

vom calcula  $f_j$  folosind formula:

$$f_j = C_j D_j f_{j-1}.$$

Pentru  $C_j$  și  $D_j$  avem următoarele recurențe:

$$C_j = b_j + \frac{a_j}{C_{j-1}} ,$$

$$D_j = \frac{1}{b_j + a_j D_{j-1}} .$$

Valorile inițiale de la care pornesc recurențele de mai sus sunt:

$$C_0 = b_0 , \quad D_0 = 0 , \quad f_0 = b_0 .$$

Pentru a evita împărțirile cu 0 în calculele de mai sus, numărătorii care sunt 0 vor fi înlocuiți cu o valoare foarte mică ( $mic = 10^{-12}$ ). Vom calcula  $f_j$  atâta timp cât diferența între doi termeni consecutivi ai șirului  $f$  este, în valoare absolută, mai mare decât un  $\epsilon = 10^{-p}$  dat. Constanta  $\epsilon$  reprezintă precizia cu care vrem să aproximăm funcția  $\tan$  și este un număr citit de la tastatură și/sau este parametru de intrare al funcției  $\tan$  :

double my\_tan(double  $x$ , double  $\epsilon$ ).

Cu aceste precizări, *algoritmul lui Lentz modificat* are următoarea structură:

```

 $f_0 = b_0$  ;  $mic = 10^{-12}$  ;
if ( $f_0 = 0$ ) then  $f_0 = mic$  ;
 $C_0 = f_0$  ;
 $D_0 = 0$  ;
 $j = 1$  ;
do
     $D_j = b_j + a_j D_{j-1}$  ;
    if ( $D_j = 0$ ) then  $D_j = mic$  ;
     $C_j = b_j + \frac{a_j}{C_{j-1}}$  ;
    if ( $C_j = 0$ ) then  $C_j = mic$  ;
     $D_j = \frac{1}{D_j}$  ;
     $\Delta_j = C_j D_j$  ;
     $f_j = \Delta_j f_{j-1}$  ;
     $j = j + 1$  ;
while ( $|\Delta_j - 1| \geq \epsilon$ ) ;

```

În algoritmul de mai sus, pentru calculul recurențelor pentru  $C_j$ ,  $D_j$ ,  $\Delta_j$  și  $f_j$  nu este necesară alocarea unor vectori ci doar a unei singure variabile pentru fiecare șir în parte ( $C$ ,  $D$ ,  $\Delta$ ,  $f$ ), variabilă care este actualizată la fiecare pas.

### Aproximarea funcției tangentă folosind polinoame

Pentru a aproxima funcția tangentă se poate folosi următorul polinom, dedus folosind aproximarea cu serii MacLaurin a funcțiilor:

$$\tan(x) \approx x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 = x + P(x^2)x^3$$

Pentru a reduce timpul de calcul, coeficientii ce apar în formula de mai sus pot fi calculați o singură dată și declarați ca atare în funcția ce calculează polinomul de mai sus. Nu e necesar să scrieți o funcție separată pentru polinomul  $P$  ci folosiți direct formula în funcția de calcul a valorii aproximative a funcției tangente.

```
my_tan (x)
c1 = 0.3333333333333333;
c2=0.1333333333333333;
c3=0.053968253968254;
c4=0.0218694885361552;
x_2=x*x;
x_3=x_2*x;
x_4=x_2*x_2;// x_4=x_3*x;
return ...
```

Veți constata că această formulă de aproximare funcționează mai bine dacă  $x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ . Pentru a reduce argumentele  $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  în intervalul  $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ , se ține cont de proprietatea de antisimetrie și de următoarea relație:

$$\tan(x) = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{2} - x)} \quad , \quad x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}).$$