

Esercitazione 07 Ottobre

Ripasso delle lezioni

Ricordiamo le definizioni di limite di successioni.

Definizione. Diremo che il numero reale a è il limite della successione a_n e si scrive:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$$

se, qualunque sia $\epsilon > 0$ esiste un numero ν tale che:

$$a - \epsilon < a_n < a + \epsilon \quad \text{per ogni } n > \nu$$

In simboli:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \iff \forall \epsilon > 0, \exists \nu : |a_n - a| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Similmente vale:

Definizione. Una successione a_n a limite $+\infty$ (si dice anche che la successione diverge a $+\infty$) e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

se, qualunque sia $M > 0$, esiste un numero ν tale che:

$$a_n > M \quad \text{per ogni } n > \nu.$$

Inoltre una definizione similare vale per $-\infty$. In simboli:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \iff \forall M > 0, \exists \nu : a_n > M \quad \forall n > \nu$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty \iff \forall M > 0, \exists \nu : a_n < -M \quad \forall n > \nu$$

Teorema (Unicità del limite). Se esiste il limite $a \in \mathbb{R}$ della successione a_n , tale limite è unico.

Dimostrazione. Ragionando per assurdo si supponga che $a_n \rightarrow a$ e $a_n \rightarrow b$ e $a \neq b$. Allora per la definizione di limite:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 \text{ tale che } |a_n - a| < \epsilon \quad \forall n > \nu_1 \\ \exists \nu_2 \text{ tale che } |a_n - b| < \epsilon \quad \forall n > \nu_2 \end{aligned}$$

Se prendo quindi $\epsilon = \frac{|a-b|}{2}$ e ponendo $\nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$, valgono le seguenti disuguaglianze. $|a - b| = |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \epsilon + \epsilon = |a - b|$ Ma questo è assurdo. \square

Esercizi

Per comprendere profondamente la definizione di limite di una successione, si ragioni su successioni semplici per comprendere il significato delle variabili all'interno della definizione. Una successione non è da considerarsi come un sottoinsieme di \mathbb{R} bensì come una legge che associa ad ogni numero naturale n un numero reale a_n . Può aiutare immaginarsi che vi sia una certa "successione" temporale e che quindi a_1 è il primo termine, a_2 è il secondo termine (e viene dopo), a_3 viene ancora successivamente e così via.

Si pensi alla successione $a_n = \frac{1}{n}$ essa tende a zero non tanto perché è fatta tutta da numeri vicini a zero, infatti il primo termine della successione è 1. Quello che succede però è che via via che si hanno termini successivi della successione i valori $\frac{1}{n}$ diventano via via sempre più piccoli. Questo rimpicciolirsi si traduce nel fatto che il suo limite è zero.

Cosa centrano però ϵ e ν in tutto questo? Le due variabili rendono oggettivo e indiscutibile il fatto intuitivo che la nostra successione tenda effettivamente a zero. ϵ ci individua una sorta di intervallo vicino (arbitrariamente) al nostro limite (zero in questo caso). Si considerino alcuni valori di $\epsilon > 0$: $\frac{1}{2}$, 2 , $\frac{1}{280000}$. Questi valori danno i seguenti tre intervalli aperti $(0 - \frac{1}{2}; 0 + \frac{1}{2})$, $(-2; 2)$ e $(-\frac{1}{280000}; \frac{1}{280000})$. Ora, se è vero che il limite della successione è zero, deve succedere che da un certo valore dell'indice n della successione, ciascun (ma **PROPRIO TUTTI**) termine successivo stia in tale intervallo. Risulta perciò chiaro che più l'intervallo è piccolo, più è difficile individuare questo indice. L'indice di cui si è parlato prende il nome di ν e dipende dalla scelta fatta su ϵ . Considerando le scelte di ϵ fatte e perciò gli intervalli che ne derivano si cerca di individuare gli ν relativi. Quindi ci si chiede da quale indice in poi tutti i termini della successione stanno nell'intervallo $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$? Questo accade in realtà già dal terzo indice in poi e perciò ν può essere preso uguale a 3 o anche uguale a qualsiasi valore successivo a 3 e di conseguenza si ha che a_n se $n > 3$ stanno nell'intervallo considerato. Se invece si considera l'intervallo $(-2; 2)$ allora si ha che tutti i termini della successione, fin dal primo, appartengono all'intervallo e quindi ν può essere preso uguale a 1. Infine se si prende l'intervallo $(-\frac{1}{280000}; \frac{1}{280000})$, è più difficile individuare il valore di ν , infatti per molti termini i valori della successione sono fuori dall'intervallo considerato, però se si considera un ν sufficientemente alto si può comunque soddisfare la definizione di limite. Alcuni esempi di ν che vanno bene in questo caso sono: $\nu = 1000000$, $\nu = 1230000000000$, oppure stando il più bassi possibile $\nu = 280000$.

Esercizio: Si consideri nuovamente la successione $a_n = \frac{1}{n}$. Se si cambiassero i primi 1000000 termini della successione in 700, ottenendo la seguente successione:

$$\begin{cases} a_n = 700 & \text{se } n \leq 1000000 \\ a_n = \frac{1}{n} & \text{se } n > 1000000 \end{cases}$$

il limite cambierebbe? Se no trovare possibili ν per gli intervalli considerati sopra.

Soluzione: Il limite non cambia, per ciascun intervallo basta considerare un $\nu \geq 1000000$, non si può infatti prenderlo più piccolo in quanto i primi termini sono tutti 700 e quindi fuori dagli intervalli considerati.

Esercizio: Se si cambiassero, non i primi 1000000 termini, bensì tutti i termini pari in 700 ottenendo la successione:

$$\begin{cases} a_n = 700 & \text{se } n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a_n = \frac{1}{n} & \text{se } n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Soluzione: Questa successione non ammette limite né 0 né 700, per vedere questo basta considerare l'intervallo $(-5, 5)$, non esiste nessun valore di ν degli n per cui la successione sta da ν in poi tutta nell'intervallo.

Proponiamo ora alcuni esercizi di carattere teorico.

Esercizio: Si consideri la successione

$$a_n = \frac{n}{2n + 5}$$

Dimostrare mediante la definizione che tale successione ha limite $\frac{1}{2}$.

Soluzione: Si tenga ϵ generico e si discuta la disuguaglianza:

$$|a_n - a| < \epsilon \quad \text{cioè} \quad \left| \frac{n}{2n + 5} - \frac{1}{2} \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{2n - (2n + 5)}{2(2n + 5)} \right| = \left| \frac{-5}{2(2n + 5)} \right| = \frac{5}{2(2n + 5)} < \epsilon$$

l'ultima disuguaglianza ottenuta va interpretata come una disequazione nell'incognita n e perciò

$$4n + 10 > \frac{5}{\epsilon}, \quad 4n > \frac{5}{\epsilon} - 10, \quad n > \frac{5}{4\epsilon} - \frac{5}{2}$$

ponendo perciò $\nu = \frac{5}{4\epsilon} - \frac{5}{2}$ abbiamo verificato ciò che volevamo, cioè per ogni $\epsilon > 0$ esiste un ν per cui $|a_n - \frac{1}{2}| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$.

Esercizio: Utilizzando la definizione di limite si dimostri che

$$a_n = \frac{n - 4}{3n + 1}$$

tende a $\frac{1}{3}$.

Soluzione:

$$\left| \frac{n - 4}{3n + 1} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{3(n - 4) - (3n + 1)}{3(3n + 1)} \right| = \left| \frac{-13}{3(3n + 1)} \right| = \frac{13}{3(3n + 1)} < \epsilon$$

$$9n + 3 > \frac{13}{\epsilon}, \quad 9n > \frac{13}{\epsilon} - 3, \quad n > \frac{13}{9\epsilon} - \frac{1}{3}$$

Esercizio: Utilizzando la definizione di limite si dimostri che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 1) = +\infty$$

Soluzione:

$$n^2 - 1 > M, \quad n^2 > M + 1, \quad n > \sqrt{M + 1}$$

perciò se si fissa $\nu = \sqrt{M + 1}$ è soddisfatta la definizione di limite.

Esercizio: Si mostri tramite la definizione che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+4}{n} \right) \neq \frac{1}{2}$$

Soluzione:

$$\left| \frac{n+4}{n} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2(n+4) - n}{2n} \right| = \left| \frac{2n+8-n}{2n} \right| = \left| \frac{n+8}{2n} \right| = \frac{n+8}{2n} < \epsilon$$
$$2n+8 < 2n\epsilon, \quad 2n-2n\epsilon < -8, \quad n(2-\epsilon) < -8$$

Ora se ϵ è sufficientemente piccolo ($\epsilon < 2$) si ha

$$n < \frac{-8}{2-\epsilon}$$

essendo però che $n \in \mathbb{N}$ la disuguaglianza non è rispettata per alcun n .

Esercizio: Si dimostri tramite la definizione di limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+4}{n} \right) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (5 - n^2) = -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 2n - 3) = +\infty$$

Soluzione: Suggerimento: nell'ultimo caso serve risolvere una disequazione di secondo grado nell'incognita n .

Ricordiamo il seguente teorema:

Teorema. Supponiamo $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{a}{b} \text{ (se } b_n, b \neq 0)$$

valgono inoltre analoghe proprietà per successioni divergenti nei casi specificati di seguito.
Sia $a \in \mathbb{R}$.

$a_n \rightarrow a$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n + b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow a$	$b_n \rightarrow -\infty$	\implies	$a_n + b_n \rightarrow -\infty$
$a_n \rightarrow +\infty$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n + b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow -\infty$	$b_n \rightarrow -\infty$	\implies	$a_n + b_n \rightarrow -\infty$
$a_n \rightarrow a > 0$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n \cdot b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow a < 0$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n \cdot b_n \rightarrow -\infty$
$a_n \rightarrow +\infty$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n \cdot b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow +\infty$	$b_n \rightarrow -\infty$	\implies	$a_n \cdot b_n \rightarrow -\infty$
$a_n \rightarrow -\infty$	$b_n \rightarrow -\infty$	\implies	$a_n \cdot b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow a$	$b_n \rightarrow \pm\infty$	\implies	$a_n/b_n \rightarrow 0$
$a_n \rightarrow a > 0$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n/b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow a < 0$	$b_n \rightarrow +\infty$	\implies	$a_n/b_n \rightarrow -\infty$
$a_n \rightarrow a \neq 0$	$b_n \rightarrow 0$	\implies	$ a_n/b_n \rightarrow +\infty$
$a_n \rightarrow \pm\infty$	$b_n \rightarrow 0$	\implies	$ a_n/b_n \rightarrow +\infty$

Non sono presenti nella tabella sopra proposta le seguenti situazioni, che vengono dette orme indeterminate: $+\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^∞ , ∞^0 , 0^0 .

Esercizio: Calcola il limite delle seguenti successioni:

$$\frac{3n-1}{n+3}, \quad \frac{n^4+5}{n^5+7n-1}, \quad \sqrt{n-1} - n, \quad \sqrt{4n^2+1} - 2n - 1$$

Soluzione:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{n+3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3 - \frac{1}{n})}{n(1 + \frac{3}{n})} = \frac{3 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}}{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n}} = 3$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4+5}{n^5+7n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4(1 + \frac{5}{n^4})}{n^5(1 + \frac{7}{n^4} - \frac{1}{n^5})} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n-1} - n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n-1} - n) \frac{(\sqrt{n-1} + n)}{(\sqrt{n-1} + n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1-n^2}{(\sqrt{n-1} + n)} =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} - 1)}{n(\frac{\sqrt{n-1}}{n} + 1)} = -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{4n^2+1} - 2n - 1) \frac{((\sqrt{4n^2+1} + 2n - 1))}{(\sqrt{4n^2+1} + 2n - 1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2+1-4n^2-2n-1}{(\sqrt{4n^2+1} + 2n - 1)} = -\frac{1}{2}$$

Limiti notevoli

Ricordiamo alcuni limiti notevoli visti in classe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 1 & a = 1 \\ 0 & -1 < a < 1 \\ \text{non esiste} & a \leq -1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = \begin{cases} +\infty & b > 0 \\ 1 & b = 0 \\ 0 & b < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1, \quad \forall a > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^b} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{b}{n}} = 1, \quad \forall b \in \mathbb{R}$$

Inoltre, si hanno i seguenti limiti relativi alle funzioni trigonometriche:

$$a_n \rightarrow 0 \implies \sin(a_n) \rightarrow 0$$

$$a_n \rightarrow 0 \implies \cos(a_n) \rightarrow 1$$

se si considera ad esempio la successione $a_n = \frac{1}{n} \implies \sin\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$ e $\cos\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 1$. Valgono anche i seguenti:

$$a_n \rightarrow 0, a_n \neq 0 \quad \forall n \implies \frac{\sin(a_n)}{a_n} \rightarrow 1$$

$$a_n \rightarrow 0, a_n \neq 0 \quad \forall n \implies \frac{1 - \cos(a_n)}{a_n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Dal primo si può dimostrare il secondo.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \cos(a_n))}{a_n^2} &= \frac{(1 - \cos(a_n))(1 + \cos(a_n))}{a_n^2(1 - \cos(a_n))} = \frac{1 - \cos^2(a_n)}{a_n^2(1 + \cos(a_n))} = \\ &= \frac{\sin^2(a_n)}{a_n^2} \cdot \frac{a_n^2}{(1 + \cos(a_n))} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Infatti $\frac{\sin^2(a_n)}{a_n^2} \rightarrow 1$ e $(1 + \cos(a_n)) \rightarrow 2$

□

Esercizio: Si calcolino i limiti delle seguenti successioni:

$$n \sin \frac{1}{n}, \quad \frac{\sin \left(\frac{1}{n} \right)}{\sin \left(\frac{3}{n} \right)}, \quad \frac{1 - \cos \left(\frac{3}{n} \right)}{\sin \left(\frac{3}{n^2} \right)}, \quad n^2 \left(1 - \cos \left(\frac{2}{n} \right) \right)$$

Soluzione:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin \frac{1}{n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \cdot n \cdot \frac{1}{n} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \left(\frac{1}{n} \right)}{\sin \left(\frac{3}{n} \right)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \left(\frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\frac{3}{n}}{\sin \left(\frac{3}{n} \right)} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{3} = \frac{1}{3} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \left(\frac{3}{n} \right)}{\sin \left(\frac{3}{n^2} \right)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \left(\frac{3}{n} \right)}{\left(\frac{3}{n} \right)^2} \cdot \frac{\left(\frac{3}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}}}{\sin \left(\frac{3}{n^2} \right)} \cdot \left(\frac{3}{n} \right)^2 \cdot \left(\frac{n^2}{3} \right) = \frac{3}{2} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(1 - \cos \left(\frac{2}{n} \right) \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \left(\frac{2}{n} \right)}{\left(\frac{2}{n} \right)^2} \cdot 2^2 = 2 \end{aligned}$$

Si ha anche un certo ordine nelle successioni che divergono a $+\infty$, alcune di esse infatti divergono con maggiore rapidità. Per questo si può stilare una sorta di ordine crescente tra gli infiniti:

$$\log n; \quad n^b; \quad a^n; \quad n!; \quad n^n$$

Esercizio: Si calcolino i limiti delle seguenti successioni:

$$\sqrt[n]{\pi}; \quad \sqrt[n]{2n}; \quad \frac{2^{n+1} + 1}{3^n + 1}; \quad (3^n + 4^n - 5^n); \quad n^{-e}; \quad \frac{2^n - 4^n}{3^n - n!}$$

Soluzione:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\pi} &= 1 \quad \text{per il limite notevole relativo alla radice } n\text{-esima} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2} \sqrt[n]{n} \quad \text{sempre per il limite notevole relativo alla radice } n\text{-esima} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1} + 1}{3^n + 1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 2^n \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}} \right)}{3^n \left(1 + \frac{1}{3^n} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^n \frac{\left(1 + \frac{1}{2^{n+1}} \right)}{\left(1 + \frac{1}{3^n} \right)} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (3^n + 4^n - 5^n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n \left(\frac{3^n}{5^n} + \frac{4^n}{5^n} - 1 \right) = -\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-e} &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n - 4^n}{3^n - n!} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n \left(\frac{2^n}{4^n} - 1 \right)}{n! \left(\frac{3^n}{n!} - 1 \right)} = 0 \end{aligned}$$