

1. Sugeneruokite masyvą iš 30 elementų (indeksai nuo 0 iki 29), kurių reikšmės yra atsitiktiniai skaičiai nuo 5 iki 25.
2. Naudodamiesi 1 uždavinio masyvu:
 - a. Suskaičiuokite kiek masyve yra reikšmių didesnių už 10;
 - b. Raskite didžiausią masyvo reikšmę ir jos indeksą arba indeksus jeigu yra keli;
 - c. Suskaičiuokite visų porinių (lyginių) indeksų reikšmių sumą;
 - d. Sukurkite naują masyvą, kurio reikšmės yra 1 uždavinio masyvo reikšmės minus tos reikšmės indeksas;
 - e. Papildykite masyvą papildomais 10 elementų su reikšmėmis nuo 5 iki 25, kad bendras masyvas padidėtų iki indekso 39;
 - f. Iš masyvo elementų sukurkite du naujus masyvus. Vienas turi būti sudarytas iš neporinių indekso reikšmių, o kitas iš porinių;
 - g. Pirminio masyvo elementus su poriniais indeksais padarykite lygius 0 jeigu jie didesni už 15;
 - h. Suraskite pirmą (mažiausią) indeksą, kurio elemento reikšmė didesnė už 10;
3. Sugeneruokite masyvą, kurio reikšmės atsitiktinės raidės A, B, C ir D, o ilgis 200. Suskaičiuokite kiek yra kiekvienos raidės.
4. Išrūšiuokite 3 uždavinio masyvą pagal abecėlę.
5. Sugeneruokite du masyvus, kurių reikšmės yra atsitiktiniai skaičiai nuo 100 iki 999. Masyvų ilgiai 100. Masyvų reikšmės turi būti unikalios savo masyve (t.y. neturi kartotis).
6. Sugeneruokite masyvą, kuris būtų sudarytas iš reikšmių, kurios yra pirmame 5 uždavinio masyve, bet nėra antrame 5 uždavinio masyve.
7. Sugeneruokite masyvą iš elementų, kurie kartojasi abiejuose 5 uždavinio masyvuose.
8. Sugeneruokite 10 skaičių masyvą pagal taisyklę: Du pirmi skaičiai- atsitiktiniai nuo 5 iki 25. Trečias, pirmo ir antro suma. Ketvirtas- antro ir trečio suma. Penktas trečio ir ketvirto suma ir t.t.