

MAS 3105

Homework 10

(made on mobile)

Problem 1

1. T 2. T 3. T 4. T 5. F 6. T

Problem 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Least squares solution:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} &= (A^T A)^{-1} A^T \vec{b} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

So $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$

Problem 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Least squares solution:

$$\begin{aligned} (A^T A) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= A^T \vec{b} \\ \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Problem 4

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{u} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{v}_1 = \vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{6}{4} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{v} = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{w}_1 = \vec{w} - \frac{\langle \vec{w}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \vec{u} - \frac{\langle \vec{w}, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} - \frac{10}{4} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{24}{16} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \hat{w} = \frac{\vec{w}_1}{\|\vec{w}_1\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hence the given basis has an orthonormal basis of $\text{span}(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$

Problem 5

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \frac{\langle \vec{v}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \frac{32}{25} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{u}_2 = \frac{\vec{u}_2}{\|\vec{u}_2\|} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$Q = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$R = Q^{-1}A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 32/5 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix}$$